

يجب الاستمرار في العلاج بعد توصية الطبيب.
 حتى إذا لم تظهر حساسية في حالته الصحية، يُمنَع استعمال الدواء بدون
 استشارة الطبيب.
تنبؤ التوقف عن تناول لاموكسيس بدون استشارة
 إذا تمَّ ترك تناول **لاموكسيس** طالما أوصاك الطبيب بذلك، لا تتوقف إلا إذا أوصاك
 الطبيب بذلك.

إذا كنت تتناول لاموكسيس لعلاج الصرع
 من أجل التوقف عن تناول لاموكسيس، من المهم أن يتم خفض الجرعة تدريجياً على
 مدار أسبوعين تقريباً. في حال توقف عن تناول لاموكسيس بشكل مفاجئ لن يترجم على
 قد يعود إليك أو قد يتفاقم.

إذا كنت تتناول لاموكسيس لعلاج الاضطراب ثنائي القطب
 من المحتمل أن يتطلب الأمر بعض الوقت إلى أن يظهر تأثير لاموكسيس، حيث أنه
 غير المحتمل أن تشعر بتأثير بشكل أفضل في الحال. إذا توقفت عن تناول لاموكسيس،
 فلا حاجة لخفض جرعتك بالتدريج، ولكن لا يزال عليك التحدث أولاً مع الطبيب إذا
 كنت ترغب بالتوقف عن تناول لاموكسيس.

يُمنَع تناول الأدوية في الظلام تحقّق من المصباح على عوّة الدواء ومن الجرعة
الدوائية في كل من عدم تناول فيها دواء، ضمّ النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
 إذا كانت لديك مشكلة إحصائية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو
 الصيدلي.

الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال لاموكسيس أعراضاً جانبية لدى قسم من
 المستعملين. لا تصمد ضد قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني
 من أيّ منها.

ردود الفعل التي قد تشكل خطراً على الحياة: توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية
 يتطور لدى عدد قليل من الأشخاص الذين يتناولون لاموكسيس، رد فعل حساسي أو
 رد فعل جلدي قد يشكل خطراً على الحياة، والذات يمكن أن يتطور إلى مشاكل
 أكثر خطورة إذا لم يتم علاجها.

من المرجح أكثر أن تحدث هذه الأعراض خلال الأشهر الأولى من العلاج بـ
لاموكسيس، خاصة إذا كانت الجرعة الترويحية المتناولة مرتفعة جداً أو إن زيادة الجرعة
 كما سرعياً جداً أو إذا تم تناول لاموكسيس مع دواء آخر يسمى فاليورات.
 بعض الأعراض تكون أكثر شيوعاً لدى الأطفال، حيث يجب على الوالدين أن يكونوا
 يقظين لذلك بشكل خاص.

أعراض وردود الفعل هذه تشمل:
طفح جلدي أو احمرار، (الذي قد يتطورون إلى ردود فعل جلدية التي تشكلت
 خطوط على الحياة بما في ذلك طفح جلدي واسع مع حوصلات وتقرح، وتقرح الجلد،
 التي يحدث للأشخاص حول الفم، الأذن، العينين، والأعضاء التناسلية (متلازمة
 ستيفن جونسون)، وفقران أو فقران الجلد (أكثر من 30% من سطح الجسم - انحلال
 البشرة الشفوي الخفزي الذي، أو حالات طفح واسعة يلتصق الكبد، الدم واضعاً أجزاء
 من الجلد للدواء ويشمل طفحاً عظمياً في العيون) (eosinophilia) وأعراض جهازية التي
 تعرف أيضاً باسم متلازمة فرط الحساسية (DRESS)

حركات في الفم، في الحنجرة، في الأذن أو في الأذن أو في الأعضاء التناسلية
الدم أو اللحم أو احمرار العينين أو التقيح (سوخونة)، التهاب بلعمية (عين)
طفح حاررة جسيم مرتفعة (سوخونة)، أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو مغزج بالتهام
التفاح لوجع أو تورم في الرقبة، في الإبط أو في منفرج الرجلين
دمعات أو حالات نزيف غير متوقعة، أو إزراق الأصابع

زيادة نسبة الحمضات أو زيادة حالات العدوى (مثل الوباء) أكثر من المعتاد
وإفراز نسبة زيرومات الكبد التي تلحق في حوصسات الدم
وإفراز نسبة من خلايا الدم البيضاء (الليوزيتات)
تضخم العقد اللمفاوية
التهراك أعضاء جسم بما في ذلك الكلى والكبد

في كثير من الحالات، تكون هذه الأعراض علامات لأعراض جانبية أقل خطورة
ولكن يجب عليك أن تكون مدركاً بأنها قد تشكل خطراً على الحياة ويمكن أن تتطور
إلى مشاكل أكثر خطورة، مثل فشل أعضاء، إذا لم يتم علاجها. إذا لاحظت أي
 من الأعراض:

توجه فوراً إلى الطبيب من المحتمل أن يعطيك الطبيب إجازة فحوصات الكبد
 ولكن لا ينبغي أن تعطى دم وقد تحتاج تعاليم بالتوقف عن تناول لاموكسيس.
 إذا طورت لديك متلازمة ستيفن - جونسون أو انحلال البشرة الخفزي السمي،
 سيطلب منك الطبيب عدم تناول لاموكسيس ثانية على الإطلاق.

مرض البلمعة (Haemaphagocytic lymphofciytosis (HLH))
أعراض اللمة 2 "تحتوي خاصة متعلقة بتضخم للدواء".

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض قد تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):
صداخ
طفح جلدي
أعراض جانبية شائعة (أعراض قد تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):
عوارض أو غيب
الشعور بهول أو النوم أو بغضب
الشعور بدوار
الحمى
رقن
ورق
الشعور بعدم الهدوء
إسهال
جفاف الفم
غثبان أو قيحات
الشعور بإرهاق

الأعراض التي تظهر أو في المفصل أو بما كان آخر:
أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):
تقلبات في الشهي وعدم التناسق (رنج)
روية وضاعة أو تشوش الرؤية
سكسفات ضارب للشمع أو ترقق الشعر (التهرقش)
طفح جلدي أو حروق شمسية بعد التعرض للأشعة أو لضوء اصطناعي (حساسية
الشمع)

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):
رد فعل جلدي يشكل خطراً على الحياة (متلازمة ستيفن جونسون) (انظر أيضاً
المعلومات في بداية اللمة 4)
مجموعة أعراض التي تشمل: سوخونة، غثبان، قيح، صداخ، تصلب الرقبة
وتضخم قصوى لضوء السطح. إذا يمكن أن يحدث نتيجة التهاب الأغشية التي
تحمي العظام، والرحل التنوكي (التهاب السحايا المتاعي) هذه هذه الأعراض عادة
تعد التوقف عن العلاج، ولكن إذا استمرت أو تفاقمت توجه إلى الطبيب
حركات سريعة للعينين، خارج عن السيطرة (أر أو العينين)
كحة في العينين، مع إفراز الدمقي أو تضيق في العينين (التهاب ملتحمه العين)

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين
 10,000):
رد فعل جلدي يشكل خطراً على الحياة (انحلال البشرة الخفزي السمي) (انظر أيضاً
المعلومات في بداية اللمة 4)

رد فعل الدواء يشمل كثرة الليوزيتات (eosinophilia) وأعراض جهازية
(DRESS) (انظر أيضاً المعلومات في بداية اللمة 4)
درجة حرارة جسم مرتفعة (سوخونة) (انظر أيضاً المعلومات في بداية اللمة 4)
التفاح محيط لوجع أو تورم في الرقبة، في الإبط أو في منفرج
الرجلين (سوخونة الدم) (انظر أيضاً المعلومات في بداية اللمة 4)
غثبان أو طفح في الجلد، الكبد، التي تظهر في حوصسات الدم أو قصور الكبد
واضطرار الدوار (انظر أيضاً المعلومات في بداية اللمة 4)
اضطرار خطير في تخثر الدم، الذي قد يسبب نزيف أو كدمات دموية غير متوقعة
خطوط متفتتة حول الخراش (أي) (انظر أيضاً المعلومات في بداية اللمة 4)

مرض البلمعة (Haemaphagocytic lymphofciytosis (HLH))
أعراض اللمة 2 "تحتوي خاصة متعلقة بتضخم للدواء".

تغيرات التي يمكن أن تظهر في حوصسات الدم تشمل: انخفاض في عدد خلايا
 الدم الحمراء، انخفاض في كريات الدم البيضاء، انخفاض في عدد الصفيحات الدموية، قلة
 الصفيحات الدموية، انخفاض في عدد خلايا الدم تلك (قلة الكريات الشاملة)
واضطرار في نخاع العظم السمي قد لا تسمى
خفيان (رؤية أو صداخ أثناء غير موجودة بالحقيقة)

الشعور بعدم الثبات أو قلة الثبات أثناء الحركة
تضخم صخر خارج عن السيطرة (خلاج) (tics)، تقلصت عضلية خارجة
من السيطرة على التوتر في العينين، الرأس وعلى السطح العلوي من الجسد (الكمع)
الصرصى (Choreoathetosis) أو حركات أخرى غير عادية مثل
حركات لا إرادية، ارتجاف أو تصلب

زيادة وتيرة النوبات، لدى الأشخاص الذين يعانون من الصرع
تفاقم الأعراض، لدى الأشخاص الذين يعانون من داء كرونسون
رد فعل يشبه التهاب الكبد (يمكن للأعراض أن تشمل: اللم في الظهر أو في المفصل التي
يمكن أن تكون مصحوبة أحياناً بسوخونة وآل الشعور بوعكة عامة)

أعراض جانبية أخرى
 قد تحدث أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من
 المستعملين ولكن شيوعتها الفعّاق غير معروفة.
لم كانت هناك تقارير عن حدوث مشاكل في العظام تشمل قلة العظم وتخلخل
العظام (هشاشة العظام) والكسور. افحص مع الصيدلي إذا كنت تتعالج
بالدوية مضادة للصرع لفترة طويلة، وإذا وجدت لديك سابقية لهشاشة العظام أو إذا
كنت تتناول ستيرويدات

التهاب الكلى (tubulointerstitial nephritis) أو التهاب الكلى والعين أيضاً
(uveitis tubulointerstitial nephritis)
مرض مزعج (كوبليس)

الانخفاض في نجاعة جهاز المناعة، في أعقاب مستويات منخفضة من المضادات
التي تدعى بروتينات الدم المناعية (Immunoglobulin) في الدم، التي تساعد
في الحماية من حالات العدوى

إذا أظهر عرض جانبياً، إذا تفاقم عليك الاستشارة الجانبية أو إذا عثبت من أعراض
جانبية غير متوقعة أو غير شائعة، عليك الاستشارة الطبيب.

من الممكن أن يزداد الصخة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط
"لماذا لا توفسوت لوكي ريب سمول تومس" المدجج على الصفحة الرئيسية
 في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) التي يحوّلك إلى استشارة
 الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au/>

5. كيف يتصرفون في حالات الطوارئ؟

تجنب التحمّلين خاصة حفظها كالدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال
رؤية ومقابل أيدي الآباء، وأول الأطفال، وهكذا تجنب التسمّم. لا تسيب التقيؤ
بين تعليمات صراحة من الطبيب.
يتمتع استعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (تاريخ انتهاء) الظاهر على
التعبئة. تتغير أيتها الصلاحية من وقت لآخر. في اليوم الأخير من شهر الشهر.
مرفوق التحمّلين: من التحمّلين بدرجة حرارة تزيد عن 25°C.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء على:
Mannitol, crosopovidone, aceseulfame potassium, sodium
stearyl fumarate, orange flavour, silica colloidal anhydrous.

كيف يتنو الدواء وماذا تحوي العبوة:
لاموكسيس 100 ملغ أقراص ذوابة قابلة للتمضغ: أقراص ذات لون أبيض - كريم،
 مستديرة، محنية من كلا الجانبين، مع خط مطر من جهة واحدة.
لاموكسيس 200 ملغ 100 - 50 - 25 أقراص ذوابة قابلة للتمضغ: أقراص ذات
 لون أبيض - كريم، مستديرة، مسطحة، مع خط يعطّر الجرس من جهة واحدة.
 جميع العيوت المصاقل طرية: 10 - 7 - 20 - 28 - 36 - 50 - 60 - 100

أقراص ذوابة قابلة للتمضغ:
 قد لا تتوفر في جميع أحجام العيوت.
 قد لا تحمّلين هذه الأدوية في 2022 وقد تعاليمت وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
لاموكسيس 100 ملغ أقراص ذوابة قابلة للتمضغ:
 129-85-30811-00
لاموكسيس 25 ملغ أقراص ذوابة قابلة للتمضغ:
 129-86-30812-00
لاموكسيس 50 ملغ أقراص ذوابة قابلة للتمضغ:
 129-87-30813-00

لاموكسيس 100 ملغ أقراص ذوابة قابلة للتمضغ:
 129-88-30814-00
لاموكسيس 200 ملغ أقراص ذوابة قابلة للتمضغ:
 129-89-30815-00

لتستشير قراءه هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المتكّر. مع هذا فالدواء معدّ
 لا كالمخمين.

المنتج وحاصل التسجيل: **د. ص. م. ص**
 شارع صكبات 1، اور عكيفا 3060000، إسرائيل