

أكامول فوكوس حبسات

Acetylsalicylic acid 250 mg
Paracetamol 250 mg
Caffeine anhydrous 65 mg

التريكيرب
تحتوي كل حبسولة على:
حمض الساليسيليك
باراسيتامول
كافيين
معلومات حول المواد غير الفعالة والمؤثرات الحساسية: أظفر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من لمركبات الدواء" - والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة **بتمعن حتى نهايتها** وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
عليك تناول المستحضر بموجب التعليمات الواردة في البند 3 "كيف تستعمل الدواء". استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام من علاج الألم أو بعد 3 أيام من علاج الألم المصحوب بالحمى (انظر البند 3 - "كيف تستعمل الدواء").

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف المؤقت للألم الرأس، الألم المعتدل التي المتوسط المرتبط بالحمى (الصداع النصفي)، ألم عدم الراحة المتعلق بالدورة الشهرية والألم المصحوب بالحمى.

المجموعة العلاجية:

حمض الساليسيليك - مضاد التهابات لاسترويدي (NSAIDs)

باراسيتامول - مسكن الألم وخاضع للحرارة

كافيين - زائتيث شبه فلوي، يحفز الجهاز العصبي المركزي

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (حساسا) للمواد الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر التفصيل في البند 6). أعراض ردة فعل تحسسية والتي قد تشمل الربو، سفير أو ضيق التنفس، طفح جلدي، تورم أو شرى، انتفاخ الوجه أو اللسان، سيلان الأنف. إذا لم تكن واثقا، اسأل الطبيب أو الصيدلي.
- كانت لديك في السابق ردة فعل تحسسية لأدوية أخرى تستعمل لعلاج الألم، التهابات أو الحمى، مثل ديكلوفيناك أو إيبوبروفين.
- لديك قرحة معدية أو قرحة في الأمعاء أو إذا كان لديك تاريخ من القرحة الهضمية.
- لاحظت وجود دم في البراز أو براز أسود (أعراض لوجود نزيف أو قروح في الجهاز الهضمي).
- كنت تعاني من هيموفيليا أو اضطرابات أخرى في الدم.
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في القلب، الكبد والكلى.
- كنت تتناول أكثر من 15 ملغ من ميتوريكسات في الأسبوع (انظر البند "ردود الفعل بين الأدوية").
- كنت ضمن آخر ثلاثة أشهر من الحمل (انظري بند "الحمل، الإرضاع والحساسية").

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بأكامول فوكوس، أخبر الطبيب إذا:

- لم يتم لك في السابق تشخيص إصابتك بالحمى (الصداع النصفي)، لأنه من الواجب قبل العلاج، استبعاد الحالات التي قد تكون خطيرة وقد تكون مرتبطة بالألم أو بالحمى العصبي.
- كنت تعاني من صداع نصفي شديد الذي يستدعي الاستراحة في السرير، أو إذا كان لديك ألم الرأس يختلف عن حالات الصداع النصفي العادية التي لديك، أو إذا كنت تعاني من التقيؤ المصاحب للألم الرأس المرتبطة بالصداع النصفي (الشقيقة).
- بدأت تعاني من ألم الرأس بعد أو في أعقاب إصابة في الرأس، بلذ جهد، سعال أو الانحناء.
- لديك الألم رأس مزمنة (خمسة عشر يوما أو أكثر في الشهر، لمدة أكثر من ثلاثة أشهر)، أو إذا عانيت من أول ألم رأس بعد عمر 50 عاما.
- كنت تعاني من حالة وراثية يطلق عليها اسم عوز إيزيم G6PD (نازعة هيدروجين الجلوكوز-6-فسفات) الذي يؤثر على كريات الدم الحمراء أو الذي يؤدي لفرط اليقظ أو اليقظ أو تضخم الطحال عند التعرض لأنواع معينة من الطعام، وأدوية مثل بعض الأدوية المضادة للالتهاب (مثل حمض الساليسيليك (أسبرين))، أو التسبب بأمراض أخرى.
- عانيت في الماضي من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة، نزيف أو براز أسود، إذا كانت لديك حالة من الإرتجاع في البطن أو حرقان بعد تناول مسكنات الألم أو أدوية مضادة للالتهاب.
- كنت تعانين من اضطرابات على شكل حالات نزيف أو نزيف غير سليم من المهبل بخلاف الطمث (مثل نزيف طمثي ثقيل ومتواصل بصورة استثنائية).
- خضعت مؤخرا لجراحة (وبضمن ذلك الجراحات الصغيرة مثل جراحة الأسنان) أو على وشك الخضوع لجراحة خلال الأربعة الأسابيع الأخيرة.
- كنت تعانين من تورم أو لدغ الحشرات، مثل القش (سيلان الأنف التحسسي)، سلائل في الأنف، مرض تنفسي مزمن أو إذا كانت تشغاك أدوية تحسسية مثل ريدود الفعل الجلدية، الحكة (الشرى).
- كنت تعانين من فقر الدم (جائوت)، السكري، فرط نشاط الغدة الدرقية، اضطرابات في نظم القلب، ارتفاع ضغط الدم المرتفع، خلل في أداء وظيفة الكلى أو الكبد.
- كنت تعانين من الإدمان على الكحول (انظر البند - "استعمال الدواء واستهلاك الكحول").
- كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على حمض الساليسيليك (أسبرين) أو باراسيتامول، أو أدوية أخرى، نظراً لأن بعض الأدوية قد تعيق عمل أكامول فوكوس وتسبب أعراضاً جانبية (انظر بند "ردود الفعل بين الأدوية").
- كنت مُعرضاً لحساسية الجفاف (مثلا التقيؤ أو الإسهال أو قبل أو بعد عملية جراحية كبيرة).
- عمرك أقل من ثمانية عشر عاما. هناك علاقة محتملة بين حمض الساليسيليك (أسبرين) ومتلازمة راي عندما يتم إعطائه للأطفال ولطائف مرض متلازمة راي هي متلازمة نادرة، تؤثر على الدماغ والكبد، وقد تكون قاتلة. لهذا السبب، يُمنع استعمال أكامول فوكوس للمراهقين والأطفال دون سن 18 عاما دون توصية صريحة من الطبيب.
- كنت تعانين في الماضي من اليرقان.

تحذيرات إضافية:

- كما هي الحال عند تناول أي نوع من مسكنات الألم الرأس، فإن تناول أكامول فوكوس في أوقات أكثر تقريبا مما ينبغي (أي، أكثر من عشرة أيام في الشهر لهذا الدواء)، عندما تكون ذلك الألم رأس مزمنة (خمسة عشر يوما أو أكثر في الشهر) ، لأكثر من ثلاثة أشهر، قد يؤدي لتلفك الألم الرأس أو الشقيقة (الصداع النصفي). إذا كنت تعتقد بأن الحالة قد تكون هكذا، فتوجه للطبيب لاستشارة. قد يتوجب عليك التوقف عن تناول أكامول فوكوس من أجل حل المشكلة.
- قد يقلل أكامول فوكوس من أعراض الصداع النصفي (مثل ألم الرأس، ارتفاع حرارة الجسم)، ولذلك فإنه قد يسبب صعوبة أكبر في تشخيص التلوث. إذا كنت تشعر بسوء و عليك التوجه للطبيب، تذكر أن تخبره

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء. الجرعة الشائعة عادة، هي:
لعلاج ألم الرأس المرتبط بالشقيقة:
البالغون: 2 حبسات. إذا تم أخذ الدواء لعلاج الشقيقة (الصداع النصفي) و لم يطرأ تحسن أو طرأ تفاقم بعد العلاج الأولي، فيجب استشارة الطبيب.
الأطفال دون سن 18 عاما: يجب استشارة الطبيب.
يمنع تناول الدواء لأكثر من 48 ساعة لعلاج الشقيقة.
لألام الرأس، الألم الإزجاج الطمئي الألم المصحوب بارتفاع الحرارة:
البالغون والأطفال فوق سن 12 عاما: 2 حبسات كل 6 ساعات.
قد يتم الشعور بتحسن الألم خلال 15 دقيقة من تناول الجرعة.
يمنع تناول أكثر من 8 حبسات كل 24 ساعة.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
يُمنع استعمال الدواء لفترة زمنية تزيد عن 5 أيام للألم أو 3 أيام للألم المصحوب بارتفاع الحرارة دون استشارة الطبيب.

الأطفال والمراهقون

أكامول فوكوس ليس مخصصا لاستخدام الأطفال دون سن 12 عاما.

فحوصات ومتابعة

قد يؤثر أكامول فوكوس على نتائج الفحوص المخبرية. إذا طلب منك إجراء فحوصات دم، بول أو فحوصات مخبرية أخرى، تذكر أن تبلغ بذلك تناول أكامول فوكوس.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والكمالات الغذائية، فتأخير الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:

- أي مستحضر آخر يحتوي على باراسيتامول، حمض الساليسيليك (أسبرين) أو أي مسكن (ألم/خافض حرارة آخر. أدوية منع تخثر الدم مثل مضادات التثقف الفموية (مثلا وارفارين)، هبارينز، أدوية إذابة الخثرات (مثلا سترو تينوكباز) أو أدوية أخرى مضادة للتصاق، كلوبيدوجريل، سيلوستازول).
- كورتيكوستيرويدات (تستخدم لتخفيف التهابات).
- باريتورتات وبنزوديازيبينات (لعلاج الطبع واضطرابات النوم).
- الليثيوم، مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) أو فلوذوكسامين (لعلاج الاكتئاب).
- سوليفيل يوريا وانسولين (لعلاج السكري).
- ميتوريكسات (لعلاج أنواع معينة من السرطان، التهاب المفاصل أو الصدفية).
- بعض أنواع الأدوية لعلاج التلوث (مثل ريفامبين، أيزونيازيد، كلورامينيكول، سيبروفلوكساسين أو حمض البيبيديك).
- ليفوثيروكسين (لعلاج قصور الغدة الدرقية).
- ميتوكلوراميد (لعلاج الغثبان والتقيؤ).
- أدوية لعلاج الصداع.
- أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب.
- الأدوية المدمرة للبول (زيادة إنتاج البول وتقليل فرط السوائل).
- أدوية علاج فقر الدم (جائوت).
- وسائل منع الحمل الفموية.
- زيدوفيدين (لعلاج فيروس نقص المناعة الشريفة المكتسبة).
- أدوية لعلاج الحمى المعدية البنية مثل بروبيناثلين.
- كلوزابين (لعلاج أقصام الشخسبية).
- أدوية المحاكيات الودية (زيادة ضغط الدم أو لعلاج احتقان الأنف).
- الأدوية المضادة للحساسية (لعلاج أو للتخفيف من حالات الحساسية).
- ثيوفيلين (لعلاج الربو).
- تريبنيدافين (لعلاج التلوثات الفطرية).
- سيميبتيدين (لعلاج الحرقرة والقرحة الهضمية).
- ديسولفيرام (لعلاج التلوث بالكحول).
- النيكوتين (لإقلاع عن التدخين).
- كوريسترامين (لعلاج مستويات الكولسترول المرتفعة).

استعمال الدواء والغذاء

تشمل الجرعة الموصى بها من هذا الدواء كمية كافيين مساوية للكمية الموجودة في كأس من القهوة. إذا أخذت فقرة استعمال الدواء، عليك تحديد استهلاك الأدوية، الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وذلك لأن كمية كافيين زائدة عن الحد قد تسبب العصبية، انعدام الهدوء، اضطرابات النوم وفي بعض الأحيان خفقان قلب سريع.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب تفادي استهلاك الكحول خلال استعمال الدواء. إذا كنت تستهلك ثلاثة أو أكثر من المشروبات الكحولية في اليوم، فاسأل الطبيب إن كان عليك تناول هذا الدواء أو أدوية أخرى لتسكين الألم، خض الحرارة. قد يسبب الباراسيتامول وحمض الساليسيليك (أسبرين) ضررا للكبد ونزيفا في المعدة.

الحمل، الإرضاع والتقيؤ

- إذا كنت حاملا، فتحددني أنك حامل أو تخطيني للحمل، أخبري الطبيب ولا تتناولي أكامول فوكوس. من المهم جدا عدم تناول أكامول فوكوس خلال آخر ثلاثة أشهر من الحمل، نظراً لأن من شأن ذلك أن يوصب الضرر للجنين أو أن يسبب مشاكل خلال الولادة.
- لا يوصى بأكامول فوكوس قبل الإرضاع.
- استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.
- ينبغي أكامول فوكوس إلى مجموعة الأدوية (NSAIDs) والتي من شأنها أن تسبب ضررا على خشونة النساء. هذا يتمثل قبل للإجلاص عند التوقف عن تناول الدواء.
- قد تكون أعراض جانبية محتمل مثل اضطراب في البصر للكمي لدى الجنين وقلة ماء التلي (السليوي) اعتباراً من الأسبوع 20 من الحمل. من المفضل الامتناع عن استعمال المستحضرات من عائلة NSAIDs اعتباراً من الأسبوع 20 من الحمل، واستشارة شخص من الطاقم الطبي عند الحاجة.

السيفاء واستعمال الماكينات:

لنيس هناك أي تأثير معروف لتناول أكامول فوكوس على قدرتك على السيفاء واستعمال الماكينات. إذا لاحظت أي أعراض جانبية مثل الدوار أو الغثاس، عليك الامتناع عن السيفاء واستعمال الماكينات. أخبر الطبيب بأسرع ما يمكن.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:

يحتوي أكامول فوكوس على صبغة حمراء النوراريد (Allura Red) وصبغة صفراء سنسيت FCF (Sunset Yellow FCF) واللذين قد تسببان ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالدواء. الجرعة الشائعة عادة، هي:
لعلاج ألم الرأس المرتبط بالشقيقة:
البالغون: 2 حبسات. إذا تم أخذ الدواء لعلاج الشقيقة (الصداع النصفي) و لم يطرأ تحسن أو طرأ تفاقم بعد العلاج الأولي، فيجب استشارة الطبيب.
الأطفال دون سن 18 عاما: يجب استشارة الطبيب.
يمنع تناول الدواء لأكثر من 48 ساعة لعلاج الشقيقة.
لألام الرأس، الألم الإزجاج الطمئي الألم المصحوب بارتفاع الحرارة:
البالغون والأطفال فوق سن 12 عاما: 2 حبسات كل 6 ساعات.
قد يتم الشعور بتحسن الألم خلال 15 دقيقة من تناول الجرعة.
يمنع تناول أكثر من 8 حبسات كل 24 ساعة.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
يُمنع استعمال الدواء لفترة زمنية تزيد عن 5 أيام للألم أو 3 أيام للألم المصحوب بارتفاع الحرارة دون استشارة الطبيب.

المسنون:

ليست هناك توصية بجرعة خاصة. إذا كان لديك وزن جسم منخفض، فعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي. يجب بلع الدواء كاملا مع كأس مليئة من الماء.

يُمنع شطر أو سحق الدواء.
لا تتوفر معلومات حول الشطر/السحق/المضغ.
يُمنع الاستلقاء خلال 30-15 دقيقة بعد تناول الدواء.

تحتوي حبيسولات أكاملول فوكوس على متحول السيليبيليك (أسبرين)، باراسيتامول وكافيين. يُمنع تناول أكثر من الجرعة الموصى بها ويُمنع تناول الأدوية الأخرى التي قد تحتوي على هذه المركبات أو مركبات أخرى تستعمل لعلاج الألم، التهابات أو الحرارة المرتفعة (الأدوية اللاستيرويدية المضادة للالتهاب) خلال استعمال أكاملول فوكوس.

يجب الابتعاد عن تناول جرعة مرتفعة (في حدود الموصى به) من هذه الأدوية خلال الصوم.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفيل بانتاج كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، واحضر عبلة الدواء معك.

يُعتبر العلاج الطبي الفوري بالغ الأهمية، في ضوء المخاطر المحتملة لحصول ضرر غير قابل للإصلاح للكبد بسبب الباراسيتامول، لأنه لا تنتظر ظهور الأعراض، لأنه من شأن الجرعة المفرطة ألا تسبب في البداية أية أعراض بالإمكان ملاحظتها.

إذا ظهرت أعراض الجرعة المفرطة، فإنها قد تكون:

- بالنسبة لحمض السيليبيليك (أسبرين): دوام، طفيل في الرأس، الأذنين، صمم، تعرق، فرط التنفس، ارتفاع الحرارة، غثيان، قيء، ألم في الرأس، تلكث (لبيلة) أو انعدام الراحة، انهيار النورة الدموية (تنفق الدم) أو فشل تنفسي.
- بالنسبة للباراسيتامول: الأعراض الأولى التي من شأنها أن تظهر هي الغثيان، القيء، الإسهال، فقدان الشهية، غثوب، العنار، التعرق وبعد ذلك ألم البطن (مضغ)، انتفاخ، ألم أو حساسية في أعلى البطن والتي قد لا تعكس مدى حدة الضرر اللاحق بالكبد.
- بالنسبة للكافيين: هلع، عصبية، انعدام الراحة، اضطرابات النوم، الانفعال، تشنج العضلات، التلكث، نوبات صرع، فرط سكر الدم، تسرع القلب، وتيرة نبض سريعة) والاضطرابات في وتيرة نظم القلب.

حتى لو لم تظهر هذه الأعراض، أو إذا اشتك، من المهم التوجه لتلقي العلاج الطبي فوراً.

إذا نسيتم تناول الدواء، يجب تناول الدواء لحظة تذكرك ذلك لكن يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة النسيبة.

يُمنع تناول أكثر من 8 حبيسولات خلال فترة 24 ساعة.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الوائبة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أكاملول فوكوس أعراضاً جانبية لدى قسم من المستعملين. لا تتحدث عن عد قرأة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل أن تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً للطبيب إذا شعرت بواحد أو أكثر من الأعراض الجانبية الشديدة التالية:

ردّة فعل تحسسية مصحوبة بانتفاخ في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق. حيث قد يسبب ذلك صعوبات في البلع، طفيل خلال التنفس، صعوبات في التنفس وشعور بالضغط في الصدر (أعراض ربو). قد تصاحب طفيل جلد أو حكة أجسام، أو قد تصاحب بالاعضاء.

طفح جلدي (بما في ذلك الشرى، الحكة)، احمرار الجلد، بثرات في الشفتين، في العينين أو في الفم، تقشر الجلد، حروق، تقرحات في الفم.

في حالات نادرة، قد يسبب باراسيتامول ظهور أمراض جلدية حادة من الممكن أن تكون أعراضها احمرار، الطفح الجلدي، البثورات، تضرر جلدي على نطاق واسع.

قد تحصل أعراض جلدية شديدة حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات تحتوي على المركب الفعال باراسيتامول دون أي مشكلة.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه للطبيب فوراً.

إذا ظهرت أعراض لتغييرات في جهاز الدم مثل حالات نزيغ، كدمات، نشوء التهابات بسهولة شديدة. نزيغ في المعدة أو الأمعاء، قرحة معدية أو قرحة في الأمعاء، والتي من شأنها أن تكون مصحوبة

بألم بطن شديد، براز دموي أو أسود أو تقيؤ دموي. كما في الحال عند تناول أي نوع من مستكبات الألم وكافضات الحرارة، قد تحصل لدى الأعراض الجانبية في أي وقت خلال العلاج، دون وجود تاريخ سابق، وقد تكون قاتلة. يكون هذا العرض الجانبية شديداً، خصوصاً لدى المسنين.

• اصفرار الجلد أو العينين (علامات لفشل الكبد).

• دوام (علامات انخفاض ضغط الدم).

• نظم قلب غير منتظمة.

أعراض جانبية إضافية

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في 16 بحثاً سريريًا تم إجراؤها على أكثر من 4,800 متلقي علاج. أخبر الطبيب إذا لاحظت أحد هذه الأعراض الجانبية:

أعراض جانبية شائعة (common) – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من 10

• عصبية، دوام

• غثيان، انزعاج في البطن

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من 100

• اضطرابات في النوم (أرق)، رجفة، شعور بالخذل، صداع

• طفيل في الأذنين

• جفاف في الفم، إسهال، تقيؤ

• تعب، الشعور بالعصبية

• ارتفاع وتيرة نبض القلب

أعراض جانبية نادرة (rare) – أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من 1,000

• ألم في الحلق، صعوبات في البلع، شعور بالخذل أو اللسعوات حول الفم، فرط إفراز اللعاب

• نزاج الشهية، تغييرات في حسامة التوق

• هلع، نشوة، توثر

• اضطرابات التركيز، فقدان الذاكرة، تغييرات في التناسق الحركي (تناسق حركات الجسم)

• شعور بالألم في العنقين والرقبة

• الألم في العينين، اضطرابات في الرؤية

• هبات حرارة، مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية (مثل في الزراعين والرجلين)

• نزيغ من الأنف، تقصص بطيء أو سطحي، سيلان الأنف

• تشوش، انتفاخات (غازات)

• فرط التعرق، حكة، طفح جلدي مصحوب بحكة، ازدياد حساسية الجلد

• تصلب العضلات، العظام أو المفاصل: ألم في العنق، ألم في الظهر، تشنج العضلات

• ضعف، انزعاج في البطن

أعراض جانبية نسيبة شبيهة غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديدها تواترها بعد)

• كذلك، تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية منذ بدء تسويق الدواء بصورة عامة، ليس بالإمكان

تحديد مدى انتشارها بصورة دقيقة خلال فترة المتابعة أو في فترة ما بعد التسويق، ولذلك فإن نسبة

شئوية معرّفة هي أنها "غير معروفة".

• انعدام الراحة، شعور عام سيء أو غير سليم

• نعاس، صداع نصفي (شعور في

• احمرار الجلد، طفح جلدي. تم الإبلاغ عن حالات نادرة جدا من ردود الفعل الجلدية الحادة

• خفقان القلب، ضيق التنفس، صعوبات مجاهدة في التنفس وشعور بالضغط في الصدر مع صفير أو سعال (ربو)

• ألم في البطن، انزعاج في البطن بعد تناول الوجبات

• ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة

في الشرة، عليك استشارة الطبيب.

التعليق عن الأعراض الجانبية

يمكن الإبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التعليق عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استشارة عن الإنترنت لتعليق عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد والاطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب التخزين في مكان جاف بدرجة حرارة دون 25°C.

بالإمكان الاستعمال حتى 6 أشهر بعد فترة العبوة للمرة الأولى، وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية. يجب إبقاء متصص الرطوبة داخل العبوة وإغلاقها جيدا بعد كل استعمال.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

Microcrystalline cellulose, stearic acid, crospovidone, silicon dioxide, pregelatinized starch, povidone, hydroxypropyl methylcellulose, FD&C red #40, FD&C yellow #6, polyethylene glycol 400, titanium dioxide, polysorbate 80, purified water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

حبيسولات باللون الأحمر، محدنية من كلا الجانبين

حجم العبوات: تحتوي العبوة على 30 أو 50 حبيسولة في عبوة من متصص للرطوبة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم المنتج وصاحب التسجيل:

تيفع إسرائيل م.ض، شارع دفورا هفتينا 124، تل أبيب 6944020

تم تحرير هذه الشرة في كانون الثاني 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 313 35 30995

لتبسيط قراءة هذه الشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معذ لكلا الجنسين.