

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - **1986**

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

مارونيل 25

أقراص

التكوين:

يحتوي كل قرص من **مارونيل 25** على:

كلوميبرامين هيدروكلورايد 25 ملغ

Clomipramine Hydrochloride 25 mg

المواد غير الفعالة ومولّدات الحساسية في المستحضر – أنظر الفقرة 2، بند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

لا يوصى بإستعمال **مارونيل 25** لعلاج حالات الإكتئاب من أسباب وأعراض مختلفة لدى الأطفال والمراهقين (أعمار 0-17 سنة) وذلك لأنه لا توجد معلومات كافية حول سلامة

وإنجاعة **مارونيل 25** في علاج هذا الإضطراب لدى الأطفال والمراهقين.

إضطراب الوسواس القسري

Obsessive compulsive disorder (OCD)

لا تتوفر خبرة بخصوص الأطفال الصغار من عمر 5 سنوات.

الفصيلة العلاجية

مضادات الإكتئاب من فصيلة ثلاثية الحلقة، مثبطات غير إنقائعية لإعادة إستيعاب المونوأمين.

يستعمل **مارونيل 25** لدى الكبار لعلاج أنواع مختلفة من الإكتئاب وإضطرابات الوسواس القسري المتعلقة بالوسوك والأفكار القسرية. ويتحسن كذلك المزاج والأعراض الجسدية مثل قلة النوم، الدوار، ضربات القلب وإضطرابات أخرى.

يستعمل **مارونيل 25** أيضاً لعلاج إضطرابات الوسواس القسري لدى أطفال ومراهقين فوق عمر 5 سنوات.

يعمل **مارونيل 25** على ما يبدو عن طريق زيادة كمية النواقل الكيميائية الطبيعية (نورأدرينالين وسيرتوتونين) في الدماغ أو إطالة مدة تأثيرها.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

• إذا وُجد لديك أو كان لديك فرط حساسية (رد فعل تحسسي) لـ كلوميبرامين أو لكل واحد من المركبات الإضافية المصغلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفقرة 2 بند «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» أو لكل دواء آخر من فصيلة مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة.

• بمشاركة أدوية معينة لعلاج الإكتئاب مثل أدوية من فصيلة مثبطات مونو أمين أوكسيداز (MAO) أو خلال 14 يوماً قبل أو 14 يوماً بعد علاج بمثبطات MAO.

• بمشاركة مضادات اللائظمة مثل كينيدين وپروپانثونون.

• إذا إحترت نوبة قلبية مؤخرًا، أو إذا كنت تعاني من مرض قلبي خطير (متلازمة خلقية لإطالة مقطع QT).

- في الحالات التالية:
 - التسمم الخطير من مثبطات الجهاز العصبي المركزي (مثل الأدوية المنومة، مسكنات الألم أو المستحضرات النفسية) أو من الكحول
 - إحتباس بول شديد
 - إرتباك شديد (هذيان)
 - جلوكوما (إرتفاع الضغط داخل العين) ضيقة الزاوية غير المُعالجة
 - تضخم مفرط للبروستات مع إحتباس البول
 - تضيق فتحة اليواب (الممر بين المعدة والأثني عشر)
 - إنسداد الأمعاء الحشلي

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

في ظروف معينة، لا يجوز تناول **مارونيل 25** أو يمكن تناوله فقط بعد إجراء تقييم طبي دقيق.

لذلك، يجب إعلام الطبيب إذا كنت تعاني أو إذا عانيت من إحدى الإضطرابات أو الأمراض التالية:

- الميل لحدوث نوبات صرعية
- إضطرابات في نظم القلب أو مشاكل أخرى في القلب أو الأوعية الدموية
- حالات نفسية أخرى
- إرتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما)
- مرض في الكبد أو الكلى
- تغيرات في تعداد خلايا الدم
- تسمم (من الأدوية مثلاً)
- إضطرابات في تفرغ المعدة
- صعوبات في تناول أو تضخم غدة البروستات
- فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid) أو تناول أدوية لعلاج الغدة الدرقية بنفس الوقت مع تناول **مارونيل 25**

- الإدمان على الكحول
- إمساك أو إنسداد الأمعاء بشكل متكرر
- إغماء
- تغير المزاج من إكتئاب إلى نشوة قصوى
- إذا وجدت لديك أفكار إنتحارية
- إذا كنت تعاني من مرض الفصام
- إذا كنت مقبلاً على إجتياز علاج بالسدمات الكهربائية (ECT)
- إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج الإكتئاب، مثل: مضطبات إعادة إمتصاص السيروتونين الإنقائعية (SSRIs) (مثل فلواوكسيتين) أو مضطبات إعادة إمتصاص السيروتونين ونورأدرينالين (SNARIs)، مضادات إكتئاب أخرى ثلاثية الحلقة والليثيوم
- إذا كنت تعاني من نقص اليوتاسيوم (إنخفاض تراكيز اليوتاسيوم في الدم)

وسائل حذر إضافية

- من المهم أن تتناقش أنت وأبنائك وعائلتك أو الذين يعالجوك مع الطبيب بخصوص أي تغير في المزاج خلال العلاج بـ **مارونيل 25**.
- بلغ طبيبك، إذا كنت تضع العدسات اللاصقة وتعاني من تهيج في العينين.
- بلغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول **مارونيل 25** وذلك قبل أي إجراء جراحي أو قبل بدء علاج الأسنان.

مارونيل 25 قد يسبب زيادة حساسية الجلد لضوء الشمس، لذلك يجب الإمتناع عن التعرض المباشر لضوء الشمس، وضع النظارات الشمسية، وحماية الجلد بالبسبة مناسبة.

بلغ الطبيب أو الصيدلي خاصتك إذا كنت تعاني من الإغماء أو من أي مرض آخر، أية حساسية، عدم تحمل للسكّر (مثلاً لكتوز، سكرزوز) أو كنت تتناول أي دواء آخر (بما في ذلك بدون وصفة طبية) أو أية أدوية للإستعمال الخارجي.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة كإستطباب لعلاج الإكتئاب من مصادر مختلفة.

الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 5 سنوات كإستطباب لعلاج إضطراب الوسواس القسري (OCD).

الفحوص والمتابعة

من المهم أن يقوم طبيبك بمراقبة تقدم علاجك بشكل دائم وذلك في يتمكن من ملامثة المقدار الدوائي ونتيجة لذلك تقليل الأعراض الجانبية.

من الجائز أيضاً أن يقوم طبيبك بإجراء فحوص الدم، يقيس ضغط دمك ويفحص الأداء الوظيفي لقلبك ووظائف الكبد.

قد يسبب **مارونيل 25** جفاف في الفم، الذي من شأنه أن يزيد من خطورة حدوث تسوّس الأسنان. لذلك، خلال فترة العلاج المطوّل، يجب الخضوع لفحوص الأسنان بشكل دائم.

معلومات للعائلات وللمعالجين

عندما يُعطي **مارونيل 25** للأطفال وللمراهقين يجب الإنتباه للتغيرات السلوكية.

قد تتناقض أعراض الإكتئاب، خاصة السلوك الإنتحاري، وذلك خلال فترة العلاج بـ **مارونيل 25**، فإذا تفاقمت، يجب الإتصال بالطبيب بشكل فوري.

لقد كانت هناك تقارير عن زيادة ونيرة الإضطرابات السلوكية، بما في ذلك خطورة أكبر لحدوث أفكار إنتحارية، للحاق الأذى الذاتي والإنتحار، لدى الأطفال، المراهقين والشبان (حتى عمر 25 سنة) الذين لديهم إكتئاب أو تشخيصات نفسية أخرى والمُعالجين بمضادات الإكتئاب. لوحظ هذا الأمر ضمن معلومات من الأبحاث السريرية.

لا يجوز التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ إلا باستشارة الطبيب فقط وذلك لأنه قد تظهر أعراض الفطام.

المتعالجون المسنون

يحتاج المتعالجون المسنون عادة إلى مقادير دوائية أخفض مما هو عليه لدى المتعالجين الشبان والعلاج للمعالجين في منتصف العمر. إن إحتمال ظهور أعراض جانبية يكون أكبر لدى المتعالجين المسنين. يوفر الطبيب أي معلومة خاصة فيما يتعلق بالحدز في المقدار الدوائي والحاجة لإجراء مراقبة حثيثة.

الحمل والإرضاع

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة.

لا يجوز تناول **مارونيل 25** خلال فترة الحمل إلا إذا وُصف خصيصاً من قبل الطبيب.

يدرس الطبيب الخطورة المحتملة على الجنين مقابل الفائدة الطبية للأُم ويقرر بشأن إستعمال **مارونيل 25**.

نتنقل المادة الفعالة بـ **مارونيل 25** إلى حليب الأم ولذا توصى الأمهات اللواتي تتناولن **مارونيل 25** بعدم الإرضاع.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية للقلب أو لضغط الدم
- أدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (مثل: باربيتورات، بينزوديازيبينات، مواد تخدير العمليات الجراحية)
- مضادات الإكتئاب الأخرى (مثل: أدوية من فصيلة الـ SSRIs أو الـ SNaRIs)
- أدوية للتهنئة
- أدوية للصرع (مثل: باربيتورات أو حمض فالپروتيك، كاربامازيبين وفينيتوتين)
- أدوية تحث على النوم (مثل: بينزوديازيبينات)
- مسكنات الألم القوية (مستحضرات ذات مفعول أفيوني)
- أدوية لمنع تخثر الدم (مضادات تخثر الدم)
- أدوية للربو أو الحساسية
- أدوية لداء الپاركينسون
- أدوية للعددة الدرقية
- أدوية التي تحتوي على المادة الفعالة سيميثيدين لفرط إفراز الحمض في المعدة أو للقرحات المعدية

- وسائل منع الحمل الهرمونية (أقراص منع الحمل)

• إستروجينات

• ميتيل فينيئات (يستعمل خاصة لإضطراب الإصغاء والتركيز (ADHD))

• أدوية معينة لتخفيف شحوم الدم (راتنج مُبادل للأيونات)

نظراً لأنه من الجائز أن تتداخل الكثير من الأدوية مع **مارونيل 25**، فمن الجائز أن يحتاج الأمر لملامة المقدار الدوائي أو إيقاف العلاج بإحدى الأدوية.

إستعمال الدواء والطعام

الجريب فروت، عصير الجريب فروت، عصير التوت البري – من شأنها أن تؤثر على عمل الدواء.

السياقة وإستعمال الماكنات

من شأن هذا الدواء أن يضعف من ردود فعلك، قدرتك على السياقة وقدرتك على إستعمال الأجهزة أو الماكنات.

من شأن **مارونيل 25** أن يجعل لديك ميل للنوم، وأن يقلل من يقظتك أو يؤدي إلى تشوش الرؤية. إذا حدث لك هذا الأمر، تجنب سياقة المركبة، إستعمال الماكنات أو أي نشاط يتطلب يقظة تامة. من شأن هذه التأثيرات أن تشدد بواسطة أدوية أخرى أو الكحول.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من حركة المرور وما شابه.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

يوصى خلال فترة العلاج بالإمتناع عن شرب الكحول وذلك لأن **مارونيل 25** قد يقلل من تحمل لتفكول.

التدخين

يجب إبلاغ طبيبك عن التغيرات في عادات التدخين.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي **مارونيل 25** على لكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بالطبيب قبل تناول **مارونيل 25**.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن وإتقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول

بإمكان تناول مارونيل 25 مع أو بدون الطعام.

لا يجوز شطر القرص. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

الأعراض التالية لفرط المقدار الدوائي تظهر عادة خلال عدة ساعات: ميل شديد للنوم؛ تركيز متدنٍ؛ ضبابية الحواس؛ نبض سريع، بطيء أو غير منتظم؛ قلة راحة وقلة هذوء؛ فقدان تناسق العضلات وتصلب العضلات؛ ضيق تنفس؛ إختلاجات؛ تقيؤات؛ سخونة.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر علاجاً طبياً.

إن المقدار الدوائي المفرط من هذا الدواء يشكل خطراً خاصة على الأطفال الصغار.

إذا نسيت تناول الدواء

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة كما حُدد من قبل الطبيب المعالج.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول المقدار الدوائي المنسي بأسرع ما يمكن والعودة لجدول الأوقات الاعتيادي. إذا حان تقريباً موعد تناول المقدار الدوائي القادم، يجب تقوية المقدار الدوائي المنسي ومواصلة خطة العلاج الاعتيادية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لعلاج الإكتئاب ولعلاج اضطراب الوسواس القسري يتطلب الأمر علاجاً مطوّلاً بـ مارونيل 25.

فترة العلاج تحدد من قبل الطبيب فقط.

من الجائز أن يرغب الطبيب بخفض المقدار الدوائي بشكل تدريجي قبل إيقاف التام للعلاج، وذلك لمنع تفاقم الحالة وتخفيف الخطورة لظهور أعراض الفطام عن الدواء، مثلاً: الشعور بوعكة، آلام في البطن، إسهال، صعوبة في النوم، قلق أو عصبية، صداع، غثيان وشعور عام بالإنزعاج.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توقرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال مارونيل 25 قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندersh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

الأعراض الجانبية التي تستوجب اهتماماً خاصاً

- من شأنها أن تحدث اضطرابات في كمية السوائل ونسبة الأملاح في الجسم، التي تتراقد بأعراض مثل إرتباك، هلوسة، إختلاجات ووذمة دماغية (إنفخاخ جراء تراكم السوائل في الدماغ). في مثل هذه الحالات يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.
- يمكن أن تحدث بشكل نادر جداً، متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (neuroleptic malignant syndrome)، الأعراض الرئيسية هي سخونة، نبض غير منتظم، اضطرابات في الوعي وتصلب العضلات. في مثل هذه الحالات يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.
- أدوية مثل مارونيل 25، لوحدتها أو بمشاركة أدوية أخرى، قد تسبب متلازمة السيروتونين. الأعراض المميزة لهذه المتلازمة هي: سخونة، تشنجات عضلية، إختلاجات، قلة هذوء، إرتباك وفقدان الوعي. في مثل هذه الحالات يجب التوجه فوراً إلى الطبيب.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً - أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة

- الشعور بدوران
- إرتباك مؤقت
- دوام
- إرتجاف
- قلة راحة
- زيادة الشهية للطعام
- زيادة في الوزن
- جفاف في الفم
- اضطرابات في التبول
- تشنجات عضلية
- عدم القدرة على تركيز الرؤية
- تشوش الرؤية

- صداع
- تعرق
- إمساك

أعراض جانبية شائعة - أعراض التي تظهر لدى 10-11 مستعملين من بين 100

- إرتباك مع توهان الخلاء وهلوسة
- اضطرابات في التركيز
- اضطرابات في النطق
- اضطرابات في النوم
- قلق
- فرط حيوية ومزاج عالٍ
- فرط إنفعال
- عودانية
- اضطرابات في السلوك
- تدني الذاكرة
- تثارؤب
- أرق

- كوابيس ليلية
- خدر أو الشعور بوخز في الذراعين والرجلين
- ضعف العضلات
- تصلب العضلات
- هبات الحر
- توسع الحدقتين
- خفقان القلب
- إنخفاض ضغط الدم بمشاركة دوار أثناء تغيير الوضعية
- تفاقم الإكتئاب
- غثيان
- حساسية للضوء
- ردود فعل جلدية تحسسية
- جلد حاك
- إرتفاع قيم الفحوص المخبرية
- اضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي والرغبة الجنسية (libido)
- طنين في الأذنين

أعراض جانبية غير شائعة - أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- إرتفاع ضغط الدم
- إختلاجات
- اضطرابات في نظم القلب
- فقدان الشهية للطعام
- اضطرابات في الحركة وفي تناسق الحركات (coordination)
- تغيرات في الإبراك والأحاسيس
- تقيؤ
- أمراض في المعدة والأمعاء
- إسهال
- تضخم غدد الثدي وزيادة إفراز الحليب
- طعم سيء في الفم

أعراض جانبية نادرة جداً - أعراض التي تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000

- سخونة مرتفعة
- تناقص عدد خلايا الدم البيضاء (leukocytopenia)، تناقص عدد الصفيحات الدموية (thrombocytopenia)، تناقص عدد خلايا الدم البيضاء من نوع العدلات (agranulocytosis) أو إرتفاع عدد خلايا الدم البيضاء من نوع الحمضات (eosinophilia)
- نزف من تحت الجلد
- ردود فعل لفرط الحساسية (أليرجيا) التي تشمل صدمة (shock) مع ردود فعل في الرئتين
- وكامل الجسم
- اضطرابات في الحركة
- جلوكوما
- اضطرابات في التوصيل الكهربائي للقلب
- التهاب الكبد مع أو بدون يرقان
- وذمة (إنفخاخ المفاصل، اللين أو أجزاء أخرى من الجسم)
- تساقط الشعر

- نتاج غير كاف للبول
- تغيرات في EEG
- الإنتهاب الرئتين

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض شيعوها لم يحدد بعد)

- عدم إرتياح داخلي ورغبة دائمة في الحركة
- حركات شاذة لا إرادية مرارا وتكرارا
- تفكك العضلات
- إرتفاع نسبة الهورمون الذي يُنتج الحليب (البرولاكتين) في الدم
- قذف متأخر للسائل المنوي أو عدم القذف (لدى الرجال)
- بعض الأعراض الجانبية التي فصلت سابقاً تزول خلال فترة العلاج بعد فترة التعود على المستحضر.
- إذا إستمرت تلك الأعراض أو كانت مزعجة، يجب مراجعة الطبيب.
- لقد كانت هناك تقارير عن زيادة وتيرة الإضطرابات السلوكية - بما في ذلك زيادة خطورة حدوث أفكار إنتحارية، إلحاق الضرر بالنفس والإنتحار - لدى الأطفال والمراهقين الذين لديهم إكتئاب أو تشخيصات نفسية أخرى والمعالجين بمضادات الإكتئاب.
- لوحظت خطورة زائدة لحدوث كسور في العظام لدى متعالجين بأعمار 50 سنة وما فوق الذين يتناولون دواء من هذا النوع.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تَبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ض".

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسيب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقاص تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية، وفي مكان محمي من الضوء.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate, Maize starch, Microcrystalline cellulose, Povidone, Carmellose sodium LS, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Ethyl cellulose type B, Opadry 02B220022 (Yellow).

يحتوي كل قرص من مارونيل 25 على 30 ملغ كيتوز (مونوهيدرات).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

مارونيل 25 عبارة عن أقراص مستديرة، محدية من كلا الجانبين لونها أصفر.

يوجد في كل علبة 30، 50، 100 أو 1000 قرص.

من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلب.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم.م.ض، ص.ب. 21429، تل أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم.م.ض، يارك الصناعة "مافو كرمل".

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

132 26 22823 00

تم إعادتها في أيار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.