

- وجدت لديك حالة جسدية تؤثر على شكل العضو التناسلي. يشمل هذا الأمر حالات fibrosis
  - سماكة وتندب النسج الانتصابي.
  - وجد لديك مرض الذي قد يسبب حدوث إنتحاب غير عابر priapism - إنتحاب مستمر للقضيب التناسلي). هذه تشمل فقر الدم المنجل، الورم النخاعي المتعدد ولوكلبيما.
  - كنت تعاني من قرحة في المعدة (سمى أيضًا قرحة معدية أو قرحة حمضية).
  - كنت تعاني من اضطراب ذيقي (مثل مرض الناول - hemophilia).
  - كنت تستعمل آية أدوية أخرى لصعوبات في إنتحاب القضيب، بما في ذلك لفيترا 10 ملغ أقراص ذابة (انظر أيضًا في السياق "التدخلات/التدخلات بين التفاعلات بين الأدوية").
  - كنت تعاني من تدلي مفاجئ في الرؤية أو من فقدان مفاجئ للرؤية. توقف عن تناول فاردينافيل إينوفايد وتوجه حالًا إلى طبيبك.

#### الأطفال والمهاترون

فاردينافيل إينوفايد غير مخصص للإستعمال لدىأطفال أو مراهقين دون عمر 18 سنة.

#### التدخلات/التدخلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات أخرى، إحدى الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي أدوية أخرى كنت تتناول.

• نتنيات، أدوية لعلاج الذبحة الصدرية، أو مانحات أوكسيد التنريت، مثل أميل نيتريت.

إن تناول هذه الأدوية مع فاردينافيل إينوفايد قد يثير بشك خطير على ضغط الدم لديك.

• دواء لعلاج اضطرابات نظم القلب (الأنظمة) مثل كيندين، بروكاثيناميد، أسيودارون أو سوتالول.

• ريتينافيل أو إيندينافيل، أدوية لعلاج الـ HIV (الإيدز).

• كيتوكونازول أو إيتراكونازول، أدوية مضادة للفطريات.

• إريتروميسين أو كلاريتروميسين، مضادات حيوية من نوع الماكروليدات.

• ماجاهيدن، نوع دواء يستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم وضمخ البروستات (مثل تضخم البروستات المحيي).

• روسيجوكات لعلاج أنواع مختلفة من ارتفاع ضغط الدم المرئي - لا يجوز تناول فاردينافيل إينوفايد.

• لا يجوز استعمال فاردينافيل إينوفايد ملائمةً لأفراد مثليي الجنس، بما في ذلك لفيترا 10 ملغ أقراص ذابة.

#### استعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول فاردينافيل إينوفايد مع أو بدون الطعام، لكن يفضل ليس بعدوجبة ثقيلة أو غنية بالدهن، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر من تأثير الدواء.

لا تشرب عصير الوردي فروت عند استعمالك لـ فاردينافيل إينوفايد، لأن ذلك قد يعرقل من التأثير الإعتمادي للدواء.

#### استعمال الدواء وإستهلاك الكحول

يمكن أن يفاق الشرب الكحولي الصعبويات في إنتحاب العضو الذكري.

#### الحمل والإرasmus

فاردينافيل إينوفايد غير مخصص للإستعمال من قبل النساء.

#### السيادة وإستعمال الماكولات

قد يسبب فاردينافيل إينوفايد إلى بعض الأشخاص الشعور بدوراً أو يؤثر على الرؤية لديهم. إذا كنت تشعر بدوراً أو حال تأثر رؤيتك بعد تناول فاردينافيل إينوفايد.

فلا تقوم بقيادة ولا تناول أي آجهزة أو آية ماقنات.

#### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي أقراص فاردينافيل إينوفايد 20 ملغ على مادة ملونة أصفر سانسيت sunset yellow aluminium lake (E110)

#### (3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الاستعمال دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الاستشارة من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقادير الدوائية وطريق العلاج.

المقدار الوائي والجرعة العلاجية يحدده من قبل الطبيب فقط.

المقدار الوائي الموصى به هو عادة 10 ملغ.

يجب تناول قرص واحد حوالي 25 حتى 60 دقيقة قبل ممارسة نشاط جنسي.

يجب تناول فاردينافيل إينوفايد 25 دقيقة قبل ممارسة نشاط جنسي.

ساعات بعد تناول فاردينافيل إينوفايد.

لا يجوز تناول دوائي آخر لصعوبات في إنتحاب القضيب الذكري (مثل، لفيترا 10 ملغ أقراص ذابة).

لا يجوز تناول فاردينافيل إينوفايد أكثر من مرة واحدة في اليوم.

إشكال مقدار الدوائي من الأذى الذي يسببه فاردينافيل إينوفايد.

دوائية مختلفة لصعوبات في إنتحاب العضو الذكري، كامر متعلق بمدى تأثيره عليك.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

#### طريقة التناول

يجب بلع قرص واحد من كأس من الماء.

لا تتوفر معلومات بخصوص السقق/الشطر/المضيق.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائيًا أكبر على مراجحة الطبيب.

إن الرجال الذين يتناولون أكثر مما ينصح به من فاردينافيل إينوفايد قد يقاومون من أعراض جانبية أكثر أو قد يشعرون من آلم شديد في الظهر.

إذا تناولت مقدارًا دوائيًا مفرطًا أو إذا بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالًا إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في العيادة.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة. يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تناول فيها دواء. صنع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## ثاردينافيل إينوفايد 5 ملغ

## ثاردينافيل إينوفايد 10 ملغ

## ثاردينافيل إينوفايد 20 ملغ

### أقراص مطلية

يحتوي كل قرص من فاردينافيل إينوفايد 5 ملغ على:

ثاردينافيل (كـ هيدروكولوريد تريبيدرات) 5 ملغ

يحتوي كل قرص من فاردينافيل إينوفايد 10 ملغ على:

ثاردينافيل (كـ هيدروكولوريد تريبيدرات) 10 ملغ

يحتوي كل قرص من فاردينافيل إينوفايد 20 ملغ على:

ثاردينافيل (كـ هيدروكولوريد تريبيدرات) 20 ملغ

للقائم المركبات غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

إن انتشاره يتبعن حتى تناولها قبل استعماله للدواء. تجنب هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يقرأ هذا الدواء لعلاج، لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالهم الطبية مشابهة لحالتك.

### (1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ثاردينافيل إينوفايد مخصص لعلاج العجز الجنسي (erectile dysfunction) لدى الرجال.

إن واحد من بين عشرة رجال بالغين على الأقل يعاني أيًّا من العجز الجنسي، أي، صعوبة في تحقيق أو الحفاظ على انتصار العضو الذكري.

قد يعود ذلك لعوامل جسديه أو نفسية، أو مشاركة لكلا العاملين. على أي حال، بسبب حدوث تغيرات في المضادات وفي الأوعية المموية، لا يصل ما يمكن من الدم إلى العضو التناسلي وذلك لجعله قاسيًا وإيقائه قاسيًا.

الفصيلة العلاجية: ينتهي فاردينافيل إلى فصيلة الأدوية المسماة مثبطات الإنزيم PDE5.

إن تثبيط الإنزيم يؤدي إلى إرساء الفضلات في جدار الأوعية المموية للعضو الذكري.

تأثير الذي يمكن أن يجريان الدم على العضو الذكري وبذلك يتم تحقّق إنتحاب القضيب.

يعلم فاردينافيل إينوفايد بتأثيراته على انتصار جنسية، وهو يمكن بقاءه جنسياً مرضي.

### (2) قبل إستعمال الدواء

#### لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كانت حساساً (الergic) لل المادة الفعالة فاردينافيل أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء". علامات لرد فعل حساسية تشمل طفح، حكة، انتفاخ الوجه أو الشفتين، وضيق في التنفس.

• كانت تتناول أوكسيد التنريت قبل أو على تناوله لعلاج تصلب الذبحة الصدرية، أو مانحات أوكسيد التنريت تزيد من تأثيراته على ضغط الدم.

• إنفينافايد قد يؤثّر بشكل جدي على ضغط الدم.

• كانت تتناول روتيقافيل أو إيندينافيل، أدوية تستعمل لعلاج تلوثات فيروس العوز المناعي البشري (HIV).

• تجاوزت عمر 75 سنة وتناولت كيتوكونازول أو إيتراكونازول، أدوية مضادة للطفريات.

• كانت تعاني من مشكلة خطيرة في القلب أو في الكبد.

• كانت تتصفح للليلة الكليلة.

• إجتازت مؤخرًا سكتة أو نوبة قلبية (خلال النصف سنة الأخيرة).

• كانت تعاني أو عانت في الماضي من ضغط مد منخفض.

• وجدت لديك عائلتك سابقة لأمراض ضمورية في العينين (مثل التهاب الشبكية المسايغية).

• عانت ذات مرة من حالة شترنوك فيها فقدان الرؤية نتيجة تضرر عصب الرؤية، بسبب تزويد غير كافي من الدم، المعروفة باسم non-arteritic ischemic optic neuropathy (NAION) optic neuropathy.

• كانت تتناول روسيجوكات، أدوية تستعمل لعلاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني.

الرنوبي (أي)، ارتفاع ضغط الدم في الرئتين) وإرتفاع ضغط الدم الرئوي الثاني.

لحوادث تختبره تصميمية مرتنة (أي، إرتفاع ضغط الدم الرئوي الذي يعيث ثانوي لحثارات دموية)، لواحظ أن مثبطات الإنزيم PDE5 مثل فاردينافيل إينوفايد، تزيد من تأثيرات المستحضر روسيجوكات في تخفيض ضغط الدم. بلع طببي إذا كنت تتناول روسيجوكات أو إذا لم تكن واثقاً.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

تحدد مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول فاردينافيل إينوفايد.

قبل العلاج بـ فاردينافيل إينوفايد، إحل طببي إذا:

• وجدت لديك مشكلة في القلب، إن القيام ببعض الأنشطة.

• كانت تعاني من بعض غير منتظم (اضطراب في نظم القلب) أو من أمراض قلبية وراثية.

التي تؤثر على التخطيط الكهربائي لقلب (ECG).

#### (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال فاردينافيل إينوفايد قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين، لا تتدنى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تتعانى إياً منها.

غالبية الأعراض هي طفيفة أو متوسطة.

توقف عن إستعمال فاردينافيل إينوفايد وإنصل بطبيبك حالاً، إذا كنت تعانى من انتفاخ جزئي، مفاجئ، مؤقت أو دائم للرؤية أو فقدان الرؤية، بعين واحدة أو بكلاهما.

#### أعراض جانبية إضافية

هناك حالات متعددة مفاجئة في السمع أو فقدان مفاجئ للسمع.

بلغ عن حالات متعددة نوبة قلبية، نوبة سريعة أو متعددة، ألم في الصدر، ومشاكل في جریان الدم إلى المخ ( بما في ذلك إنتفاخ مؤقت في جریان الدم إلى أجزاء في الدماغ ونزف في الدماغ ) وذلك لدى رجال إستعملوا فاردينافيل. غالبية الرجال اللذين قدوا من هذه الأعراض الجانبية، عالموها من مشاكل في القلب قبل إستعمال هذا الدواء، لا يمكن تحديد فيما إذا كانت هذه الأحداث متعلقة بشكل مباشر بـ فاردينافيل.

إن إحتمال المعاناة من عرض جانبي موصوف وفق التصنيفات التالية:

أعراض جانبية شائنة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من 100 مستعمل واحد من عشرة:

#### • صداع

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

#### • دوران

#### • توقي

#### • سيلان أو إنسداد الأنف

#### • صعوبات هضمية

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• إنتفاخ في الجلد وفي النسيج المخاطي، بما في ذلك إنتفاخ في الوجه، في الشفتين أو في الحنجرة

• إضطراب في النوم

• خدر وخلل في شعور اللمس

• الميل للنوم

• تأثيرات على رؤية الألوان، إثارة في العين، تأثيرات على رؤية الألوان، ألم وإنزعاج في العين، حساسية الضوء

• طنين في الأذنين، فيرتيغو (دوخة دورانية)

• نبض سريع أو ضربات قلب

• ضيق تنفس

• إحتقان الأنف

• ارتداد الحمض (حرقان)، إتهاب جدار المعدة (gastritis)، ألم في البطن، إسهال، تقيؤ، غثيان، حفاف الفم

• إرتفاع نسب إنزيمات الكبد في الدم لديك

• طفح، أحمراء الجلد

• ألم في الظهر أو ألم عضلي، إرتفاع إنزيم الغضل في الدم (كرياتين فوسفوكربنات)، تصلب المضلات

• انتصاع مطول للقضيب التناسلي

• الشعور بوعدة عامة

#### أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

• إتهاب الميدينين (إتهاب الملتحمة)

• رد فعل تحسسي

• قلق

• إغماء

• فقدان الذاكرة

• إختناق

• إرتفاع الضغط داخل العين (جلوكوما)، زيادة التدمع

• تأثيرات على القلب (مثل نوبة قلبية، تغيرات في نبض القلب أو نوبة صدرية)

• ضغط دم مرتفع أو منخفض

• رعاف

• تأثير على نتائج فحوص الدم لفحص وظائف الكبد

• حساسية الجلد لمواد التفاس

• انتصاع مؤلم للقضيب التناسلي

• ألم في الصدر

• إنتفاخ مؤقت في جریان الدم إلى أجزاء من الدماغ

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000 أو أعراض جانبية شيعوها غير معروفة (unknown) (frequency)

• دم في البول (hematuria)

• نزف من العضو التناسلي (نزف من القضيب الذكري)

• وجود دم في السائل المنوي (hematospermia)

• موت مفاجئ

• نزف في الدماغ

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت احدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### (5) كيفية تخزين الدواء؟

• تحفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال / أو الوضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقى بدون تعليمات سريعة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب تخزين هذا الدواء بدرجة حرارة تقل عن 30 درجة مئوية.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في سلة القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال بعد. هذه الوسائل تساعده في الحفاظ على البيئة.

#### (6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, crospovidone type B, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, hypromellose type 2910, titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), macrogol type MW400.

أقراص مطلية من فاردينافيل إينوفايد 5 ملخ - 10 ملخ تحتوى أيضاً على: Iron oxide red.

أقراص مطلية من فاردينافيل إينوفايد 20 ملخ تحتوى أيضاً على: Sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

فاردينافيل إينوفايد 5 ملخ: أقراص مطلية، مستديرة، محديبة من كلا الجانبين، بلون برتقالي - بني.

فاردينافيل إينوفايد 10 ملخ: أقراص مطلية، مستديرة، محديبة من كلا الجانبين، بلون برتقالي فاتح.

فاردينافيل إينوفايد 20 ملخ: أقراص مطلية، مستديرة، محديبة من كلا الجانبين، بلون برتقالي.

#### حجم العلبة:

يتوفر الدواء ضمن علبة كما هو مفصل: علب كرتونية تحتوي على لوحيات (بليستر) ذات 8 أقراص.

يظهر على علبة الكرتون عدد الأقراص في كل علبة.

من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الامتياز وعنوانه: إينوفايد، م.ض، شارع بثير جنبم 55 ، ص.ب. 62، إيفن 40500.

اسم المنتج وعنوانه: زاكلادي فارماسيوتيكال بولفارما إس.آي، 83-200 ستاروجارد چدانسكي، بولندا.

تم إعدادها في آذار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

فاردينافيل إينوفايد 5 ملخ: 168-11-35973

فاردينافيل إينوفايد 10 ملخ: 168-12-36000

فاردينافيل إينوفايد 20 ملخ: 168-13-36001