

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986** يُسوق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

## فينجوليمود تيفغ

### كبسولات

التريكية

تحتوي كل كبسولة على:

فينجوليمود (كهيڤروكلوريد) 0.5 ملغ
Fingolimod (as HCl) 0.5 mg

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعالة ومسببات الأرجية انظر البند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي. لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرض كحل، لا تعمله لأخريين. قد يضرهم الدواء حتى لو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة. تناول الجرعة الأولى:

بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ يجب الخضوع للمراقبة من قبل فرد من الطاقم الطبي لمدة ست ساعات على الأقل. هذه التوصية ملائمة أيضاً إذا بدأت بالعلاج مرة أخرى بعد إيقاف العلاج بفينجوليمود تيفغ.

بعد تناول الكلمة بخصوص تناول الجرعة الأولى مفضلة في البند 2 "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء".

بالإضافة إلى النشرة الطبية، فإنه يوجد للمستهضر فينجوليمود تيفغ بطاقة معلومات وقائية لمثقي العلاج.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائية هامة، يتوجب عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج بفينجوليمود تيفغ وخلاه، وعليك اتباعها. يجب قراءة بطاقة المعلومات الوقائية لمثقي العلاج ونشرة المستهلك الطبية بعناية قبل البدء باستعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعلومات إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

#### 1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

فينجوليمود تيفغ مخصص لعلاج الأشكال الانتكاسية (النوبات) من مرض التصلب المتعدد، لتقليل عدد النوبات ولإبطاء تطور المشاكل البدنية (الإعاقة) الناجمة عن المرض.

#### الفصلية العلاجية

كابت التفتاني للجهاز المناعي

معاً للمستقبل سينجوزين-1-خوسفات

ما هو للتصلب المتعدد؟

التصلب المتعدد هو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي. في التصلب المتعدد، تقوم العملية الانتهازية بتدمير الغلاف الوائي (المسمى بالميلين الموجود حول الأعصاب في الجهاز العصبي المركزي، ويمنع الفعالية الاعتيادية للأعصاب (demyelination).

يتميز التصلب المتعدد من النوع الانتكاسي المتردد (relapsing-remitting) بنوبات متكررة (relapses) من أعراض الجهاز العصبي، تعكس التهابًا في الجهاز العصبي المركزي. قد تختلف الأعراض باختلاف مثقي العلاج، لكن الأعراض المميزة هي: صعوبات في المشي، إعدام الإحساس، مشاكل في الرؤية أو مشاكل في التوازن. قد تحدث أعراض النوبة المتكررة (relapse) تمامًا عندما تنتهي النوبة، لكن قد تبقى مشاكل معينة.

**كيف يعمل فينجوليمود تيفغ**

يساعد فينجوليمود تيفغ على حماية الجهاز العصبي المركزي من هجوم الجهاز المناعي في الجسم، عن طريق تقليل قدرة نوع معين من خلايا الدم البيضاء (الليغوفايات) على التحرك بحرية في الجسم ومنع وصولها إلى الدماغ والخلايا الشوكي. هذا الشيء يحدّ من الضرر الذي يسببه التصلب المتعدد للأعصاب. يخفف فينجوليمود تيفغ أيضًا جزءًا من رد الفعل المناعي للجسم.

#### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك أرجية (لديك حساسية مفرطة) لفينجوليمود أو لأي من المركبات التي يحتوي عليها الدواء، الوارد تفصيلها في البند 6 "معلومات إضافية". قد تشمل أعراض رد الفعل التشنجي، طفحًا جلديًا، شرى متيرًا للحكة (hives) أو انتفاخ التنفسي، اللسان أو الوجه.
- عانيت من نوبة قلبية، من ذبحة صدرية لا مستقرة (unstable angina) من سكتة دماغية أو من حادد دماغي عابر أو من أنواع معينة من قصور القلب في الأشهر الـ 6 الأخيرة.
- كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي من أنواع معينة من نظم القلب غير المنتظم أو غير العادي (اضطرابات النظم)، بما في ذلك مثقو العلاج الذين وُجدت لديهم الحالة القلبية المسماة QT الطويلة المشاهدة في تخطيط كهربية القلب قبل البدء بالعلاج بفينجوليمود تيفغ.
- كانت لديك مشكلة في نظم القلب تتطلب علاجًا بأدوية معينة. تحدث مع طبيبك قبل استعمال فينجوليمود تيفغ إذا كان لديك أحد هذه الأوضاع أو إذا لم تكن تعلم ما إذا كانت موجودة لديك.

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء**

**تناول الجرعة الأولى:**

قد يؤدي فينجوليمود تيفغ إلى إبطاء نظم قلبك، خاصةً بعد تناول الجرعة الأولى. سوف تخضع لفحص يسمى الكتروكارديوجرام (مخطط كهربية القلب) لفحص الفعالية الكهربية للقلب قبل تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ.

**سيبقى جميع مثقلي العلاج تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي لمدة 6 ساعات على الأقل بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ:**

- بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ:
- يجب فحص النبض وضغط الدم لديك كل ساعة
- عليك الخضوع لمراقبة فرد من الطاقم الطبي لروية ما إذا كانت لديك أية أعراض جانبية خطيرة. إذا تباطأ نظم القلب أكثر من اللازم، فقد تنشأ لديك أعراض مثل:
  - الدوار، التعب، الشعور كأن قلبك ينبض ببطء أو ينقص نبضة، الألم في الصدر.
- إذا وُجد لديك أحد أعراض نظم القلب البيئيء، فإنه سيحدث عادةً خلال الساعات الـ 6 الأولى من تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ. يمكن أن تحدث الأعراض خلال فترة أقصاها 24 ساعة بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ.
- بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ بـ 6 ساعات ستخضع لمخطط إضافي لكهربية القلب. إذا أظهر مخطط كهربية القلب أية مشاكل في القلب أو إذا كان نبض قلبك منخفضًا أكثر من اللازم أو واصل في الهبوط، فتواصل مع الخضوع للمراقبة.
- إذا كانت لديك أية أعراض جانبية خطيرة بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ، فحديداً تلك التي تتطلب العلاج بأدوية أخرى، فسيتبقى في المركز الطبي للمراقبة طوال الليل بالإضافة إلى ذلك، ستخضع لمراقبة أية أعراض جانبية خطيرة لمدة 6 ساعات على الأقل بعد تناول الجرعة الثانية من فينجوليمود تيفغ في الغد.
- إذا وُجدت لديك أنواع معينة من مشاكل القلب أو إذا كنت تستعمل أنواعًا معينة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على قلبك، فسيتبقى في المركز الطبي تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي طوال الليل بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ.
- سيعود نبض قلبك الطبيعي إلى الوضع العادي عادةً خلال شهر واحد بعد البدء بتناول فينجوليمود تيفغ. توجه فورًا إلى طبيبك أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب إذا كانت لديك أية أعراض لنض قلبي بطيء.
- إذا فوّتَ جرعة واحدة أو أكثر من فينجوليمود تيفغ، فقد تضطر إلى الخضوع لمراقبة فرد من الطاقم الطبي عندما تتناول الجرعة القادمة. توجه إلى طبيبك إذا فوّتَ جرعة من فينجوليمود تيفغ. انظر أيضًا "كيف تستعمل الدواء".

**يجب إعلام الطبيب عن كل أوضاعك الطبية قبل تناول فينجوليمود تيفغ، بما في ذلك إذا كان لديك في الماضي أو في الوقت الحاضر:**

- نظم قلبي غير منتظم أو غير عادي (اضطراب النظم)
- ماضٍ من السكتة الدماغية أو من حادد دماغي عابر
- مشاكل القلب، بما في ذلك النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية
- ماضٍ من حالات الإغماء المتكررة (فقدان الوعي)
- حمى أو تلوّث، أو إذا كنت قادر على محاربة التلوثات بسبب مرض أو كنت تستعمل الأن أو استعملت في الماضي أدوية تضعف جهازك المناعي
- تلقيت مؤخرًا لقاحًا أو أنك على وشك تلقّي لقاح
- جدري الماء أو إذا تلقيت لقاحًا لجدري الماء. قد يجري الطبيب فحصًا للدم لفيروس جدري الماء (الحماق). قد تضطر إلى تلقي المسئلة الكاملة لطعيمات جدري الماء ثم الانتظار شهرًا واحدًا قبل أن تبدأ بالعلاج بفينجوليمود تيفغ
- مشاكل في العينين، خاصة التهاب في العين يسمى التهاب العنينية (يوفيقيتيس)
- سكري
- مشاكل في التنفس، بما في ذلك أثناء النوم
- مشاكل في الكبد
- ضغط دم مرتفع
- أنواع من سرطان الجلد المسماة كارسينوما الخلايا القاعدية (BCC) أو الميلانوما
- استشيري رجاغ طبيبك قبل أن تحملي. عليك الامتناع عن الحمل خلال فترة استعمال فينجوليمود تيفغ أو خلال شهرين بعد إيقافه، بسبب خطر الإضرار بالجنين. انظري البند "الحمل والإرضاع" لاحقًا

**متلقو العلاج المسنون (فوق 65 عامًا)**

الخبرة بالعلاج بفينجوليمود تيفغ لدى الأشخاص المسنين محدودة.

يجب استعمال فينجوليمود تيفغ بحذر لدى متلقّي العلاج الذين عمرهم 65 عامًا فما فوق.

**الأولاد والمراهقون**

فينجوليمود تيفغ غير مخصص لعلاج الأولاد والمراهقين الذين عمرهم أقل من 18 عامًا.

#### الفحوص والمتابعة

قبل البدء بالعلاج:

فحوص كريات الدم البيضاء، فحص البصر، فحص الدم لفحص وظائف الكبد - كما هو مفصل في البند "الأعراض الجانبية".

قد يجري الطبيب فحصًا للدم لفيروس جدري الماء (الحماق).

للاطلاع على الفحوص المطلوبة عند تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ - انظر البند "تناول الجرعة الأولى" أعلاه.

خلال العلاج:

فحوص ضغط الدم، فحص الجلد، فحص البصر بعد البدء بالعلاج بـ 3 إلى 4 أشهر، فحص الدم لفحص وظائف الكبد - كما هو مفصل في البند "الأعراض الجانبية".

يجب طلب المشورة بالنسبة لفحص مسحة عنق الزرع الروتيني (مسحة باج) - كما هو مفصل في البند "الأعراض الجانبية".

**التفاعلات بين الأدوية**

قد يسبب استعمال فينجوليمود تيفغ سويًا مع أدوية أخرى أعراضًا جانبية خطيرة.

**إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأكبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصةً إذا كنت تستعمل:**

- أدوية تطيل المقطع QT** مثل سينالوبرام، كلوربرومازين، هالوبريدول، ميتانون وإيريثروميسين، لأن البدء بالعلاج بفينجوليمود تيفغ يسبب انخفاضًا في نظم القلب وقد يطيل المقطع QT.
- كيوتوكتازول** - دواء لعلاج التلوثات الفطرية. يجب أن يخضع مثقلي العلاج الذي يستعمل فينجوليمود تيفغ وكيوتوكتازول بشكل متزامن للمتابعة عن كثب لأن خطر نشوء أعراض جانبية يكون أكبر.
- الفلحاحات** - إذا كان عليك تلقّي لقاح، فتوجهَ أولاً لتلقي المشورة من طبيبك. لن يكون بإمكانك تلقّي لقاحات معينة تحتوي على فيروس سي (الفلحاحات المضغعة الحية) خلال العلاج ولمدة شهرين بعد انتهاء العلاج بفينجوليمود تيفغ، لأنها قد تسبب التلوث الذي يُفترض أن يمنع اللقاح. قد لا تعمل لقاحات أخرى جيدًا أيضًا إذا تم إعطاؤها خلال هذه الفترة.
- الأدوية المانعة للأورام، الأدوية الكابتة أو المعدلة للجهاز المناعي** (بما في ذلك الكورتيكوستيرويدات) - من المتوقع أن تزيد من خطر كبت الجهاز المناعي ويجب أخذ الحظر لتأثير إضافي على الجهاز المناعي بعين الاعتبار إذا تم إعطاء هذه الأدوية سويًا مع فينجوليمود تيفغ. عندما يتم استبدال العلاج بالأدوية ذات التأثير المتواصل على الجهاز المناعي مثل نالتازيدوماب، نيريفلونوميد أو ميتوكتاتزون، فإنه يجب أخذ مدة والية عمل هذه الأدوية بعين الاعتبار من أجل الامتناع عن تأثير إضافي وغير مقصود من الكبت المناعي عند البدء باستعمال فينجوليمود تيفغ.
- أدوية تنبئ نظم القلب والتوصيل الأذيني-البطيني.** مثل حاجبات بيتا، ديجوكسين أو حاصرات قناة الكالسيوم مثل ديلتازيم أو فيرإيميل. قبل البدء بالعلاج بفينجوليمود تيفغ، يجب استشارة الطبيب الذي وصف لك هذه الأدوية بالنسبة لإمكانية استبدالها بأدوية لا تنبئ نظم القلب والتوصيل الأذيني-البطيني.

**استعمال فينجوليمود تيفغ والطعام**

يمكن تناول فينجوليمود تيفغ مع الطعام أو بدون الطعام.

#### الحمل والإرضاع

**الحمل**

يجب إعلام طبيبك قبل استعمال فينجوليمود تيفغ إذا كنت حاملًا أو تخططين للحمل.

قد يضر فينجوليمود تيفغ جنينك.

أخبري طبيبك فورًا إذا حملت خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ أو إذا حملت خلال شهرين بعد إيقاف العلاج بفينجوليمود تيفغ.

- يجب عليك إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ قبل أن تحاولي إحداث حمل بشريين.
- إذا كان بإمكانك أن تحملي، فعليك استعمال وسيلة فعالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ ولمدة شهرين على الأقل بعد إيقاف العلاج.

#### الإرضاع

يجب إعلام طبيبك قبل استعمال فينجوليمود تيفغ إذا كنت مرضعًا أو إذا كنت تخططين للإرضاع.

ليس معلومًا ما إذا كان فينجوليمود تيفغ ينتقل إلى حليب الأم. استشيري طبيبك بالنسبة لأفضل طريقة لإطعام طفلك الرضيع، إذا كنت تستعملين فينجوليمود تيفغ.

#### السياقة واستعمال الماكينات

سيجربك الطبيب إذا كان مرضك يتيح لك سياقة السيارة، ركوب الدراجة الهوائية واستعمال الماكينات بشكل آمن. من غير المتوقع أن يكون لفينجوليمود تيفغ تأثير على قدرتك على السياقة واستعمال الماكينات.

مع ذلك، بعد تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ، عليك أن تبقى تحت مراقبة فرد من الطاقم الطبي لمدة 6 ساعات على الأقل. خلال هذا الوقت وربما أيضًا بعده، قد تكون قدرتك على السياقة واستعمال الماكينات مختلة.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

محتوى الصوديوم في كبسولة واحدة يقارب 0.045 ملغ. يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في كل كبسولة ولذلك يعتبر خاليًا من الصوديوم.

#### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب. عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

#### الجرعة الدوائية

الجرعة الدوائية وكيفية العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية المتبعة عادةً هي:

كبسولة واحدة في اليوم (0.5 ملغ من فينجوليمود).

**يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.**

#### كيفية تناول

للإعطاء عن طريق الفم

يجب تناول فينجوليمود تيفغ مرة واحدة في اليوم مع كأس ماء.

سيساهم تناول فينجوليمود تيفغ في نفس الساعة كل يوم في تذكر وقت تناول الدواء.

لا تتوفر معلومات بخصوص فتح الكبسولة ونثر محتواها.

**إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من اللازم**
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

**إذا نسيت تناول الدواء**

إذا نسيت تناول الجرعة الأولى من فينجوليمود تيفغ، فراجع الطبيب فورًا. قد تضطر إلى الخضوع لمتابعة فرد من الطاقم الطبي لمدة 6 ساعات على الأقل عندما تتناول الجرعة القادمة. إذا اضطرت إلى الخضوع لمتابعة فرد من الطاقم الطبي عندما تتناول الجرعة القادمة من فينجوليمود تيفغ فستخضع:

- فحص مخطط كهربية القلب قبل تناول الجرعة
- فحص النبض وضغط الدم كل ساعة بعد تناول الجرعة
- فحص مخطط كهربية القلب بعد تناول الجرعة بـ 6 ساعات

#### يجب المراقبة

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء، فقد تعود أعراض التصلب المتعدد وتتفاقم - انظر البند "التفاقم الشديد للتصلب المتعدد بعد إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ" في البند "الأعراض الجانبية". لا يجوز تناول الأدوية في العتمة<sup>١</sup> راجع الملصق وتأكد من الجرعة **في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

**مثل أي دواء** قد يؤدي استعمال فينجوليمود تيفغ إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تطلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

**قد يسبب فينجوليمود تيفغ أعراضًا جانبية خطيرة، بما في ذلك:**

- نظم قلبي بطيء (بطء القلب أو اضطراب النظم البطني)** عندما تبدأ بتناول فينجوليمود تيفغ، يستطع فينجوليمود تيفغ أن يسبب تباطؤًا في نظم قلبك، خاصةً بعد أن تتناول الجرعة الأولى. انظر التفاصيل في البند "تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء"، البند الفرعي "تناول الجرعة الأولى"
- تلوثات** - بإمكان فينجوليمود تيفغ أن يزيد من خطر نشوء تلوثات خطيرة في الشكلا وظمرا في الحياة وتسبب الموت. لا يجوز تلقّي لقاحات حية خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ ولمدة شهرين بعد إيقافك لاستعمال فينجوليمود تيفغ. كُلم طبيبك قبل أن تتلقى لقاحًا خلال فترة العلاج ولمدة شهرين بعد العلاج بفينجوليمود تيفغ. إذا تلقيت لقاحًا حيا، قد تصاب بالتلوث الذي يُفترض أن يمنع اللقاح. قد تكون اللقاحات أقل فعالية عند إعطائها خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ.
- الفيروس الحليمي (پاپيلوما) (HPV) - في أعقاب خطر التلوث بفيروس پاپيلوما، فإنه يجب استشارة طبيبك بالنسبة لفحص مسحة عنق الرحم الروتيني (مسحة باج).

يقفل فينجوليمود تيفغ عدد خلايا الدم البيضاء (الخلايا اللمفاوية) في دمك. تتم العودة إلى المستوى الطبيعي عادةً خلال شهرين من إيقاف العلاج. قد يجري طبيبك فحصًا للدم لمستوى خلايا الدم البيضاء لديك قبل أن تبدأ باستعمال فينجوليمود تيفغ. راجع طبيبك فورًا إذا كانت لديك أية أعراض التلوث طوال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ

ولمدة شهرين بعد الجرعة الأخيرة من فينجوليمود تيفغ:

حمى، تعب، آلام في الجسم، قشعريرة، غثيان، تغيرات، صداع مصحوب بالحمى، تسلب في الرقبة، حساسية للضوء، غثيان أو ارتباك (قد تكون هذه أعراضًا لالتهاب السحايا الدماغية، تلوث الأغشية حول الدماغ والعمود الفقري).

● **Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) - PML** من ثلوث نادر في الدماغ يؤدي عادة إلى الموت أو الإعاقة الشديدة. إذا نشأ PML، فإنه يحدث عادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي المضعف لكنه حدث أيضًا لدى أشخاص جهازهم المناعي غير مضعف. تتفاقم أعراض PML طوال أيام إلى أسابيع. توجه فورًا إلى طبيبك إذا كانت لديك أعراض PML، حذينة أو متفاكمة، وتستمر لمدة أيام بما في ذلك:

ضعف في جانب واحد من الجسم، فقدان التنسيق الحركي في الذراعين والرجلين، انخفاض في القوة، مشاكل في التوازن، تغيرات في الرؤية، تغيرات في التفكير أو في الذاكرة، ارتباك، تغيرات في الشخصية.

- مشكلة في الرؤية تسمى ودمة بقعية** - قد تسبب الودمة البقعية بعضًا من الأعراض المتعلقة بالرؤية كما هو الحال في نوبة التصلب المتعدد (التهاب في العصب البصري). قد لا تلاحظ أية أعراض للودمة البقعية، لكن إذا نشأت ودمة بقعية، فإنها تبدأ عادةً خلال الأشهر الـ 3 حتى الـ 4 الأولى بعد البدء بالعلاج بفينجوليمود تيفغ. يجب على طبيبك أن يفحص بصره قبل البدء بالعلاج بفينجوليمود تيفغ، و3- إلى 4 أشهر بعد البدء بالعلاج، أو في أي وقت تلاحظ فيه تغيرات في البصر خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ. سيكون الخطر لنشوء ودمة بقعية لديك أكبر إذا كان لديكسكري أو إذا كان لديك التهاب في العين يسمى التهاب العنينية (يوفيقيتيس). توجه فورًا إلى الطبيب إذا كان لديك واحد أو أكثر من بين ما يلي: ضبابية أو ظلال في مركز الرؤية لديك، بقعة عصابة في مركز الرؤية لديك، حساسية للضوء، رؤية ألوان (أصباغ) شاذة.

**أعراض جانبية خطيرة أخرى:**

**انفتاح وتضيق الأوعية الدموية في دماغك** حدثت حالة تسمى (Posterior Reversible Encephalopathy) PRES (Syndrome) بشكل نادر لدى متلقي العلاج الذين يستعملون فينجوليمود تيفغ. تحسن أعراض PRES عادةً عند التوقف عن استعمال فينجوليمود تيفغ. لكن دون علاج، قد تؤدي إلى سكتة دماغية. توجه فورًا إلى الطبيب إذا كان لديك واحد أو أكثر من بين الأعراض التالية:

صداع شديد فجائي، ارتباك فجائي، فقدان فجائي للبصر أو تغيرات أخرى في بصرك، اختلاجات.

● **ضرر للكبد.** قد يسبب فينجوليمود تيفغ ضررًا للكبد. يجب على طبيبك أن يجري فحصًا للدم لفحص كبدك قبل أن تبدأ باستعمال فينجوليمود تيفغ ويشكّل دورًا في خلال فترة العلاج. توجه فورًا إلى طبيبك إذا كان لديك واحد أو أكثر من بين أعراض الكبد التالية:

غثيان، تغيرات، ألم في البطن، تعب، فقدان الشهية، اصفرار الجلد أو بياض العينين، بول غامق.

● **مشاكل في التنفس.** لبعض الأشخاص الذين يستعملون فينجوليمود تيفغ يوجد ضيق في التنفس. توجه فورًا إلى الطبيب إذا كانت لديك مشاكل حذينة أو متفاكمة في التنفس.

● **التفاقم الشديد للتصلب المتعدد بعد إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ.** بعد إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ، قد تعود أعراض التصلب المتعدد وتتفاقم بالمقارنة مع ما كان قبل العلاج أو خلاله. الكثير من الأشخاص الذين حدث لديهم تفاقم في أعراض التصلب المتعدد بعد إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ لا يعودون إلى مستوى الأداء الوظيفي الذي كان عندهم قبل إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ. يحدث هذا التفاقم عادةً خلال 12 أسبوعًا بعد إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ، لكنه قد يحدث في وقت لاحق. كُلم طبيبك دائمًا قبل أن تتوقف عن استعمال فينجوليمود تيفغ لأي سبب كان. أخبر طبيبك إذا كان هناك تفاقم في أعراض التصلب المتعدد بعد إيقاف استعمال فينجوليمود تيفغ.

● **ضغط دم مرتفع.** يجب على طبيبك أن يفحص ضغط دمك خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ.

- أنواع من **سرطان الجلد المسماة كارسينوما الخلايا القاعدية (BCC) والميلانوما.** أخبر طبيبك إذا كانت هناك أية تغيرات في مظهر جلدك بما في ذلك التغيرات في الشامه، منطقة غامقة جديدة على جلدك، جرح لا يتعافى أو أورام على جلدك مثل نتوء قد يكون لامعًا، بياض كالثلوج، بلون الجلد أو وردنيًا. يجب على طبيبك أن يفحص جلدك لروية ما إذا كانت هناك أية تغيرات خلال فترة العلاج بفينجوليمود تيفغ. يجب عليك الحد من وقت المكوث تحت ضوء الشمس والوضوء فوق البنفسجي (UV). ارتد ملابس واقية واستعمل كريمًا واقيًا ذا معامل وقاية مرتفع.
- ردود فعل تحسسية.** توجه إلى طبيبك إذا كانت لديك أعراض لرد فعل تحسسي، بما في ذلك الطفح الجلدي، الشرى المثير للحكة أو انتفاخ الشفتين، اللسان أو الوجه.

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشره):

- صداع
- نتائج غير سوية لفحوص الكبد
- إسهال
- سعال
- إنفلونزا
- التهاب الجيوب الأنفية (سينوسيتيس)
- ألم في الظهر
- الم في منطقة البطن
- ألم في الذراعين أو الرجلين

أعراض جانبية شائعة (تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100):

- التهاب الشفتين الهوائية (بروكيتيس)
- التهرب النطاقي (هريس زونتر)
- السعفة المبرقشة
- صداع نصفي (ميجرينا)
- غثيان
- ضعف
- تساقط الشعر

التقران السعفي - ورم ما قبل السرطاني (actinic keratosis) ارتفاع في مستويات الجليسيريدات الثلاثية في الدم

- ضبابية الرؤية
- قلة الخلايا اللمفاوية (قلة اللمفاويات)
- قلة خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيض)
- پاپيلومة جلدية - ورم حميد على الجلد

تشتمل الأعراض الجانبية الأخرى التي تم التبليغ عنها على اختلاجات، دوار، التهاب الرئتين، إيكزيمًا وحكة.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.**

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية للمعوق وزارة الصحة (www.health.gov.au)، والذي يوجه إلى الإستمارة المتفصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، عن طريق النسخ إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.au

#### 5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسهم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول الأولاد وأول الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسهم. لا تسلب التقوِّض بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. date) المنون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### ظروف التخزين

**يجب تخزين الدواء في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية.** لا يجوز إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه الوسائل ستساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضًا على:

Pregelatinized starch, gelatin, titanium dioxide (E171), sodium lauryl sulphate, iron oxide yellow (E172), printing ink (black)

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوياته**

كيسولات صلبة تحتوي على مسحوق باللون الأبيض الكريمي، جسم الكبسولة أبيض معتم مطبوع عليه بالأسود TEVA 7820 وغطاء الكبسولة أصفر مطبوع عليه بالأسود TEVA 7820. حجم العبوة: 28 أو 30 كبسولة في لوحات (شروط حوصلات - بليستر).

قد لا تسوق جميع أحجام العبوة.

**اسم المصنِّع وصاحب الامتياز وعنوانه**

تيفغ إسرإيل م.ض،

شارع دوفره هانيفينه 124، تل أبيب 6944020.

تم تحرير هذه النشرة في آذار/مارس 2022 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 157-40-34718 من أجل التبسيط والتسهيل للقراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

FINGOLIMOD TABS PL MW0322

## teva