

نشرة للمريض وفقاً للوائح (المنتجات) الصيدلانية لعام 1986

هذا الدواء يصرف بواسطة وصفة من طبيب فقط

ديسكوفي® 200 ملغم/10 ملغم

ديسكوفي® 200 ملغم/25 ملغم

أقراص مطلية بغشاء

المواد الفعالة: يحتوي كل قرص على-

- ديسكوفي 200 ملغم/10 ملغم
إيمتريسيتابين emtricitabine
تينوفوفير ألفيناميد tenofovir alafenamide
200 ملغم
- ديسكوفي 200 ملغم/25 ملغم
إيمتريسيتابين emtricitabine
تينوفوفير ألفيناميد tenofovir alafenamide
200 ملغم
25 ملغم

المواد غير الفعالة والمؤرجات: انظر القسم 6 "معلومات إضافية".

اقرأ هذه النشرة كلها بعناية قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك. تحتوي هذه النشرة على معلومات مهمة عن هذا الدواء. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك أو الصيدلي. احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى. لقد تم وصف هذا الدواء فقط لعلاج مرضك. لا تعطه إلى آخرين، فقد يضرهم، حتى لو كانت أعراض المرض عندهم هي نفس ما لديك. إذا حصلت لك أي تأثيرات جانبية فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. وتشتمل هذه على أي تأثيرات جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

يهدف هذا الدواء للبالغين واليافعين الذين أعمارهم 12 عاماً فما فوق، والذين لا تقل أوزانهم عن 35 كلغم.

1. ما هو الغرض من هذا الدواء

يستعمل ديسكوفي بتركيبية مع أدوية أخرى لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية 1 (HIV 1) في البالغين واليافعين الذين أعمارهم 12 عاماً فما فوق، والذين لا تقل أوزانهم عن 35 كلغم.

يحصر ديسكوفي عمل إنزيم المنتسخة العكسية، الذي هو ضروري لتكاثر الفيروس. وبهذا فإن ديسكوفي يقلل من كمية فيروس نقص المناعة البشرية في جسمك.

المجموعة العلاجية:

يحتوي ديسكوفي على اثنتين من المواد الفعالة:

- إيمتريسيتابين emtricitabine، دواء مضاد للفيروسات القهقرية يعرف باسم مثبط نيوكليوسايد المنتسخة العكسية (NRTI)
- تينوفوفير ألفيناميد tenofovir alafenamide، دواء مضاد للفيروسات القهقرية يعرف باسم مثبط نيوكليوتايد المنتسخة العكسية (NtRTI)

2. قبل تناول الدواء

لا تتناول هذا الدواء

- إذا كانت لديك حساسية لكل من إيمتريسيتابين emtricitabine، أو تينوفوفير ألفيناميد tenofovir alafenamide أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (انظر القسم 6 "معلومات إضافية").

ⓘ تحذيرات خاصة لها علاقة باستعمال الدواء

يجب أن تبقى تحت رعاية طبيبك أثناء تناولك ديسكوفي.

لا يزال بإمكانك نقل فيروس نقص المناعة البشرية أثناء تناول هذا الدواء، على الرغم من أن المخاطر تنخفض عن طريق علاج فعال بمضادات الفيروسات القهقرية. ناقش مع طبيبك الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة أشخاص آخرين. هذا الدواء ليس علاجًا شافيًا لفيروس نقص المناعة البشرية. قد لا تزال تتطور لديك عدوى أو أمراض أخرى مرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء تناولك ديسكوفي.

تحدث مع طبيبك قبل تناول ديسكوفي:

- إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو عانيت من أمراض في الكبد، بما في ذلك التهاب الكبد. إن المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد بما في ذلك التهاب الكبد المزمن B أو C، والذين يتم علاجهم باستخدام مضادات الفيروسات القهقرية، يكونون أكثر عرضة لمضاعفات كبدية خطيرة ويحتمل أن تكون مميتة. إذا كان لديك عدوى التهاب الكبد B، فسينظر طبيبك بعناية في أفضل نظام علاجي لك.
- إذا كانت لديك عدوى التهاب الكبد B، فقد تصبح مشاكل الكبد أسوأ بعد التوقف عن تناول ديسكوفي. لا تتوقف عن تناول ديسكوفي دون التحدث مع طبيبك: انظر القسم 3، لا تتوقف عن تناول ديسكوفي.
- قد يختار طبيبك ألا يصف لك ديسكوفي إذا كان للفيروس الذي أصبت به محور مقاومة معين، نظرًا إلى أن ديسكوفي يمكن أن يكون غير قادر على تقليل كمية فيروس نقص المناعة البشرية في جسمك بصورة فعالة.
- إذا كنت مصابًا بمرض كلوي أو أظهرت الاختبارات وجود مشاكل في كليتيك. فقد يطلب طبيبك إجراء اختبارات دم لمراقبة وظائف كليتيك عند بدء العلاج بديسكوفي وأثناءه.

أثناء تناولك الدواء

حال بدء تناولك ديسكوفي، لاحظ ما يلي:

- علامات التهاب أو عدوى
- آلام المفاصل، أو تصلب أو مشاكل في العظام

← إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فأخبر طبيبك فورًا. لمزيد من المعلومات انظر القسم 4، التأثيرات الجانبية.

وعلى الرغم من عدم ملاحظة مشاكل في الكلى مع تناول ديسكوفي، إلا إن هناك احتمالاً أن تواجه مشاكل في الكلى عند تناول ديسكوفي على مدى فترة طويلة من الزمن (انظر تحذيرات واحتياطات).

الأدوية الأخرى و ديسكوفي

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية والمكملات الغذائية. قد يتفاعل ديسكوفي مع الأدوية الأخرى. ونتيجة لذلك، قد تتغير كميات ديسكوفي أو غيرها من الأدوية في دمك. وهذا قد يوقف دواءك عن العمل بشكل صحيح، أو يجعل أي تأثيرات جانبية أسوأ. وفي بعض الحالات، قد يحتاج طبيبك إلى ضبط الجرعة أو فحص مستويات الدم.

الأدوية المستعملة في علاج التهاب الكبد B:

يجب ألا تتناول ديسكوفي مع الأدوية التي تحتوي على:

- تينوفوفير الأفينامايد **tenofovir alafenamide**
- تينوفوفير دايزوبروكسيل **tenofovir disoproxil**
- لاميفودين **lamivudine**
- أديفوفير دايبيفوكسيل **adefovir dipivoxil**

← أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية.

أنواع أخرى من الأدوية:

تحدث مع طبيبك إذا كنت تتناول:

- المضادات الحيوية، وتستعمل لعلاج الإصابات البكتيرية بما في ذلك السل، وتحتوي على:
 - ريفامبين rifabutin، و ريفامبيسين rifampicin، و ريفابنتين rifapentine
- الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية
 - إيمتريسيتابين emtricitabine و تيرانافير tipranavir
- الأدوية المضادة للاختلاج، تستعمل لعلاج الصرع، مثل:
 - كاربامازيبين carbamazepine وأوكسكاربازيبين oxcarbazepine والفينوباربيتال phenobarbital والفينيتوين phenytoin
- العلاجات العشبية، تستعمل لعلاج الاكتئاب والقلق والتي تحتوي على:
 - نبتة سانت جون (*Hypericum perforatum*)

← أخبر طبيبك إذا كنت تتناول هذه الأدوية أو أي أدوية أخرى. لا تتوقف عن علاجك دون الاتصال بطبيبك.

تناول الدواء والطعام

تناوله مع الطعام أو بدونه.

الحمل والرضاعة الطبيعية

- إذا كنت حاملاً أو ترضعين طفلك طبيعيًا، أو تعتقد أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين لإنجاب طفل، فاسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.
- أخبر طبيبك على الفور إذا أصبحت حاملاً وأسأليه عن الفوائد والمخاطر المحتملة للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية لك ولطفلك.

إذا كنت قد تناولت ديسكوفي خلال حملك، فإن طبيبك قد يطلب إجراء اختبارات دم عادية واختبارات تشخيصية أخرى لرصد تطور طفلك. وفي الأطفال الذين تناولت أمهاتهم عقاقير NRTIs خلال فترة الحمل، تفوق الاستفادة من الحماية ضد فيروس نقص المناعة البشرية خطر التأثيرات الجانبية.

لا ترضعي طفلك طبيعيًا أثناء العلاج بديسكوفي. ذلك لأن بعض المواد الفعالة في هذا الدواء تمر في حليب الثدي. فمن المستحسن أن لا ترضعي طفلك طبيعيًا لتجنب انتقال الفيروس إلى الطفل في حليب الثدي.

قيادة العربات واستخدام الماكينات

يمكن لديسكوفي أن يسبب الدوخة. إذا كنت تشعر بالدوار عند تناول ديسكوفي فلا تُقَدُ عربة ولا تستعمل أي ماكينات أو آلات.

الأطفال والياقون

لا تُعطَ هذا الدواء للأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل، أو وزنهم أقل من 35 كلغم. لم تتم بعد دراسة استعمال ديسكوفي في الأطفال الذين يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل.

يحتوي ديسكوفي على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغم) في كل قرص، وهذا يعني أنه "خالٍ من الصوديوم" بشكل أساسي.

3. كيف تتناول ديسكوفي

دائمًا تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك طبيبك به. ستحدد الجرعة والعلاج من قبل طبيبك فقط. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الجرعة الموصى بها هي:

البالغون: قرص واحد يوميًا مع أو بدون الطعام
الياقون من هم 12 عامًا من العمر وأكبر، والذين وزنهم 35 كغم على الأقل: قرص واحد يوميًا مع أو بدون الطعام

لا تتجاوز الجرعة الموصى بها.

يوصى بعدم مضغ القرص أو سحقه نظرًا إلى أن له مذاقًا مرًا.

إذا واجهتك صعوبة في ابتلاع الأقراص كاملة، يمكنك تقسيمها إلى نصفين. تناول نصف القرص واحدًا تلو الآخر للحصول على الجرعة الكاملة. لا تخزن القرص المقسوم.

تناول دوائياً الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب. وهذا للتأكد من أن دوائك فعال تماماً، ومن أجل تقليل خطر الإصابة بالمقاومة للعلاج. لا تغير الجرعة ما لم يخبرك طبيبك بذلك.

إذا كنت تخضع للغسيل الكلوي، فتناول جرعتك اليومية من ديسكوفي بعد إكمال الغسيل الكلوي.

إذا تناولت الدواء أكثر مما يجب

إذا كنت قد تناولت عن غير قصد جرعة أكثر من الجرعة الموصى بها من ديسكوفي، أو أن طفلاً قد ابتلع الدواء عن غير قصد، فقد تكون في خطر متزايد للتعرض للتأثيرات الجانبية المحتملة لهذا الدواء (انظر القسم 4، *التأثيرات الجانبية*). اتصل بطبيبك أو أقرب قسم للطوارئ على الفور للحصول على المشورة. احتفظ بقنينة الأفراس معك بحيث يمكنك بسهولة وصف ما كنت قد تناولته.

إذا كنت قد نسيت تناول الدواء

من المهم أن لا تنسى تناول جرعة من ديسكوفي.

إذا نسيت تناول جرعة منه:

- إذا لاحظت ذلك في غضون 18 ساعة من الوقت الذي عادة ما تتناول فيه ديسكوفي، يجب أن تتناول قرصاً في أقرب وقت ممكن. ثم تناول الجرعة التالية كالمعتاد.
- إذا لاحظت ذلك بعد 18 ساعة أو أكثر من الوقت الذي عادة ما تتناول فيه ديسكوفي، فلا تتناول الجرعة المنسية. انتظر وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

إذا تقيأت بعد أقل من ساعة واحدة من تناول ديسكوفي، فتناول قرصاً آخر.

لا تتوقف عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول ديسكوفي دون التحدث مع طبيبك. إن وقف تناول ديسكوفي يمكن أن يؤثر تأثيراً خطيراً على عمل العلاج مستقبلاً. إذا تم إيقاف تناول ديسكوفي لأي سبب من الأسباب، فتحدث إلى طبيبك قبل إعادة تناول أقراس ديسكوفي.

عندما تبدأ كمية دواء ديسكوفي عندك في الانخفاض، احصل على المزيد من طبيبك أو الصيدلي. هذا مهم جداً لأن كمية الفيروس قد تبدأ في الزيادة إذا توقفت عن تناول الدواء حتى لو كان لبضعة أيام. قد يصبح المرض أكثر صعوبة في العلاج.

إذا كنت مصاباً بكل من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B، فمن المهم جداً عدم التوقف عن تناول ديسكوفي دون استشارة طبيبك أولاً. قد تتطلب اختبارات للدم لعدة أشهر بعد التوقف عن العلاج. وفي بعض المرضى الذين يعانون من مرض الكبد المتقدم أو تليف الكبد، قد يؤدي وقف العلاج إلى تفاقم التهاب الكبد، والذي قد يكون مهدداً للحياة.

← أخبر طبيبك فوراً عن أعراض جديدة أو غير عادية بعد توقفك عن العلاج، وخاصة الأعراض التي تربطها بعدوى التهاب الكبد B.

لا تتناول الدواء في الظلام. تحقق من الملمص والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ارتد النظارات إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى عن استعمال هذا الدواء، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. التأثيرات الجانبية

مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يسبب تأثيرات جانبية، على الرغم من أنها لا تحصل عند الجميع.

لا تقلق أثناء قراءة قائمة التأثيرات الجانبية. فقد لا يحصل لك أي منها.

التأثيرات الجانبية الخطيرة المحتملة: أخبر الطبيب فوراً

- أي علامات التهاب أو عدوى. في بعض المرضى الذين يعانون من إصابة متقدمة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والذين لديهم أمراض انتهازية في الماضي (العدوى التي تحدث في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي)، فإن علامات وأعراض التهاب من عدوى سابقة قد تحدث بعد وقت قصير من بدء العلاج المضاد لفيروس نقص المناعة البشرية.

ويعتقد أن هذه الأعراض هي نتيجة لحدوث تحسن في الاستجابة المناعية للجسم، ومساعدة الجسم على محاربة العدوى التي قد تكون موجودة مع عدم وجود أعراض واضحة.

- اضطرابات المناعة الذاتية (عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم الصحية)، قد تحدث أيضًا بعد البدء بتناول الأدوية المضادة لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. قد تحدث اضطرابات المناعة الذاتية بعد عدة أشهر من بدء العلاج. انتبه لأي أعراض للعدوى أو أعراض أخرى مثل:

- ضعف العضلات
- ضعف يبدأ في اليدين والقدمين ويتحرك صعودًا نحو جذع الجسم
- خفقان أو رعاش أو فرط النشاط

← إذا لاحظت أيًا من التأثيرات الجانبية المذكورة أعلاه، فأخبر طبيبك فورًا.

التأثيرات الجانبية الشائعة جدًا

(قد تؤثر على أكثر من 1 في 10 أشخاص)

- شعور بالغثيان (الغثيان)

التأثيرات الجانبية الشائعة

(قد تؤثر على ما يصل إلى 1 في 10 أشخاص)

- أحلام غير طبيعية
- صداع
- دوخة
- إسهال
- تقيؤ
- آلام في المعدة
- الريح (الغازات)
- طفح جلدي
- التعب (التعب)

التأثيرات الجانبية غير الشائعة

(قد تؤثر على ما يصل إلى 1 في 100 شخص)

- انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)
- مشاكل في الهضم ما يؤدي إلى عدم الراحة بعد وجبات الطعام (عسر الهضم)
- تورم في الوجه والشفنتين واللسان أو الحلق (وذمة وعائية)
- حكة (الحكة)
- الشرى (الأرتكاريا)
- آلام المفاصل (الم مفصلي)

← إذا أصبح أي من التأثيرات الجانبية خطيرًا فأخبر طبيبك.

التأثيرات الأخرى التي يمكن أن تشاهد أثناء علاج فيروس نقص المناعة البشرية

إن تواتر التأثيرات الجانبية التالية ليس معروفًا (لا يمكن تقدير التواتر من البيانات المتاحة).

- مشاكل العظام. بعض المرضى الذين يتناولون توليفة من الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مثل ديسكوفي قد يظهر عندهم مرض في العظام يدعى تنخر العظم (موت أنسجة العظم الذي يسببه فقدان تدفق الدم إلى العظم). إن تناول هذا النوع من الأدوية لفترة طويلة، مع الستيرويدات القشرية وشرب الخمر ووجود جهاز مناعة ضعيف جدًا وزيادة الوزن، قد يكون بعضًا من كثير من عوامل خطر الإصابة بهذا المرض. علامات تنخر العظم هي:

- تصلب المفاصل
- آلام في المفاصل (وخاصة في الورك والركبة والكتف)
- صعوبة في الحركة

← إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض فأخبر طبيبك.

قد تكون هناك زيادة في الوزن ومستويات الدهون في الدم والغلوكوز خلال علاج فيروس نقص المناعة البشرية. ويرتبط هذا جزئيًا باستعادة أسلوب الصحة والحياة، وفي حالة نسبة الدهون في الدم فهي أحيانًا بسبب أدوية علاج فيروس نقص المناعة البشرية نفسها. سوف يقوم طبيبك بإجراء اختبار لهذه التغييرات.

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية

إذا حصلت لك أي تأثيرات جانبية، فتحدث مع طبيبك أو الصيدلي. ويشتمل ذلك على أي تأثيرات جانبية محتملة غير المدرجة في هذه النشرة. يمكنك الإبلاغ عن أي تأثيرات جانبية إلى وزارة الصحة من خلال النقر على الرابط "الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية الناتجة من العلاج الطبي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يعيد توجيهك إلى نموذج الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية عبر الإنترنت أو من خلال النقر على الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الإبلاغ عن أي تأثيرات جانبية عن طريق عنوان الإيميل التالي لحامل التسجيل: DrugSafety.Israel@gilead.com.

5. كيف تخزن الدواء

امنع التسمم! احفظ هذا الدواء بعيدًا عن نظر ومتناول الأطفال و/أو الرضع. وبهذه الطريقة سوف تمنع التسمم. لا تقم بتحريض القيء دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الكارتون والقنينة بعد أحرف {EXP}. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

لا توجد شروط تخزين خاصة. يُوصى بتخزينه في درجة حرارة الغرفة.

يخزن في العبوة الأصلية من أجل حمايته من الرطوبة. احفظ القنينة مغلقة بإحكام.

لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعمل. من شأن هذه التدابير أن تساعد في حماية البيئة.

6. معلومات أخرى

ماذا يحتوي الدواء

المواد الفعالة هي إيمتريسيتابين emtricitabine و تينوفوفير الأفينامايد tenofovir alafenamide.

- ديسكوفي 200 ملغم/10 ملغم كل قرص مطلي من ديسكوفي يحتوي على 200 ملغم من إيمتريسيتابين emtricitabine وفومارات تينوفوفير الأفينامايد tenofovir alafenamide fumarate التي تعادل 10 ملغم من تينوفوفير الأفينامايد tenofovir alafenamide.
- ديسكوفي 200 ملغم/25 ملغم كل قرص مطلي من ديسكوفي يحتوي على 200 ملغم من إيمتريسيتابين emtricitabine وفومارات تينوفوفير الأفينامايد tenofovir alafenamide fumarate التي تعادل 25 ملغم من تينوفوفير الأفينامايد tenofovir alafenamide.

المكونات الأخرى هي

لب القرص:

سليولوز بلوري مكروي، كروسكارميلوز الصوديوم، وستيرات المغنيسيوم.

- ديسكوفي 200 ملغم/10 ملغم

الطلاء المغلف للقرص:

كحول عديد الفينيل متحلل مائيًا جزئيًا، ثاني أكسيد التيتانيوم، ماكروغول/بولي إيثيلين غليكول 3350، طلق، أكسيد الحديد الأسود.

- ديسكوفي 200 ملغم/25 ملغم

الطلاء المغلف للقرص:

كحول عديد الفينيل متحلل مائيًا جزئيًا، ثاني أكسيد التيتانيوم، ماكروغول/بولي إيثيلين غليكول 3350، طلق، أزرق FD&C رقم 2/بحيرة الألومنيوم النيلي القرمزي.

ما هو شكل الدواء وما هي محتويات العبوة

- ديسكوفي 200 ملغم/10 ملغم أقراص ديسكوفي المطلية هي ذات لون رمادي، مستطيلة الشكل أبعادها 12.5 x 6.4 مم تقريبًا ومطبوع عليها في أحد الجوانب الحروف "GSI" والرقم "210" على الجانب الآخر من القرص.

- ديسكوفي 200 ملغم/25 ملغم
أقراص ديسكوفي المطلية هي ذات لون أزرق، مستطيلة الشكل أبعادها 12.5 x 6.4 مم تقريباً ومطبوع عليها في أحد الجوانب الحروف "GSI" والرقم "225" على الجانب الآخر من القرص.

تتوفر ديسكوفي في قنينة تحتوي على 30 قرصاً (مع هلام السيليكا المجفف الذي يجب أن يبقى في القنينة للمساعدة في حماية الأقراص). ويوجد هلام السيليكا المجفف في كيس منفصل أو أسطوانة ويجب عدم بلعه.

يتوفر حجم العبوة التالي: كارتون خارجي فيه قنينة واحدة تحتوي على 30 قرصاً مطلياً.

حامل التسجيل: جلعاد للعلوم إسرائيل المحدودة، 4 شارع هاهاراش، هود هاشارون بزنس بارك، 4524075، إسرائيل
الشركة المصنعة: جلعاد ساينسز أيرلندا يو سي، بارك أي دي إيه بزنس وتكنولوجيا، كاريغتهيل، مقاطعة كورك، أيرلندا

رقم ترخيص الدواء في سجل الأدوية الوطني التابع لوزارة الصحة:

• أقراص ديسكوفي 200 ملغم/10 ملغم: 34949

• أقراص ديسكوفي 200 ملغم/25 ملغم: 34950

لبساطة وسهولة القراءة، فقد تمت كتابة نص هذه النشرة بصيغة المذكر. ومع ذلك، فالمقصود أن الدواء يستعمل لكلا الجنسين.

تمت المراجعة في يناير 2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة (MoH).

المرجع: تسمية الاتحاد الأوروبي من مايو 2021.

IL- APR22-EU- MAY21