

محلول مرکز لتحضير محلول للتسرير

المادة الفعالة:

كل قنietة محلول مرکز تحتوي على 350 ملغم سيميليماب في 7 مل (Cemiplimab 50 mg/ml)

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

إذا وجد لديك أي عرض جانبي، توجه للطبيب. هذا يشمل أعراضًا جانبية ليست مدونة في هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

بالإضافة للنشرة، توفر للمستحضر ليبيتايو بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج و خلال العلاج بـليبيتايو والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ليبيتايو كعلاج منفرد يستعمل لعلاج كبار:

• لديهم سرطان جلد يسمى سرطانة جلدية نقيالية أو ذات إختراق موضعي من نوع الخلايا الحرشفية (CSCC) الذين هم ليسوا مرشحين لعملية جراحية أو لعلاج بالأشعة.

• لديهم سرطان جلد يسمى سرطانة الخلايا القاعدية (BCC) النقياني أو ذو إختراق موضعي، الذين تلقوا علاجاً بمثبط المسار القنفذ (Hedgehog) حيث أن العلاج لم يساعد أو لم يكن بالإمكان تحمله.

الفصيلة العلاجية

دواء مضاد للسرطان؛ ضد وحيد النسيلة.

آلية العمل

ليبيتايو عبارة عن دواء لعلاج السرطان يحتوي على المادة الفعالة سيميليماب، التي هي ضد وحيد النسيلة.

يعمل ليبيتايو عن طريق مساعدة جهاز المناعي على محاربة السرطان.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أميرجي) لـ سيميليماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها ليبيتايو (انظر الفقرة 6).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـليبيتايو إحك للطبيب إذا:

- وُجد لديك مرض مناعي ذاتي (حالة يهاجم فيها الجسم الخلايا الخاصة به). - إنجزت زراعة عضو، إنجزت في الماضي أو من المخطط أن تجتاز زراعة نخاع عظم من شخص آخر (زراعة خلايا جذعية (stem cell) مكونة للدم، خيفية).

- وُجد لديك مشاكل في الرئتين أو في التنفس.

- وُجد لديك مشاكل في الكبد.

- وُجد لديك مشاكل في الكل.

- وُجد لديك سكري.

- وُجد لديك أي حالة طبية إضافية.

إذا إنطبقت عليك إحدى البنود المذكورة أعلاه، أو إذا لم تكن واثقاً، توجه للطبيب أو للممرضة، قبل إستعمال ليبيتايو.

الأطفال والمرأهقون

ليبيتايو غير مخصص للأطفال وللمراهقين دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

خلال العلاج سيجري لك الطبيب فحوص دم، لمتابعة أعراض جانبية معينة.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أو من شأنك إستعمال أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب بالأخص إذا كنت تستعمل أو إستعملت ذات مرة إحدى الأدوية التالية:

- إيديلاليسيب (دواء للسرطان)

- أدوية التي تضعف جهاز المناعي. مثلاً، كورتيكوستيروئيدات مثل بيردينزيون. قد تعرقل هذه الأدوية من تأثير ليبيتايو. لكن، من الجائز أنه خلال العلاج بـليبيتايو، من شأن الطبيب أن يعطيك كورتيكوستيروئيدات، لتقليل الأعراض الجانبية، التي من الجائز أن تحدث لك عند العلاج بـليبيتايو.

الحمل، الإرضاع والخصوصية**الحمل**

إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك قبل العلاج بـليبيتايو.

قد يلحق ليبيتايوضرر بجنينك.

إحكى للطبيب فوراً، إذا أصبحت حاملاً خلال العلاج بـليبيتايو.

- إذا كنت في عمر الخصوبة، فعليك إستعمال وسائل منع حمل ناجحة، من أجل منع حصول حمل:
 - خلال فترة علاجك بـليبيتايو وكذلك،
 - أربعة أشهر على الأقل بعد تلقي المقدار الدوائي الأخير.
- إستشيري الطبيب بخصوص وسائل منع الحمل التي يتوجب عليك إستعمالها خلال هذه الفترة.

- إذا كنت مريضة أو تخططين للإرضاع، إستشيري الطبيب قبل العلاج بـليبيتايو.
- لا يجوز الإرضاع أثناء علاجك بـليبيتايو، ولمدة أربعة أشهر على الأقل بعد تلقي المقدار الدوائي الأخير.
- لا يعرف فيما إذا كان ليبيتايو ينتقل إلى حليب الأم الخاص بك.

- السياقة وإستعمال الماكولات
 - ليبيتايو تأثير ضئيل أو معروف على قدرتك على السياقة أو على إستعمال الماكولات من قبلك. مع ذلك، إذا شعرت بإرهاق، فلا تقم بالسياقة ولا تُشغل ماقنات إلى أن تشعر بشكل أفضل.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب دائماً إستعمال ليبيتايو حسب تعليمات الطبيب.
- عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

- يُعطى ليبيتايو بالتنقيط داخل الوريد (تسريب داخل الوريد).
- يستمر التسريب حوالي 30 دقيقة.
- يُعطى ليبيتايو عادة كل 3 أسابيع.

المقدار الدوائي
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة مقدار دوائي ذو 350 ملغم. يحدد الطبيب كم تتلقي من ليبيتايو، وكم علاجات تحتاج. سيجري لك الطبيب خلال العلاج فحوص دم، لمتابعة أعراض جانبية معينة.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به

إذا لم تحضر للعلاج بـليبيتايو
إنصل بطببك بأسرع ما يمكن لتحديد موعد جديد. من المهم جداً لا تفوّت علاجاً بـليبيتايو. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.**إذا توقفت عن تلقي ليبيتايو**

لا يجوز التوقف عن إستعمال ليبيتايو بدون إستشارة الطبيب. إن التوقف عن إستعمال الدواء قد يوقف تأثير الدواء.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

MAT>843060

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ليبيتايو قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن لا تعانى أيًّا منها. يتحدث معك طببك عن تلك الأعراض ويشرح لك عن مخاطر وفوائد علاجك.

يُعمل ليبيتايو على جهازك المناعي الخاص بك وقد يؤدي إلى إلتهابات في أجزاء مختلفة من جسمك. الحالات الإلتهابية قد تسبب أضراراً خطيرة في جسمك لا بل قد تسبب الوفاة في حالات معينة حيث يتطلب الأمر العلاج أو التوقف عن العلاج بـليبيتايو. الأعراض الجانبية قد تظهر في أي وقت خلال العلاج لا بل بعد إنتهاء العلاج. من الجائز أن يكون لديك أكثر من عرض جانبي واحد في نفس الوقت.

تجه للتلقي علاجاً طبيعياً طارئاً إذا وجد لديك أي علامة أو عرض (symptom) من الأعراض التالية، أو إذا تفاقمت:

- مشاكل جلدية - مثل طفح أو حكة، حويصلات جلدية أو تقرحات في الفم أو في نسيج مخاطي آخر.

- مشاكل في الرئتين (إلتهاب في النسيج الرئوي (pneumonitis)) - مثل سعال جديـد أو تفاقـم السعالـ الحاليـ، ضيقـ فيـ التنفسـ أوـ الـ صـدرـ.

- مشاكل في الأمعاء (إلتهاب القولون (colitis)) - مثل إسهالـات متكرـرة، تترافقـ فيـ أحـيانـ متـقارـبةـ بـدـمـ أوـ مـخـاطـ، حـركةـ معـوـيةـ أكـثرـ منـ المـعتـادـ، بـراـزـ أسـودـ يـشـبـهـ الزـفـتـ، ألمـ شـدـيدـ فيـ الـبـطـنـ أوـ حـسـاسـيـةـ فيـ الـبـطـنـ.

- سعال، إلتهاب الرئتين
- ردود فعل تتعلق بالتسريب
- إلتهاب في الكبد
- إلتهاب في الأمعاء (إسهال)، حركات معوية أكثر من الوضع الإعتيادي، براز أسود أو شبيه بالزفت، ألم شديد أو حساسية في البطن
- عدم سلامة نتائج وظائف الكلية
- إلتهاب في جوف الفم
- إلتهاب في الأعصاب، الذي يؤدي إلى نخر/ وخز، خدر، ضعف أو ألم حارق في الذراعين أو في الرجلين
- إلتهاب في الكلى
- ألم في المفاصل، إنتفاخ، إلتهاب مفصلي متعدد (polyarthritis) وإنصباب مفصلي (Effusion).
- أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):
 - إلتهاب عضلة القلب الذي من الجائز أن يظهر على شكل ضيق في التنفس، عدم إنتظام نظم القلب، الشعور بإرهاق أو ألم في الصدر
 - إلتهاب في الغدة الدرقية
 - إنخفاض في إفراز الهرمونات التي تتجهها الغدة الكظرية (adrenal)
 - ضعف في العضلات
 - إلتهاب في الغدة النخامية (hypophysis) المتوضعة في قاعدة الدماغ
 - إلتهاب في غلاف القلب
 - جفاف في أجزاء متعددة من الجسم، من الفم إلى العينين، الأنف، الحنجرة والطبقات العلوية للجلد
 - إلتهاب السحايا والحبال الشوكية الناجم عادة عن تلوث سكري من نوع 1، الذي قد يشمل زيادة الشعور بالجوع أو العطش مقارنة بالحالة الإعتيادية، الحاجة للتبول بوتيرة أعلى من المعتاد، إنخفاض في الوزن والشعور بإرهاق أو حموضة كيتوني سكري
 - ألم في العينين، تهيج، حكة أو إحمرار؛ حساسية للضوء التي تسبب الإنزعاج
 - ألم في العضلات أو تصلب (آلام عضلية روماتيزمية)
 - إلتهاب في العضلات (myositis) الذي من شأنه أن يشمل ألم أو ضعف عضلي
 - كدمات في الجلد أو نزف
 - إلتهاب مؤقت في الأعصاب، الذي يؤدي إلى ألم، ضعف وشلل في الأطراف.
 - حالة تصبح فيها العضلات ضعيفة وتصاب بالإرهاق بسهولة، ألم عضلي.
- أعراض جانبية شيوخها غير معروفة (أعراض شيوخها لم يحدد بعد):
 - رفض عضو مزروع
 - إلتهاب المثانة البولية. علامات وأعراض (symptoms) التي من شأنها أن تشمل التبول المتكرر و/أو ألم عند التبول، الإلتحاح البولي، دم في البول، ألم أو ضغط في أسفل البطن.
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
- بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسرب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. خزن في البراد (2-8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

من لحظة التحضير عن طريق خلط المستحضر داخل كيس للتسريب، بالإمكان تخزين ليبيتايو قبل الإستعمال لمدة لا تزيد عن 8 ساعات، بدرجة حرارة حتى 25 درجة مئوية، وليس أكثر من 24 ساعة في البراد (2-8 درجات مئوية). إذا تم تخزين القنية أو كيس التسريب في البراد، فيجب تمكينهما من بلوغ درجة حرارة الغرفة، قبل الإستعمال.

لا يجوز حفظ بقايا محلول التسريب لمعاودة إستعمالها. يجب إتلاف البقايا بموجب الأنظمة المحلية المتبعة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Sucrose, L-proline, Polysorbate 80, L-Histidine monohydrochloride monohydrate, L-Histidine and Water for injections.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

محلول رائق حتى قاتم قليلاً، عديم اللون مائل للون الأصفر الشاحب، من شأنه أن يشمل كميات ضئيلة لجسيمات شفافة مائلة للأبيض.

تحتوي كل علبة على قنية زجاجية، تحتوي على 7 مل محلول مرکّز.

صاحب الإمكانيات والمستورد وعنوانه: سانوفي - أفينتيز إسرائيل

م.ض، شارعبني چاؤون 10، تل أبيب.

لا تشمل هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضرات. إذا توفر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء توجيه للطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 36023 من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في شباط 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

• مشاكل في الكبد (التهاب الكبد (hepatitis)) - مثل إصفرار الجلد أو إصفرار بياض عينيك، غثيان أو تقيؤات شديدة، ألم في الجانب الأيمن من بطنه، الشعور بميل للنوم، بول داكن (بلون الشاي)، نزف أو ظهور كدمات بسهولة أكثر من المعتاد، إنخفاض في الشعور بالجوع مقارنة بالوضع الإعتيادي.

• مشاكل في الغدد الهرمونية - مثل صداع شاذ أو لا يزول، ضربات قلب سريعة، تعرق زائد، زيادة في الشعور بالبرد أو الحر مقارنة بالوضع الإعتيادي، إرهاق شديد، دوار أو إغماء، إنخفاض أو زيادة في الوزن، زيادة الشعور بالجوع أو العطش مقارنة بالوضع الإعتيادي، تساقط الشعر، إمساك، صوتك يصبح أعمق، ضغط دم منخفض جداً، تبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، غثيان أو تقيؤات، ألم في البطن، تغيرات في المزاج أو في التصرف (مثل - إنخفاض في الرغبة الجنسية، عصبية أو نسيان).

• أعراض (symptoms) لسكري من نوع 1 أو الحموض الكيتوني السكري - مثل زيادة الشعور بالجوع أو العطش مقارنة بالوضع الإعتيادي، الحاجة للتبول بشكل أكثر تكراراً، إنخفاض في الوزن، الشعور بإرهاق أو غثيان، ألم في البطن، تنفس سريع وعميق، إرتكاك، ميل شاذ للنوم، رائحة حلوة للنفس المتضاعف من فمك، طعم حلو أو معدني في فمك، أو رائحة مختلفة لبولك أو عرقك.

• مشاكل في الكلى (إلتهاب في الكلى (nephritis) وقصور كلوي) - مثل التبول بوتيرة أخفض من المعتاد، دم في البول، إنتفاخ في الكاحلين، إنخفاض في الشعور بالجوع مقارنة بالوضع الإعتيادي.

• ردود فعل تتعلق بالتسريب (أحياناً قد تكون شديدة أو تشكل خطراً على الحياة) - مثل قشعريرة، إرتجاف أو سخونة، حكة أو طفح، تورّد أو إنتفاخ في الوجه، ضيق في التنفس أو صفير، الشعور بدوار أو الشعور بإغماء، ألم في الظهر أو في الرقبة، غثيان، تقيؤ أو ألم في البطن.

• مشاكل في مناطق أخرى من الجسم مثل:

- مشاكل في الجهاز العصبي - مثل صداع أو تصلب في الرقبة، سخونة، الشعور بإرهاق أو ضعف، قشعريرة، تقيؤات، إرتكاك، مشاكل في الذاكرة أو الشعور بميل للنوم، إختلالات، رؤية أو سمع أشياء غير موجودة في الواقع (هلوسة)، ضعف عضلي شديد، نخر/ وخز، خدر، ضعف أو ألم حارق في الذراعين أو الرجلين، شلل في الأطراف.
- مشاكل في العضل والمفاصل - مثل ألم أو إنتفاخ في المفاصل، ألم في العضلات، ضعف أو تصلب.

• مشاكل في العينين - مثل تغيرات في الرؤية، ألم أو إحمرار في العينين، حساسية للضوء.

• مشاكل في القلب والدورة الدموية - مثل تغيرات في نظم القلب، نظم قلب سريع، الشعور بإيقاف نبضة أو الشعور بضربات القلب، ألم في الصدر، ضيق في التنفس.

• آخر: جفاف في أجزاء متعددة من الجسم، من الفم إلى العينين، الأنف، الحنجرة والطبقات العلوية من الجلد، كدمات في الجلد أو نزف.

• الأعراض التالية بُلغ عنها في الأبحاث السريرية لدى المتعالجين الذين عولجوا بـ سيميبيليماب:

- أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):
- ألم في العضلات أو في العظام

- الشعور بإرهاق
- طفح
- إسهال
- حكة
- إنخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء
- إنخفاض في الشعور بالجوع
- سعال
- غثيان
- إمساك
- تلوث في الطرق التنفسية العلوية.

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين):

- ضيق في التنفس
- ألم في البطن
- صداع
- مشاكل في الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية (hyperthyroidism) وقصور في الغدة الدرقية (hypothyroidism))
- تقيؤ
- إرتفاع ضغط الدم
- تلوث في المسالك البولية
- إرتفاع في نسب إنزيمات الكبد في الدم