

## ماقيرت

### أقراص مطلية

المواد الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على: 100 ملг چليکاپريثير (glecaprevir) و 40 ملг پيرينتسافير (pibrentasvir).

أنظر «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» في الفقرة 2. لقائمة المركبات غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك / من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك / حالتهم الطبية مشابهة.

إعادة تنشيط الالتهاب الفيروسي B:

قبل بدء العلاج بـماقيرت، على طبيبك أن يجري لك فحوص دم لوجود تلوث بفيروس التهاب الكبد B. إذا وجد لديك حالياً أو كان لديك في الماضي تلوث بفيروس التهاب الكبد B، فإن ماقيرت قد يؤدي إلى إعادة تنشيط التهاب الكبد الفيروسي B، وضع الذي قد يكون، في حالات معينة، مميتاً أو يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الكبد (مثل فشل كبدي).

إن إعادة تنشيط الالتهاب الفيروسي B يمكن أن يحدث خلال فترة العلاج أو بعد إنتهاء العلاج بـماقيرت. عليك أن تخضع للمراقبة الحثيثة وذلك إذا كنت معرضاً للخطورة حدوث إعادة تنشيط التهاب الكبد الفيروسي B خلال فترة العلاج بـماقيرت أو بعدها.

### 1 لأي غرض مخصص الدواء؟

ماقيرت عبارة عن دواء مضاد للفيروسات يعطى لعلاج الكبار والمرأهقين (باعمر 12 حتى 18 سنة) الذين يعانون من التهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C (التهاب الكبد C).

### الفصيلة العلاحية:

چليکاپريثير (glecaprevir) و چليکاپريثير (pibrentasvir) هما مادتان مضادتان للفيروسات. إن التهاب الكبد الفيروسي المزمن من نوع C عبارة عن مرض تلوثي يؤثر على الكبد، وينجم عن فيروس التهاب الكبد C. يحتوى الدواء على المادتين الفعاليتين چليکاپريثير (glecaprevir) و چليکاپريثير (pibrentasvir).

يعمل ماقيرت بواسطة إيقاف تكاثر فيروس التهاب الكبد C وكذلك يوقف عدوى خلايا جديدة، وبذلك يطرد التلوث من الجسم.

### 2 قبل إستعمال الدواء

#### لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicي) للمواد الفعالة (glecaprevir, pibrentasvir) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6). - كنت تعاني من مشاكل معينة في الكبد عدا التهاب الكبد الفيروسي من نوع C (التهاب الكبد C). - كنت تتناول الأدوية التالية:

• أتازانافير - atazanavir (العلاج تلوث HIV)

• أتورفاستاتين - atorvastatin أو سيمفاستاتين - simvastatin (الخفض نسبة الكوليسترول في الدم)

• كاربامازيبين - carbamazepine، فينيباربيتال - phenobarbital، فينوباربيتال - primidone (عادة تعطى لعلاج الصرع)

• دابيجاتران إتكسيلات - dabigatran etexilate (لمع تشكل خثارات دموية)

• أدوية تحتوي على إيتينيل إستراديول - ethinyloestradiol (مثل وسائل منع الحمل، بما في ذلك أقراص، لصقات وحلقات مهبلية)

• ريفامپيسين - rifampicin (العلاج التلوثات)

• نبتة العرن (ھېپېریکوم) Hypericum perforatum (دواء نباتي لعلاج الإكتئاب الخفيف).

لا يجوز تناول ماقيرت إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه.

إذا لم تكن واقفاً، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ماقيرت.

#### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـماقيرت، إحك للطبيب إذا كنت تعاني من الأعراض التالية لأنك من الجائز أن يطلب الطبيب متابعة حالتك بحرص أكبر:

• مشاكل في الكبد عدا التهاب الكبد الفيروسي من نوع C (التهاب الكبد C)

• تلوث حالياً أو في الماضي لفيروس التهاب الكبد B

• سكري من جانبه أن تحتاج لمتابعة مثيرة أكثر لنسب الجلوكوز في دمك و/أو ملائمة العلاج الدوائي للسكري لديك بعد بدء العلاج بـماقيرت. لقد قاسي بعض مرضى السكري من إنخفاض نسب السكر في الدم (نقص سكر الدم [hypoglycaemia]) بعد بدء العلاج بأدوية مثل ماقيرت.

إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، أو إذا لم تكن واقفاً، استشر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول هذا الدواء.

#### الفحوص والمتابعة

يوجهك الطبيب لإجراء فحوص الدم قبل العلاج، خلال فترة العلاج وبعد الإنتهاء من العلاج بـماقيرت وذلك ليتمكن الطبيب أن يقرر فيما إذا:

• عليك تناول ماقيرت ولا يقتصر ذلك على فترة من الزمن.

• كان العلاج ناجحاً وفيما إذا كان فيروس التهاب الكبد من نوع C غير موجود لديك بعد.

لا يجوز إعطاء هذا الدواء لأطفال دون عمر 12 سنة. إن إستعمال ماقيرت لدى أطفال دون عمر 12 سنة لم يفحص بعد.

الآراء والآراء المنشورة في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ماقيرت قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

• لدى الأشخاص الذين عانوا أو يعانون من مرض كبدي متقدم قبل بدء العلاج بـماقيرت: خلود نادرة لتفاقم مشاكل في الكبد، قصور كبدي ووفاة. يفحص الطبيب لوجود علامات وأعراض لتفاقم مشاكل الكبد خلال العلاج بـماقيرت. إحك للطبيب فوراً إذا وجدت لديك إحدى العلامات والأعراض التالية: غثيان، إرهاق، إصفرار الجلد لديك أو الجزء الأبيض في عينيك، نزف أو ظهور خدمات بسهولة أكبر من المعتاد، ارتفاع، براز داكن أو أسود أو دموي، فقدان الشهية للطعام، إسهال، بول داكن أو بني (بلون الشاي)، إنتفاخ أو ألم في الجانب الأيمن العلوي من منطقة البطن، ميل للنوم، تقيؤ دم، دوار.

إحك للطبيب أو الصيدلي إذا كنت تلاحظ إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

• الشعور بإرهاق شديد (إنهاك)

• صداع

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• غثيان

• إسهال

• الشعور بضعف أو قلة حيوية (asthenia)

• إرتفاع في نسب البيليروبين (فحص مخبري لوظائف الكبد) أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة، البطن، اليدين أو الرجلين

أعراض جانبية شديدة غير معروفة - أعراض شبيهة لها لم يحدد بعد:

• حكة

إذا ظهر عرض جنبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جنبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (الزن) ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5 كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال / أو الرضع وذلك لتقادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

#### شروط التخزين:

• يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.

• لا يجوز رمي أية أدوية في المجاري أو في القمامنة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجتها بعد. إن إتخاذ هذه الوسائل يساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6 معلومات إضافية

#### ماذا يحتوي ماقيرت

• يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً:

- لب القرص:

copovidone (Type K 28), vitamin E polyethylene glycol succinate, colloidal silicon dioxide/silica, anhydrous colloidal, propylene glycol monocaprylate (type II), croscarmellose sodium, sodium stearyl fumarate.

- طلاء القرص:

hypromellose (E464), lactose monohydrate, titanium dioxide, polyethylene glycol/macrogol 3350, iron oxide red (E172).

يحتوي ماقيرت على لكتوز وصوديوم. انظر الفقرة 2.

#### كيف يبدو ماقيرت وما هو محتوى العلبة

أقراص ماقيرت هي أقراص مطلية، وردية اللون، مطاولة، محدبة من كل الجانبين، بحجم قدره 18.8 ملم X 10.0 ملم ومبطوع عليه «NXT» من جانب واحد.

أقراص ماقيرت معبأة ضمن لوحة ألومنيوم (بليستر)، كل لوحة تحتوي على 3 أقراص. ماقيرت متوفّر ضمن علبة ذات 84 قرصاً مقطمةً لأربعة علب كرتون، كل علبة كرتون تحتوي على 21 قرصاً مطلياً.

إسم المنتج وعنوانه: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse 67061, Germany, Lübeck, Germany.

#### صاحب الإمتياز وعنوانه:

AbbVie Biopharmaceuticals Ltd., شارع هاحاراش 4، هود هشارون، إسرائيل.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 160-35323

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في نيسان 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخر، أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، إضافات غذائية وأدوية ثابتة، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالعكس إذا كنت تتناول واحد من الأدوية المذكورة في الجدول أدناه. من الجائز أن يتضطر الطبيب إلى تغيير الجرعة الدوائية التي تتناولها من هذه الأدوية.

الأدوية التي يتوجب عليك تبلغ الطبيب عنها قبل تناول ماقيرت

| الدواء                     | الغاية من الدواء                              |
|----------------------------|---|
| سيكلوسپورین - tacrolimus   | لتثبيط الجهاز المناعي                         |
| HIV                        | darunavir - efavirenz - lopinavir - ritonavir |
| لمنع تشكل الخثارات الدموية | warfarin وآدوية مشابهة أخرى *                 |

\* من الجائز أن يتضطر الطبيب إلى زيادة وتيرة فحوص الدم لديك من أجل فحص قدرة تخرّر الدم لديك.

إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه (أو إذا لم تكن واقفاً)، إستشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ماقيرت.

#### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن تأثيرات تناول ماقيرت خلال فترة الحمل غير معروفة. إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، يجب إستشارة طبيبك قبل تناول هذا الدواء، لأنك من غير الموصى به إستعمال ماقيرت خلال فترة الحمل. يمنع إستعمال مستحضرات منع الحمل الحاوية على إيتينيل إستراديول سوية مع ماقيرت. إذا كنت مرضعة، تحذّي مع طبيبك قبل تناول ماقيرت. لا يعرف فيما إذا كان كل الدوائين الذين يحتويهما ماقيرت يطرحان في حليب الأم.

#### السيادة وإستعمال الماكنتات

من غير المفترض أن يؤثر ماقيرت على قدرتك على السيادة أو إستعمال الأدوات أو الماكنتات.

#### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي ماقيرت على لكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إستشر طبيبك أو من الصيدلي إذا لم تكن واقفاً.

تحتوي ماقيرت على صوديوم. يحتوي هذا المستحضر على أقل من 1 ملليمول (25 ملг) صوديوم في كل قرص، وبالتالي يعتبر "حال من الصوديوم".

#### 3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واقفاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

#### الجرعة الدوائية الإعتيادية

الجرعة الدوائية الإعتيادية الإعتيادية للكلار و المراهقين (باعمر 12 حتى 18 سنة) هي عادة ثلاثة أقراص من ماقيرت يتم تناولها سوية، مرة واحدة في اليوم.

ثلاثة أقراص ضمن لوحة (بليستر) واحدة تعتبر الجرعة الدوائية اليومية.

#### لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

#### طريقة التناول

• يجب تناول الأقراص مع الطعام.

• يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل.

• يمنع سحق/ شطر/ مضغ الأقراص لأن ذلك قد يؤثر على كمية ماقيرت في دمك.

إذا كنت تعاني من تقيؤ بعد تناول ماقيرت فإن ذلك يمكن أن يؤثر على كمية ماقيرت في دمك. قد يؤدي هذا الأمر إلى أن يعلم ماقيرت بكفاءة أقل.

إذا تقيأت بعد أقل من 3 ساعات من موعد تناول ماقيرت، يجب تناول جرعة دوائية إضافية.