

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) 1986 -**

## התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**אנלדקס 20,10,5 מ"ג,** **סבליות** **Enalapril** (maleate) במינון 10, 5 או 20 מ"ג בהתאמה.

חומרים בדיע פנילים אוֹרגניים בתרופה - ראה הערה 1.
מיועד לטיפול בסרטן ברתרופה עם חלק מהמרכיבים של התרופה".

**רקא בעיון את העלון**
**עד סופו**
**בתום**
**שתמש**
**התרופה.**
עלון זה מוקדם מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך.
אל תעביא אותה לאחרים.
עלולה להיות לזיקוק להם, אפילו אם נראה לך כי מוצגם הרופא זמנה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו גורמת להרחבת כלי הדם ובכך מסייעת בהורדת לחץ הדם.
בנוסף, התרופה מיועדת לטיפול באי ספיקת לב (בידוד הפקודור לב).

באנשים מסוימים יידרשו שבעות של טיפול עד להשגת ההשפעה המיטבית על לחץ הדם.

**קבוצה תרופסית:** מרחיבי כלי דם מסוג מעכבי אנזים המתפרק אנגיוטנסין (ACE inhibitors).

### 2. למה השימוש בתרופה:

#### אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אנלפריל באולטא) לתרופת אחרות הרגומות אנלפריל מקבוצת ACE inhibitor או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה עמוד 5).

• יש לך בן שספחה אשר הוא גונבה אלרגית לאנלפריל או לתרופות אחרות מקבוצת ACE inhibitor או אם סבלת בעבר מנפחות הפנים, עיניים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון שגרמה לקשיי בליעה או נשימה (אנגיואדמה) מסיבה אל דיועה או רק קרת תושתית.
• אתה חולה סוכרת או סובל מבעיות בליליות ואתה חושש תרופה המכילה אלקטרוליט להורדת לחץ הדם.

• את בריריון לאחר חולי שליש (עוף הלימע מנטילת אנלפריל גם בתחילת היריון, ראי בעמוד 2 "היריון חולה מקה ופוריות").

• אתה סובל מקסטיבר/ ולסרטן (Sacubitril/ Valsartan), תרופה לטיפול באי ספיקת לב כרובית במחלתם.
עלה הסיכון לאנגיואדמה (התנפחות מוגברת מתחת ליעד לטיפול באזור הגרון).

אין לשתמש אנלפריל אם אחד מהמכבים המתוארים לעיל נכון לגביך.
אם אינך בטוח, היועץ ברופא לפני שאתה תרופה זו.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

**לפי הטיפול באנלדקס, ספר רופא אם:**

• יש לך לחץ דם גבוה, עלול להתבטא בעיפולן או סחרחורת במיוחד במעבר למצב עמידה).

• יש לך בעיות בליד חלב במוח.

• אתה סובל מבעיה בלב.

• יש לך בעיות בכליה (כולל השתלת כליה), אתה נמצא תחת טיפול בלחץ בוזוזנה, כלי חוסי, אשלגן, תרופות אצורתי אשלגן, תחליפי מלח המכילים אשלגן או תרופות אחרות שעלולות להעלות את רמות האשלגן בדם (למשל פפרין [תרופה למניעת תחושת קשיי דם], תרופות הכוללות סטרומתורפין גנון קו-טרמוקולור, תרופה לטיפול בזיתומים), תרופות אלול לטולת לגרום לרמה גבוהה של אשלגן בדם (שאינן משמשות כתרופה).
יתכן שרופא שיצטרך לעקוב העולה להיות תמורה. ייתכן שרופא שיצטרך לעקוב אחר רמת האשלגן בדמך או לשנות את המינון של אנלפריל בהתאם.
אחר מידע נוסף בסעיף "תגובות בין תרופתיות".

• יש לך בעיה בכבד.

• יש לך בעיה במערכת הדם כגון: רמה נמוכה או חוסר ברזום למניעת דחיית שטל והפרין, תרופה לדימוי מערכת הדם, תרופות רחיצות קרשי דם.
ראה הערה נוסף בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

• תרופות אחרות המשמשות להורדת לחץ דם כגון: חוסמי בטא, משנתים (כגון תיאזידים, פורוסמיד, מנדטין), תרופות לטיפול בכאב חזה (תוספת חזה) כגון טירטאסים.
ניטיל תרופות אלה הן זמנית עם אנלפריל עלולה לגרום ללחץ דם נמוך.

• חוסמי הפרצטוראנגיוטנסין (ARB) או אליסקין.
ראה גם בסעיף 2.
אל להשתמש בתרופה אם "לאזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

- ליתיום (לטיפול בסוגים מסוימים של מחלות נפש).
- תרופות טריקציקליות לטיפול בדיכאון, תרופות אנטי ספסטיקות (לטיפול במחלות נפש מוחרות), תרופות לאלוזח (הרדמה), חומרים נרקוטיים כגון מורפין (לשיכון כאבים חדים), ניטילת תרופות אלה הן זמנית עם אנלפריל עלולה לגרום ללחץ דם נמוך.
- תרופות לטיפול בנפשוות ודלקת הקשורות למצבי כאב, בעיקר אלו המשפיעים על השרירים, הצטעות והתפרקים:
- סוגי דלקת שאינם סטרואידים- NSAIDs, כולל מעכבי COX-2 (המשמשים להפחתת דלקת, לטיסוע בשיכון הכאב).
- טיפול במלחי זהב, עלול לגרום לתגובות הפונים בחילה, הקאות ולחץ דם נמוך, אם ניתן לה זמנית עם אנלפריל.

- מעכבי tMOR (כגון טמסרולימוס, סירולימוס, אברוליומס: תרופות לטיפול בסוגי הרגז מסוימים או כדי למנוע מהמסרכת החוטית של הגוף לדחות אברו מושלת).
ראה גם בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".
- תרופה המכילה מעכב נפריליסן כגון סקוביטריל (קיים בתכשיר משולב עם ולסרטן), רבאקטריל או וילדגליפטין הסיכון לאנגיואדמה (נפוחות הפנים, הלשון או הגרון עם קשיי בליעה או נשימה) עלול לעלות, ראה גם בסעיף 2.
אל להשתמש בתרופה אם "לאזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".
- אספירין (חומצה אצטילסלימולית).

• תרופות להמסת קרשי דם (תתמוגולטיים).
• תרופות נגד שיעול והצטננות ותרופות להורדה במשקל המכילות חומר סימפוממטיס.
• תרופות לטיפול בסוכרת (כולל תרופות הניתנות דרך הפה אוסילון).
אנלפריל עלול לגרום לירידה חדה ברמות הסוכר בדם אם נלקח הן זמנית עם תרופות אלה, בייחוד בשבועות הראשונים לטיפול ובתופעות עם בעיות בעלת בליה.
עליך לעקוב באדיקות אחר רמות הסוכר בדמך במהלך החודש הראשון של הטיפול באנלפריל.

• **אלכוהול:**
אם אינך בטוח שהמידע מעל נכון לגביך, היועץ ברופא או הרוקח לפני ניטילת התרופה.
• **אם אתה עומד ללבוך בינוח:**
הפרוצדורות הבאות:
בינוח כלשהו או קבידת חומרי הרדמה (גם אצל רופא השיניים), טיפול לסילוק כולטסטרול מהדם (LDL אפרזיס) או טיפול להפחתת תגובה אלרגית לעדילת דבורים או צרעות.
• אם אתה או יתור המהצביע מעלה נכון לגביך, היועץ ארפא או ברופא השיניים לפני הפרוצדורה.

**תגובות בין תרופתיות:**

- **אם אתה לוקה, אם לקחת לאחרונה, או אם אתה מתכנן לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם וטוספי זווונה, ספר על כך לרופא או לרוקח,** מפני שבעיות הנוגעות להשפיע על הפעילות של תרופות מסוימות ותרופות מסוימות עלולות להשפיע על פעולת האנלפריל.
אם אתה לוקה, ייתכן שהרופא ישנה את המינון של אנלפריל או יתקן בעודי "זרזיות נוספים.
ספר לרופא או לרוקח מייחד אם אתה לוקה.
- **ביוחסי אשלגן (כולל תחליפי מלח), משנתים באיריין אשלגן כגון ספרונולקטון, טריאמטן או אמילוריד** ותופעות אחרות שעלולות להעלות את רמות האשלגן בדם (למשל סטרומתורפין וקו-טרמוקולוז לטיפול

השלישי להיריון מאחר שהיא עלולה לגרום לזקק חמור לתמונה אם נלקחת לאחר החודש השלישי להיריון.
היועצי ברופא אם את מניקה או מתכננת להניק.
הנחת ילודים (במהלך השבועות הראשונים לאחר הלידה) ובמיוחד פנים איה מומלצת בתקופת ניטילת התרופה.
מקרים עם התינוק בוגר יותר, הרופא ייעץ לך לגבי היתרונות והסיכונים בשניטילת אנלפריל בזמן הנקה וזאת בהשיווא למאופיות טיפוליות חלופיות.
**נהיגה ושימוש באמצעות:**
השימוש בתרופה זו עלול לגרום לעייפות או לסחרחורת.
במקרים אלה, אי נלונה אל להשתמש במכונית.
באשר לילדים יש להזהרם מרכיבה על אופניים או משחקים בקרב תלבוך הכביש וכדומה.
- **מידע חשוב על תגובות מהמרכיבים של התרופה:**
תרופה זו מכילה לקטוז, אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבלינות לסוכרים מסוימים, היועצי ברופא לפני החלת הטיפול בתרופה זו.
(23 מ"ג) תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגראם נתון (מ"ג) לסבלינה.
לכומר היא למעשה "לטיפול נתון".

### 3. כיצד שתשמשי בתרופה?

יש להשתמש בתרופה ממיד לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יוקבעו על ידי הרופא בלבד בהתאם למצבך הרפואי ולהתופעות הנוספות אשר אתה נוטל.

• יש לבדוק את התרופה עם מיס.
ניתן לישול את התרופה עם או ללא מזון.

• יש לישול את התרופה בערך באותו זמן כל יום.
ניתן לתזות את הטבליה, אין מידע לגבי כתישה/ לעיסה.

בתחילת הטיפול בתרופה, ייתכן ירדתי משמעותית יותר בלחץ הדם מאשר בניטילת המנות הבאות בתחילת הטיפול בתרופה אתה עלול להרגיש סחרחורת.
ייתכן כי יעזור לך לשכב עד שתרשי טוב יותר.
תופעות אלו (בדרך כלל פחות סבירות במנות אחרות, אם אתה מודאג, היועץ ברופא לפני ניטילת הרופא יבדוק כיצד אתה מניב לאנלפריל על ידי מדידת לחץ הדם ויבוצע בדיקת דם מסוימות.

#### מוטפולים עם בעיות כליה

אם אתה סובל מבעיות כליה, הרופא ישנה את המינון בהתאם לתפקוד הכליתי.
אם אתה עובר טיפול דיאליזה, יתכן כי מינון התרופה ישנתה יום-יום.
הרופא ינהא אורך לגבי המינון הנכון.

#### מוטפולים קשישים

המינון יוקבע על ידי הרופא ויתואם לתפקוד הכליתי שלך.

#### שימוש בילדים

הניסוי של שימוש בתרופה זו בילדים עם לחץ דם גבוה הוא מוגבל.
להותוות אחרות אין ניסוין בילדים לל.
המינון יוקבע על ידי הרופא בהתאם לטפול הילד שמיני בלחץ הדם של הילד לאחר ניטילת אנלפריל.
אל זמניע להשתמש בתרופה בתקופות וילדים עם בעיות בכליה.
אל משמש להשתמש בתרופה בתקופות מאוד צעירים (שבועות הראשונים לאחר הלידה).

אין לנטול את המנה המומלצת.

**אם לעובר בטעות מינון גבוה יותר**
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל ימן של התרופה, פנה יחד למרפא או לחדר מינין של בית חולים והבא ארזות התרופה אתי.

התסמינים והסימנים שצפויים ביותר של מינון יתר הם: נפילה חדה בלחץ דם, הכרה מעורפלת.
תסמינים נוספים יכולים לכלול: סחרחורת בעקבות ירידה בלחץ הדם, דופק חזק מורח, חרדה, שיעול, אי ספיקת כליות ונשימה מהרה.

• **אם שכחת לישול את התרופה**
אם שכחת לישול תרופה זו בזמן המיועד, אל תדאג.
קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.
אי לישול מנה כפולה על מוקדמים של היריון ואסורה לשימוש לאחר החודש

מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בניפול כפי שהומלח על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אל להפסיק הטיפול בתרופה לפני התייעות עם הרופא.

#### אם אתה מפסיק את ניטילת התרופה

אם אתה מפסיק את ניטילת התרופה, לחץ דם עלול לעלות.
אם לחץ דמך ירעי מדי, הוא עלול להשפיע על תפקודי הלב והכליות שלך.

אל תפסיק לישול תרופה זו אלא אם הרופא הנהא אוך לישות זאת.

**אין לישול תרופות בתושהן**
**הרופק הזותית והמנה בכל פעם שאהה נוטל תרופה.
בדוק משפיעים אם אתה זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש **באנלדקס** עלול לגרום לתופעות לוואי.
בחלק מהמשתמשים, אל תיבהל למקרא רשימה תופעות הלוואי.
ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

• **לרופאי את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא או לדבר מינון הפומעי:**
גד, פריחה אדומה מורמת בעור (רדלת), קוצר נשימה או צצפוצים בשנמה, נפוחות הדיים, כפות הרגליים או הקרטסילים, הפנים, העיניים, הפה, השפתיים, הלשון או הגרון שעלולה לגרום לקשיי נשימה או בליעה.
יש לב משופלים שחור' יש הרם בעלי סיכון מוגבר ללקות בתופעות אלו.

• פריחה עם גניעם דמויי מטרות, שלפוחיות, קילוף של העור, העלולים להופיע גם יתכנסו כעיניים, בפה, באף, ו/או באברי המין.
בנוסף, ייתכן כי תסבול מחום גבוה או כאב מפרקים (ארכטה מולטיפרמרה).

• תגובת עור תמורה להתבטאת בתסמינים כגון: צפופות בערות, קילוף העור, שלפוחיות וצפעים חשופים, הפידרות של שכבת העור (לשננות טטיבט-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמי קרליזיס), תחושת נפוחות, כאבים והתכווצויות בבטן (עלולים להיגרם מחסימת העיין).

• הקף על או שכי' יורש בל לחץ דם נמוך מאוד בתופעות מסוימים בסיכון גבוה (מטפולים הסובלים מבעיות ברזמת דם ללב או למוח).

• כאב בטן חמור (עלול להיגרם מדלקת בלבלב).

• הפרעות דם ועלולות להשפיע על התאום ומרכיבים אחרים בדם המאובנות בדרך כלל בבדיקות דם (התסמינים יכולים לכלול: עייפות, חולשה, קוצר נשימה, אי יכולת לבצע פעילות גופנית, חששיות, הצטננות מתמשכת או חזרת, חום, צמרמורת, דימום ממושך, ששפי דם מסיבה אל דיועה, תכמים אדומים או מטילים על פני העור).

• נזל בריאה אשר עלול לגרום לתסמינים כגון: שיעול, קשי נשימה.
• חום גבוה, עייפות, איבוד תיאבון, כאב בטן, בחילה, אצבת נגרמות מיידיה בלחץ הדם ואומרות להשפטר בהמשך ניטילת התרופה.
אם אתה מודאג, היועץ ברופא.

• **לפנות מייד לרופא אם מופיעות התופעות הממוזרות הבאות:**
שילוב של חלק או כל הסימנים הבאים:
• חום גבוה, דלקת כלי דם, כאב ודלקת של שרירים או מפרקים

• הפרעות במערכת הדם המשפיעות על מרכיבי הדם (לרוב מתגלות בבדיקות דם)

• פריחה, רגישות לאור השמש ותופעות עריות נוספות (לחץ דם נמוך (עלול לגרום לסחרחורת במעבר למידיה)

#### תופעות לוואי נוספות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד**
(תופעות משופיעות ביותר משתמשים אחד מעשרה):

• שטטשו ראיה
• סחרחורת
• שיעול
• בחילה
• חולשה

**תופעות לוואי שכיחות**
(תופעות משופיעות ב 10-100):
משתמשים מתוך 100):

• כאב ראש
• דיכאון

• לחץ דם נמוך שעלול לגרום לסחרחורת קלה

• עינפון (syncope)

• שינויים בקצב הלב

• דופק מהיר
• כאב חזה או תחושת חזה
• קשיי נשימה
• לשלול

• כאב בטן
• שינויים בחוש הטעם

• פריחה
• עייפות

• גונבה אלרגית עם נפוחות בפנים, בשפתיים, בלשוין או בגרון עם קשיי בליעה או נשימה
• רמה גבוהה של אשלגן בדם, רמות גבוהות של למקרא רשימה תופעות הלוואי.
ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

• **תופעות לוואי שאינן שכיחות**
(תופעות משופיעות ב 10-100 משתמשים מתוך 1,000):

• עייפות ורגומות נמוכות של המוגלובין או של תאי דם אדומים (אנמיה)
• רמות נמוכות של סוכר בדם העלולות לגרום לחרדה, תגובת עור תמורה להתבטאת בתסמינים כגון: צפופות בערות, קילוף העור, שלפוחיות וצפעים חשופים, הפידרות של שכבת העור (לשננות טטיבט-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמי קרליזיס), תחושת נפוחות, כאבים והתכווצויות בבטן (עלולים להיגרם מחסימת העיין).

• הקף על או שכי' יורש בל לחץ דם נמוך מאוד בתופעות מסוימים בסיכון גבוה (מטפולים הסובלים מבעיות ברזמת דם ללב או למוח).

• כאב בטן חמור (עלול להיגרם מדלקת בלבלב).

• הפרעות דם ועלולות להשפיע על התאום ומרכיבים אחרים בדם המאובנות בדרך כלל בבדיקות דם (התסמינים יכולים לכלול: עייפות, חולשה, קוצר נשימה, אי יכולת לבצע פעילות גופנית, חששיות, הצטננות מתמשכת או חזרת, חום, צמרמורת, דימום ממושך, ששפי דם מסיבה אל דיועה, תכמים אדומים או מטילים על פני העור).

• נזל בריאה אשר עלול לגרום לתסמינים כגון: שיעול, קשי נשימה.
• חום גבוה, עייפות, איבוד תיאבון, כאב בטן, בחילה, אצבת נגרמות מיידיה בלחץ הדם ואומרות להשפטר בהמשך ניטילת התרופה.
אם אתה מודאג, היועץ ברופא.

• **לפנות מייד לרופא אם מופיעות התופעות הממוזרות הבאות:**
שילוב של חלק או כל הסימנים הבאים:
• חום גבוה, דלקת כלי דם, כאב ודלקת של שרירים או מפרקים

• הפרעות במערכת הדם המשפיעות על מרכיבי הדם (לרוב מתגלות בבדיקות דם)

• פריחה, רגישות לאור השמש ותופעות עריות נוספות (לחץ דם נמוך (עלול לגרום לסחרחורת במעבר למידיה)

התקף לב (ייתכן בעקבות לחץ דם נמוך מאוד במטופלים מסוימים בסיכון גבוה, כולל מטופלים עם בעיות ברזמת הדם של בלבד או חמוח)

• שכי' (ייתכן בעקבות לחץ דם נמוך מאוד במטופלים בלבד או חמוח)

**תופעות לוואי בדריות**
(תופעות משופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 10,000):
• הלחומת ממושך, בעיות שינה
• תופעת רימ' (התכווצות כלי דם בדרך כלל באבעבות הידיים והרגליים הרגומת לחייוון או לטלאים בצבע הידיים והרגליים)

• חום גבוה, דלקת כלי דם, כאב ודלקת בלשוין

• שינויים בבדיקות דם כגון: מספר נמוך של תאי דם לבנים ואדומים, המוגלובין נמוך, רמה נמוכה של נסיות

• תסנין ירודים (הצטננות של נוזלים או חומרים אחרים בריאות הראית (ברנטן), דלקת ריאות (מתבטאת בסימנים של שיעול, חום גבוה וקשיי נשימה)

• דלקת באף

• כאב, דלקת ו/או כיבס בתכינים, בלחיים, בלשוין, בשפתיים, בגרון

• בעיות בלחץ או ביסס המרה כגון: ירידה בתפקודי כבד, דלקת כבכד העלולה לגרום לצרבת (תצרבת העור או הבעיית).

• עדיה ברמות אנזימי כבד או בילירובין (ממדדים בבדיקות דם)

• ירידה בסך רמות השתן המיציר ליום

• הגדלת שדיים בגברים
• ירכיזי מח צעם

• מחלות אוטואימוניות
• דלקת עור אקספוליאיטית/איריתודרמה (פריחה חמורה בעור המולדת קילוף של העור), נפפיפוס (בלבליטת קטנות בעור המלאות בנוזל)

• נפוחות של יפוחות של בלוטות לימפה בצוואר, תיב שחי או המפשעה

**תופעות לוואי בדריות אמור**
(תופעות משופיעות בפחות משתמש אחד מתוך 10,000):

• נפוחות באבעבות (אנגיואדמה במעים), הסימנים יכולים ללול כאב בטן, בחילה, הקאות

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה**
(תופעות שכיחותות טרם נבדקה):

• יצוור יתר של הרומון נוגד השנתה הגורום לאיצירת נוזלים ובעקבות כך לחולשה, עייפות או בלבול

• ורטיסו (תחושת סחרור)
• דופק מהיר וזקוק או אל סדיר (פלפציוזית)
• מדלת

• כאב גרון וצרודית
• שיעול או יצפודים (אם אתמה)

• מעבר איטי של המזון במעיים, דלקת לבלב העלולה לגרום להופעת תסמינים כגון כאב חמור בבטן ובבב הקאות, קשי עיכול, ציצרות, איבוד תיאבון

• גרזי קרבה, יושב בפה, כלי קרבה (התסמינים יכולים להיות תחושת צריבה, כאב המלווה בתחושת ריקנות ורעב, במיוחד כאשר הקיבה ריקה)

• אינמונות בבדיקות דם

• התכווצויות שרירים (במיוחד כאשר הקיבה ריקה)

### 5. איך לאחסן את התרופה?

• נמט הערעלה תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום מגור מחוץ לשיעול יום טווח ראיתי של ילדים

ואו הטיקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אל תגרום להקהל ללא הוראה מפורשת מהרופא.
• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**זמני אחסון:**
אחסן במקום יבש, מתחת ל־25°C.

• אין להשתין תרופות לביב או לפח אשפה ביתי.
שאל את הרוקח איך להשתין תרופות שאינן בשימוש עוד.

אמצעים אלו יסייעו להקו על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, starch pregelatinized, maize starch, sodium hydrogen carbonate, magnesium stearate.

**אנלדקס 20 מ"ג ו אנלדקס 20 מ"ג**
KCl Iron oxide red (E172)

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**אנלדקס 20 מ"ג:**
סבליות לבנות, עגולות, קמורות משני הצדדים, עם קו חילוקה בצד אחד.

**אנלדקס 10 מ"ג:**