

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקטים (תקשיירם) התשמ"ג - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

וניקה קرم w/w %

החומר הפעיל: אפלורניטין w/w 11.5% (כהידרוクロיד מונוהידראט)
eflornithine 11.5% (as hydrochloride monohydrate)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראי סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קראי בעין את העلون עד סוףו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעבירה אותה לאחרות. היא עלולה להזיק להן אפילו אם נראה לך כי מבחן הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

וניקה מיועדת להפחחת צמיחה של שיער פנים מגבר (שיערות יתר) בנשים.

וניקה מכילה את החומר הפעיל אפלורניטין. אפלורניטין מאט את קצב הצמיחה של השיער באמצעות אנזים ספציפי (חלבון בגוף המעורב בייצור השיער).

קובוצה רפואיית: מעכב האנדמים אורנייטין דקרבווקסילאצ.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

- | | |
|---|-----------------------|
| • את רגישה (אלרגיה) לאפלורניטין או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראי סעיף 6). | • את בהירין או מניקה. |
|---|-----------------------|

אחרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בוניקה, ספרי לרופא או הרוקח אם:

- את סובלת מבעיות רפואיות אחרות (בעיקר הקשורות לכליות או לבב)
 - את סובלת מתסמונת השחלות הפוליציסטיות (PCOS)
 - את סובלת מגידולים המיצרים הורמוניים ספציפיים
 - את לוקחת תרופות שיוכלו לגרום לדיזוז צמיחה השיער כגון:
 - ציקלאיספורין (למניעת דחיתת שתלים)
 - גלוקורטיקואידים (טיפול במחלה מפרקית או אלרגיות)
 - מינוקסידיל (טיפול ביתר לחץ דם)
 - פנוברביטון, פניטואין (טיפול באפילפסיה)
 - טיפול הורמוני חלופי עם הורמוניים בעלי אפקט דמי הורמן גברי
- אם את לא בטוחה האם להשתמש בתרופה, יש ליצור קשר עם הרופא או הרוקח.

ילדים ומתבגרים

וניקה אינה מיועדת לשימוש ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.
לא קיימן מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה ילדים ומתבגרים.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם את לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי עליך לרופא או לרופך. במיעוד אם את:

- משתמש בתרופות נוספות על אותן אזהור בעור שבו מורהים את הקרם.

הירין והנקה

אין להשתמש בוניקה אם את בהירין או מניקה. יש להשתמש בשיטה חלופית לטיפול בשיער הפנים אם את בהירין או מנסה להיכנס להירין.

נהייה ושימוש במכונות

וניקה לא צפיה להשפיע על היכולת לנוהג או על הפעלת מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

וניקה מכילה צטוטאריל אלכוהול וסטטריל אלכוהול שעשוים לגרום עור מקומית (כגון דרמטייטיס עקב מגע). וניקה מכילה גם מתיל פאראהידרוקסיבנזואט ופרופיל פאראהידרוקסיבנזואט שעשוים לגרום לתגובה אלרגיות (יתכן שהיו מושהות).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בוניקה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיך. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקבול בדרך כלל הוא: פעמיים ביום בהפרש של 8 שעות לפחות.

- אם את מפתחת גירוי (כגון עקצוץ או צריבה), עברי לשימוש פעמיים ביום עד להפסקת התופעה. אם הגירוי מתמשך, יש לפנות לרופא.
- אם התגלחת זה עתה או השתמשת באמצעות אמצעי אחר להסרת שיער, המתינו לפחות 5 דקות לפני השימוש בוניקה.
- מרחית הקרם על חתך בעור או על עור מגורה עלולה לגרום לעקצוץ או צריבה.
- יש לנוקות וליבש את אזור העור שבו תمرchi את הקרם.
- יש למרוח שכבה דקה של הקרם ולשפssh היטב עד שלא ניתן לראות אותו יותר על האזור המטופל.
- אם אפשרי, אל תשטפי איזוריים אלו עד עברו 4 שעות מזמן המרחיה.
- שטפי את ידיך לאחר מריחת הקרם.
- המתינו לפחות 5 דקות לפני שימוש שתשתיימי באיפור או במסנן קריינה על אותם איזוריים.
- בשימוש על הפנים, יש להימנע מגע עם העיניים או הפה או בתוך האף. אם בטעות וניקה נכנסת לעיניים, הפה או האף, יש לשטוף היטב עם מים.

אין לעבר על המנה המומלצת.

וניקה אינה קرم להסרת שיער. יתכן שתצטרכי להמשיך בהורדת השיער על ידי גילוח או מריטה.

marsh הטיפול:

"יתכן שיחלפו 8 שבועות לפני שניתן יהיה להבחן בתוצאות. חשוב להמשיך את הטיפול בקרם. אם לא תראי שיפור לאחר שימוש של 4 חודשים, יש ליצור קשר עם הרופא. אם את מפסיקת את השימוש בתכשיך, השיער יצמץ מחדש תוך 8 שבועות."

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר לא סביר שיגרם נזק כלשהו. אם את או ילד בלעתם מן התרופה בטעות, פני מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבייאי אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה יש למרוח מיד ולהחכות לפחות 8 שעות עד לשימוש הבא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אם את מפסיקת את נטלת התרופה

כדי לשמור על ההפקחה בэмיתת השיער יש להמשיך ולהשתמש בוניקה ברכזיות כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדק התווית והמנה בכל פעע שהינך נטלת תרופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצי ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוניקה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבלי מכך אחת מהן.

תופעות הלואן בדרך כלל מוגבלות לעור וקלות בעוצמתן. במקרים אלה אין נפתרות ללא צורך בהפסקת הטיפול בוניקה.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שימושיות ביותר ביוטר משתמשת אחת מתוך עשר):

- אקנזה

תופעות לוואי שכיחות (טופעות שימושיות ב-10-1 מתוך 100):

- עור יבש
- נשירת שיער
- דלקת סביב זקיק השערה
- גירוד
- פריחה
- אדמומיות
- גירוי בעור ובליות שנגרמו על ידי גילוח
- גירוי בעור
- עקצוץ או תחושת צריבה בעור

תופעות לוואי שאין שכיחות (טופעות שימושיות ב-10-1 מתוך 1000):

- פריחה גבשושית
- פצעי קור
- אדמומיות וגירוי באזורי מריחת הקرم
- אקזמה
- שפטים מודלקות, יבשות, סדוקות או רדומות
- שערות שגדלות פנימה
- אזוריים בהירים על העור
- דימום בעור
- מורסות בעור
- עור סמוק
- דלקת בעור
- כאב בעור
- נפיחות של הפה או הפנים
- מרקם או צמיחת שיער יוצא דופן

תופעות לוואי נדירות (טופעות שימושיות ב-10-1 מתוך 10,000):

- צמיחת עור לא נורמלית (ממירות)
- צמיחת שיער מוגברת
- הסמקה, אדמומיות ופצעונים בפנים, לעיתים עם מוגלה
- מחלות עור אחרות
- דלקת עור אדומה, מגדרת עם קשושים (סבורה דרמטייטיס)
- פריחה אדומה עם בלילות או שלפוחיות
- ציסות בעור
- מתיחות עור

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. אין לאחסן את התרופה?

- מעני הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה מפורשת מהרופא.
- ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמניע הרעללה. אל תגרמי להקה ללא הוראה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לסגור את מכסה השפוגרת היטב לאחר כל שימוש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- -25°C .
- לאחרפתיחה ראשונה ניתן להשתמש תוך 6 חודשים.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. התיעצז עם הרוקח כיצד יש להיפטר מהתרופה. זה יסייע לשמירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified water, glyceryl stearate and PEG 100 stearate, cetostearyl alcohol, macrogol cetostearyl ether, liquid paraffin, stearyl alcohol, dimethicone, phenoxyethanol, methyl parahydroxybenzoate, propyl parahydroxybenzoate and sodium hydroxide.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

וניקה היא קرم, לבן – לבן שבר (אוף וויט).

התכשיר קיים בשפוגרות של 30 גרם ו-60 גרם. יתכן שלא כל גודלי האריזות משוקקים.

בעל הרישום וכתובתו: מדיסון פארמה בע"מ, השילוח 10, ת.ד. 7090, פ"ת.

שם הייצור וכתובתו: Almirall S.A.
Ronda General Mitre, 15108022 Barcelona, Spain

נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 11-30246-36-136

Vaniqa-PIL-0622-V1