

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

### **בייביזים טיפות**

#### **הרכב:**

כל 5 מ"ל מכילים:	
pepsin 1:10,000	30 mg
sodium glycerophosphate	40 mg
nicotinic acid	10 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.  
בטיפול בעצירות - עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

התרופה מיועדת לטיפול בעצירות ובגזים.

**קבוצה תרפויטית:** אנזימי עיכול.

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול בבייביזים טיפות, ספר לרופא אם:**

- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי דם, הכליה/מערכת השתן.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

**אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות:**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**שימוש בתרופה ומזון**

יש ליטול התרופה עם הארוחה.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

התרופה מכילה כ-0.3 גרם אלכוהול (אתנול) בכל 5 מ"ל, ששווה ערך לריכוז של 6% w/v. כמות האלכוהול ב-5 מ"ל תרופה שוות ערך ל-7.5 מ"ל בירה או ל-3 מ"ל יין. לכמות קטנה זו של אלכוהול בתרופה לא תהיה השפעה ניכרת.  
התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן במנה ולכן נחשבת 'נטולת נתרן'.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. בהיעדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המומלץ הוא: תינוקות עד גיל שנה: 5 טיפות לפני האוכל ו-5 טיפות אחרי האוכל, בכל האכלה (עד 50 טיפות ליום).

תינוקות בני 1 עד 2 שנים: 20 עד 40 טיפות אחרי כל ארוחה.  
ילדים בני 2 עד 5 שנים: 40 עד 60 טיפות אחרי כל ארוחה.  
ילדים בני 5 עד 14 שנים: 1/2 עד 1 כפית של 5 מ"ל אחרי כל ארוחה.

יש לטפטף קודם לתוך כפית ולא ישירות לפי התינוק.  
אין לעבור על המנה המומלצת.

### משך הטיפול

בטיפול בעצירות, אם לא חל שיפור תוך שבוע יש לפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בבייביזים טיפות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

#### תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד!

אם הופיעה תופעת לוואי או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/בקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

#### תנאי אחסון

- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- לאחר פתיחה ראשונה אפשר להשתמש במשך 12 חודשים.

### 6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Glycerin, alcohol 95%, glycine, calcium chloride dihydrate, sodium Nipagin, lactic acid 90%, Tutti Frutti, hydrochloric acid conc. 33%, purified water.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
תמיסה חסרת צבע עד צהבהבה. אריזת הקרטון מכילה בקבוק ובו 40 מ"ל תמיסה.

**בעל הרישום והיצרן:** סם-און בע"מ, רח' אהוד קנמון (העבודה) 25, בת-ים.

**נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 25-17-21245

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.