

# אקמול® קפלויות

הרכב

כל קפליה מכילה:

פראצטמול 500 מ"ג (Paracetamol 500 mg)

למידע על המרכיבים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

**תרופה זו (בשיווק כללי) ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה.**

**עליו ליטול את התרופה על פי הוראות בסעיף 3 בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.**

**יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.**

## 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום הנגרמים מסיבות שונות, כגון: כאבי ראש, כאבי שיניים, הצטננות, שפעת, כאבים שירגוניים (ראומטיים) וכאבי מחזור.

**קבוצה תרופטית:**

משכך כאבים ומוריד חום.

## 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות לפראצטמול או לאחד ממרכיביה האחרים של התרופה.

## אזהרות ומיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב לתופעות עוריות חמורות.

• התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לנזק בכבד כאשר:  
◦ ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.  
◦ בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.

• נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.  
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי היוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות נוספות ולהורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח, למניעת מינון יתר או הרעלה של פראצטמול.

אין ליטול תרופות נוספות מ"משפחת אקמול" /ואו תכשירים נוספים המכילים פראצטמול.

• יש להימנע מלקיחת מינון גבוה (בגבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

**ספר לרופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:**

- רגישות למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד.
- ליקוי בתפקוד הכליה.
- אלכוהוליות.
- צהבת.
- אם את בהיריון או מניקה.

**תגובות בין תרופות ואם אתם לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

• במיוחד אם אתה לוקח:  
תרופות נגד קרישת דם, כגון וורפרין.

• תכשירים המזרזים יצור אנזימים בכבד (לדוגמה: ריפמפיצין, תרבוטורטים).

• תרופות לאפילפסיה – פניטואין, קרבמזפין.

• תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידיים.

• מטוקלוראמיד או דומפרידון (לטיפול בבחילה, הקאה ובעיות עיכול נוספות).

• כורמפניקול (אנטיביוטיקה).

• פרובניד (לטיפול בשידון).

• כולסטרזאמינ (להפחתת יתר שומנים בדם).

## שימוש בפראצטמול וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בפראצטמול בגלל עלייה בסיכון לנזק בכבד.

## היריון והנקה

אם הינך בהיריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

## היריון

יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר היעילה עבורך לשיכוך הכאב /או להורדת החום, למשך הזמן הקצר ביותר האפשרי. היוועץ ברופא אם אין הקלה בכאב או בחום או אם את צריכה ליטול את התרופה לעיתים תכופות יותר.

## הנקה

מכיוון קטנות של פראצטמול עוברת לחלב אם. יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.

## נהיגה ושימוש במכוונת

פראצטמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכוונת.

## שימוש בילדים

תרופה זו, בשיווק כללי, מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

**בהעדף הוראה אחרת מרופא, המינון המקובל בדרך כלל הוא:**

**מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה:**

1-2 קפלויות כל 4-6 שעות לפי הצורך.

אין לעבור על מינון של 8 קפלויות ליממה.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**עליו לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 5 ימים, למרות השימוש בתרופה.**

## אופן השימוש

אין ללעוס או לכתוש!

ניתן לחצות את הקפלויות בקו החצייה.

יש בללוע את התרופה עם מטט מים.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחולה מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה איתך.** אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! גם אם הרגשתך טובה, טיפול מיידי הוא חיוני, **בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד.** תופעות לוואי למינון יתר יכולות להיות: בחילה והקאה, שלשול, אובדן תאבון, כאבי בטן, נפיחות, הזעה מוגברת, כאב או רגישות בבטן העליונה וייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

**אין ליטול תרופות בחושהן! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים או הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באקמול עלול לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחילה, הפרק, השימוש במשקפיים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות הלוואי עלולות להיות מורות יותר בקששים.

## תופעות לוואי חמורות:

**יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד:**

• אם מופיעות תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה וגוד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, הגרון /או הגפיים אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה.

• אם מופיעות תגובות חמורות כגון פריחה, פגיעה עורית נרחבת.

• תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.

אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.

• אם מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם, כגון: דימומים, הופעת בחורות בקלות, התפתחות דלקות ביתר קלות כתוצאה מירידה חמורה במספר תאי הדם הלבנים.

• אם מופיע קוצר נשימה (נדיר).

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הינך סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.**

## דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה מחוץ להישד ידע וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.**

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישד ידע וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרומ להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.**

## 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Pregelatinized starch, povidone, stearic acid, hydroxypropyl methylcellulose, polyethylene glycol.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

טבליה מוארכת בצבע לבן-קדם עם קו חצייה בצדה האחד. הקפלויות ארוכות באריזת בליסטר (מגשית) המכילה 14 קפלויות או באריזת בקבוק המכילה 16 קפלויות.

**שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:**

טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

**עלון זה נערך במרץ 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

128.74.25337.08

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.