

- אין להשליך את הטבליות דרך מי שופכן או אשפה ביתית. שלאל את הרוקח כיצד לפנות תרופות שאין בהן צורך, זאת כדי להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

ונוסף על החומרים הפעילים התורופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous

הציפוי של טבליות קו-דיבאן 80/12.5 מ"ג מכיל:

Hypromellose, talc, macrogol 8000, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron oxide (E172)

הציפוי של טבליות ק-דיבאן 160/12.5 מ"ג מכיל

Hypromellose, talc, macrogol 8000, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172).

הציפוי של טבליות קו-דיבאן 160/25 מ"ג מכיל:

Hypromellose, talc, macrogol 4000, black iron oxide (E172), red
iron oxide (E173), yellow iron oxide (E172), titanium dioxide (E171)

כיצד גראית התרזופת ומחה מוגן האריזה?

אקו-דיבאן 12.5/80 מ"ג: טבליות מצופות בצעב כחום בהיר, אוביאליות

ב- 160/12 מ"ג: נורליות מצוינות בראבע צ- CG בצד השמאלי.

עם הטבעה של HHH בצד אחד ו- CG בצד השני. ללא פס ח齊יה.

אקל הואה גאנט אנד - NVB גאנט האון. לאן פון צ'וּקָה-דִּיוֹבָּאָן 160/25 מ': טבליות מצופות בצע החום, ?

בעל הרישום והיבואן וכותבתו: נוברטיס ישראלי בע"מ, ת"ד 7126, ירושלים.

תל אביב, ינואר 2022, סדרת שאלות ותשובות

הנחיות משליך הבריאות נערן באפריל 2022 בהתאם לתקופה בפנקס התroxיות הממלכתי ממשרד הבריאות:

114 50 29616 מ"ג 80/12.5 דיו-דייבאן

מ"ג 160/25 ד"ר זאב דvirgo@post.tau.ac.il

לשם הפטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נושא בלבד.

התרופה מיועדת לבני שני המינים.

- ocab חרי' בבען עליונה (דלקת הלבלב)
 - קשי' בשינה עם חום, שיעול, צפופים, קווצר ריאתית כשל דלקת ריאות, ובצתת ריאתית
 - עור חיוור, עיפות, קווצר נשימה, שタン כהה (סימנים אפשריים לאנמיה המוליטית)
 - חום, כאב גרון או כאבים בפה כהתוצאה מழימות (ליוקופניה)
 - בבלבול, עייפות, עזיפות והתקאות שריריים, נשמה מהירה (סימנים אפשריים של בססת הנובעת מרמותנו נזוכות של קלור בדם) תופעות לוואי שכיחותן איניה ידועה (לא ניתן להעריך את שכיחותן מהנתונים הקיימים):
 - חולשה, חבורות וויהומים תקופיים (אנמיה אפלטיטית)
 - ירידת חומרה בתפקוד השתן (סימנים אפשריים להפרעות בכליה או לכשל כלילי)
 - פריחה, אדמניות בעור, שלפוחיות בשפתים, בעיניים או בפה, קילוף בעור, חום (סימנים אפשריים של אדמנת רב-צורתית)
 - התכווצות שרירים
 - חום (קדחתת)
 - חולשה

5. אין לאחסן את הטרופה?

- סרטן העור והשפטים (סרטן עור מסוג שאים מלאנומה), או אם הופעה תופעת לואוי, אם אחת מתופעות הללויאי מחמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לואוי שלא צינה בעлон, עלייר להתייעץ עם הרופא.
 - דיזוז על תופעות לואוי ינתן לדוח על תופעות לואוי לשדרת הבריאות באמצעות לחיצה על קישור "דיזוז על תופעות לואוי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אחר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקיים לדיזוז על תופעות לואוי או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>
 - **איך לאחסן את התרופה?**
 - מנע העלילה! תרופה זו וכל רופואה אחרת יש לשמרם במקומות סגור מחוץ להישג ידם ווטוות וראיתם של ילדים / או תינוקות ועל-ידיך מתנווג הרעללה. אל תגרום להקהה לאלה הרואה מפושת מהרופא.
 - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגונה (exp. date) המופיע על גבי האריהה. תאריך התגונה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - יש לאחסן מתחת ל- 30°C . יש להגן מלוחות.
 - אין להשתמש בתרופה אם אריזת התקשר פגומה.

- רמות נמוכות של אשלגן בدم
 - עליה של שומנים בדם תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות עד משתמש 1 מתוך 10 משתמשים):
 - רמות נמוכות של נתרן בדם
 - רמות גבוחות של מגנינים בדם
 - רמות גבוחות של חומצה אורית בדם
 - פריחה מגרדת או צורות אחרות של פריחה
 - ירידה בתאובן
 - בחילה קלה והקאה
 - סחרחות, עילפון מעבר למצב עמידה
 - חוסר יכולת להשיג או לשמר זיקפה
 - תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות עד משתמש 1 מתוך 1,000 משתמשים):
 - נפיחות ושולפוחיות על העור (בשל עליה ברגשות העור לשמש)
 - רמות גבוחות של סיידן בדם
 - רמות גבוחות של סוכר בדם
 - סוכר בשתן
 - החמרה במצב הסוכרת המטבולית
 - עצירות, שלישול, אי-נוחות בעטן, הפרעה בכבד שיכולה להתרחש יחד עם הצבהה של העיניים והעור
 - קצב לב לא סדר
 - כאב ראש
 - הפרעות בשינה
 - מצב רויז יוד (דיכאון)
 - רמות נמוכות של טסיות בדם (לעתים עם דימומיים או חבורות מת-עוררים)
 - סחרחות
 - עקצץ או חוסר תחושה
 - הפרעות בראייה
 - תופעות לוואי מאד נדירות (תופעות שמופיעות עד משתמש 1 מתוך 10,000 משתמשים):
 - דיזומות של לילדם עם הסמיים כגון פריחה, כתמים סגולים-אדומים, חום (vasculitis)
 - פריחה, גרד, סרפדות, קשי נשימה ובלעה, סחרחות (תגבותות של רגשיות יתר)
 - פריחה בפנימ, כאב מפרקיים, הפרעה בשירים, חום (סימנים אפשריים של צבתה)