

زيتو 250

أقراص مطالية

التركيز:

يحتوي كل قرص مطالي من زيتو 250 على:

أزتيروميسين (على شكل ديبيدرات) 250 مل.

Azithromycin (as Dihydrate) 250 mg لقائمة الموارد غير الفعالة وموادات الحساسية في

المستحضر - انظر الفقرة 6

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال

لدواء، تحظى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجل، لا تطهيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص عادة لأطفال ورضع دون عمر 6 أشهر.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

لعلاج التلوثات الناجمة عن جراثيم حساسة للمستحضر، في الطرق التنفسية (التهاب القصبات الهوائية، إلتهاب الرئتين، إلتهاب الجيوب الأنفية،

إلتهاب المخجرة وإلتهاب الولذتين)، الجلد والأنسجة الرخوة، الأذنين، والتلوثات في الأعضاء التناسلية الناجمة عن المتعددة الحثرية Chlamydia (trachomatis).

الفصيلة العلاجية: مضاد حيوي من فصيلة الماكروليدات.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (أبيرجي) للمادة الفعالة (أزتيروميسين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء التي تظهر في

الفقرة 6

وحدث لديك سابقة لرد فعل تحسسي للمستحضر أو لإبريزوميسين أو لمضاد حيوي آخر من فصيلة الماكروليدات أو الكينوليدات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب! عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحدان من قبل الطبيب فقط.

يجب تناول القرص مع القليل من الماء، عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري، لا توفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفروضاً أو إذا بلع بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فتناول مقداراً دوائياً حالاً عن ذكرك بذلك، لكن إذا حان موعد تناول المقدار الدوائي التالي الخاص بك، فيجب تقوية المقدار الدوائي المنسي وتناول المقدار الدوائي التالي كما هو معتاد، لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدار دوائي مضاعف عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تقوية مقدار دوائي من زيتو أو التوقف عن تناول الدواء، حتى ولو بدأت تشعر بشكل أفضل، إلى أن تتحمّل العلاج، عدا حالات التي تعاني فيها من رد فعل تحسسي خطير أو أن الطبيب أوصاك بالتوقف عن تناول الدواء (انظر الفقرة 4 «الأعراض الجانبية»)، إذا فوتت تناول مقدار دوائية أو إذا لم تستكمّل كافة العلاج بـ زيتو، فإن العلاج قد لا يؤثر كما ينبغي، وسوف يكون من الصعب أكثر معالجة التلوث الذي لديك، إن إتمام كافة العلاج يقلل من خطورة أن تطور الجراثيم مقاومة لـ زيتو.

إذا طورت الجراثيم مقاومة لـ زيتو، فإن زيتو ومضادات حيوية أخرى قد لا تكون ناجحة في المستقبل.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

• عانت في الماضي من يرقان نتيجة إنسداد تدقق (cholestatic jaundice) أو من خلل في الأداء الوظيفي للכבד التي ظهرت جراء إستعمال أزتيروميسين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت:

• تعاني من إلتهاب في الرئتين.

• تعاني من التليف الكيسي.

• تعاني أو هناك شك لحدوث تلوث جرثومي في الدم

• تعاني من مشاكل في أداء الكبد أو الكلى.

• تعاني من عدم إنتظام النبض خاصة من مشكلة تسمى «إطالة مقطع QT».

• تعاني من مرض الذي يؤدي إلى ضعف عضلي (الوهن العضلي الوبي).

• تعاني من مشاكل طيبة أخرى.

• في فترة الحمل أو الرضاعة، تخططن لحصول حمل أو الإرضاـع - أنظر فقرة «الحمل والإرضاـع».

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً دوائية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكـل للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، يجـب إبلاغـ الطبيب أو الصيدلي بالأخـس إذا كنت تتناولـ:

• تلقيـافـير (اللـعـاجـ الإـيدـيـنـ) لأنـ المـشارـكةـ قدـ تـرـفـعـ منـ نـسـبـ آـزـيـرـوـمـيـسـيـنـ فـيـ الدـمـ.

• مستـحضرـاتـ مضـادـةـ لـلـتـخـرـ (ـمـثـلـ وـارـفارـارـينـ) - يـجبـ الخـضـوعـ لـمـتابـعـةـ وـمـراـقبـةـ لـمـؤـشـراتـ التـخـرـ.

• دـيجـوكـسـيـنـ.

• كـولـشـيـنـ.

• فيـنـيـتوـنـيـنـ.

• مـسـتـحضرـاتـ مـضـادـةـ لـلـحـمـوـضـةـ الـحاـوـيـةـ عـلـىـ أـلـمـينـيـونـ أوـ مـنـدـيزـيـمـ.

أـلـمـينـيـونـ أوـ مـنـدـيزـيـمـ.

إـسـتـعـمـالـ الدـوـاءـ وـالـطـعـامـ

يجب التناول ساعة قبل أو ساعتين بعد الطعام.

الحمل والإرضاـع

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب بهذه العلاج وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو تخططين حمل، لا يُعرف فيما إذا كان زيتو سليمانـيـنـ يـضرـرـ بـجـنـينـكـ.

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج وذلك إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخططين للرضاعة، تبلغـ بـانـ زـيـتوـ يـنـتـقلـ إـلـيـ حـلـبـ الأمـ إـسـتـشـيرـيـ الطـبـيـ بـحـصـصـ الـطـرـيقـةـ الـأـفـلـىـ.

لإـطـاعـمـ رـضـيعـ خـلـلـ فـتـرةـ الـعـلاـجـ بـ زـيـتوـ.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال زيتون قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الم佳ائز لا تعانى أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب في حال حدوث:

• ردود فعل تحسسية خطيرة. قد تحدث ردود فعل تحسسية بعد تناول أزيتون مسيسين، المادة الفعالة التي يحتويها زيتون، حتى بعد تناول مقدار دوائي واحد فقط. توقف عن العلاج وتوجه حالاً إلى الطبيب إذا شعرت بواحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- صعوبات في التنفس أو صعوبات في البلع
- إنتفاخ في الشفتين، في اللسان أو في الوجه
- تضيق في الحنجرة، بحة
- نبض سريع
- إغماء

ـ فحص جلدي (شرى)

ـ ظهور جديد لسخونة وإنفاس في الغدد الليمفاوية يجب التوقف عن إستعمال زيتون مع ظهور العلامات الأولى لطفح جلدي والتوجه حالاً إلى الطبيب. إن الطفح قد يكون علامة لرد فعل أكثر خطورة لـ زيتون.

• ضرر كبدى (تضير كبدى). توقف عن إستعمال الدواء وتوجه حالاً للطبيب في حال إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين. بول بلون داكن، غثيان أو تقيؤات، ألم أو حساسية عند لمس البطن، سخونة، ضغف عام، حمى، إرهاق شاذ، قلة الشهية للطعام، تغيرات في لون البراز. قد تكون تلك علامات لرد فعل خطير لـ زيتون (تضير كبدى).

ـ يجب التوجه حالاً إلى الطبيب في حال حدوث:

ـ تغيرات خطيرة في نظم القلب التي قد تشكل خطراً على الحياة. تشمل توقف القلب (cardiac arrest)، إطالة مقطع QT، تورساد دي پوانت - إضطراب نظم بطيني، الشعور بأن قلبك يتبضّع أو يتسارع (خفقات)، إنتزاع في الصدر أو عدم انتظام النبض.

ـ توجه للطبيب حالاً إذا شعرت أنت أو طفلك بنبض سريع أو غير منتظم، دوار أو ضعف. قد يسبب زيتون مشكلة نادرة في القلب والتي تعرف بإطالة مقطع QT. قد تؤدي هذه الحالة إلى عدم سلامة النبض وقد تكون خطيرة جداً. تكون الخطورة أكبر لحدوث ذلك لدى المسنين، لدى متعالجين لديهم سابقة عائلية لإطالة مقطع QT، لدى متعالجين لديهم نسبة منخفضة من البوتاسيوم في الدم، لدى متعالجين يتناولون أدوية معينة للسيطرة على نظم القلب (مضادات إضطرابات النظم).

5. كيفية تخزين الدواء؟

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية وفي مكان محظى من الضوء.

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال / أو الرضيع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسنم. لا تسبب التقويم بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

6. معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Dibasic calcium phosphate (anhydrous), Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Carmellose sodium LS, Sodium lauryl sulphate, Colorant.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

أعراض زيتون هي مستيردة، محدبة من كلا الجانبين ولونها برتقالي، وهي ذات خط للشطر من جانب واحد. هي معاً صمن لوحات (بليست) داخل علبة الكرتون.

أحجام العلب المصادر علىها:

في كل علبة لـ زيتون 250 يوجد 2, 6, 10, 12 و- 24 قرصاً.

من الم佳ائز لا تستوّك كافة أحجام العلب.

إسم صاحب الإمكانيات وعنوانه: يونيفارم م.ض.، ص.ب.، 21429، تل - أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض.، بارك الصناعة «ماقو كرم». رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي

في وزارة الصحة: 103 83 28422 01 تم تدوينها في 05/2022 بموجب تعليمات وزارة

الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه

النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.