

שופורט:
יש למרוח את הגל וולסוטו עד לספיקתו בעור. אם הגל לא נספג כלו, תיתכן הכתמתה זמנית קלה של העור וכן הכתמתה בגדים.

אין להשתמש בתרופה לתקופת העולה על ארבעה שבועות לפחות לדווח על כך לחזק או לדופא.

אין למרוח באוזור העיניים, האף, הפה, באוזור איברי המין או פי הטבעת, ברקמות ריריות או במרקמות בהם העור פצע, או בכל מצב אחר בעור המשפשע על מקום הטיפול. אם הגל בא במגע עם מקומות אלו, יש לשטוף את המקום היטב עם מים. אין לכוסות/לחובש את האוזור המתופל באקסיפן גל.

לאחר השימוש בתרופה: יש לסגור היפט את השופורט או בקבוק הרול-און ולשטוף ידים.

אין לעור על המנה המומלצת! שים לב: אין לבולו אקסיפן גל מיועד לשימוש חיצוני בלבד, למריחה על גבי העור.

אם השתמשה בכמות עודפת (מינון גבוהה מדי)
או אם בטעות מישחו בעל מהתרופה שימוש בכמות עודפת של התרופה לא סביר כייגרום לתופעות לוואי.
אם מישחו בעל מן התרופה בעוטות, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לשמש בתרופה זו בזמן הדורש, יש לשמשה בה מיד שנכחrat אלא אם כן זהו הזמן לשימוש הבא. **בשם אופן אין לשמש בכמות כפולה!**

אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה הכאב שלך עלול לחזור.
אם ליטול תרופות בחושרן בדוק את התוויות והמנה **בכל פעם** שהרג נוטל תרופה. הרכוב משקפיים אם הנרג זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

יש להפסיק את השימוש באקסיפן גל ולפנות מיד לרופא במקרה שהנרג חווה את התופעות הבאות:
צפוצפים פתאומיים בנשימה, קשי נשימה, חום, התנפחות העפעפיים, היפנים או השפעתיים, פריחה או גרד מפותחים על כל הגוף. שכיחות תופעות אלו היא נדירה, אך הן עלולות להיות רציניות.

תגובה ערית חמורה העוללה לסיכון חיים ואופיינית על ידי פריחה בעור שלעים מלאה בשלפוחיות ופצעים (כגון: תסמנות סטיבנס-ג'ונסון ונמק אפרידרמי רעלני) - מדובר נדיר.

תופעות לוואי נוספת נוספת:
אדומות, פריחה ו/או גרד באיזור המריחה (כגון: אקזמה, דלקת עור), Fixed drug eruption (יכול להראות כמו טאים עגולים או אובליטים של אדומות וונפחות עורית), שלפוחיות (חרලט), גירוד. השיכחות של תופעה זו אינה ידועה. תגובה ערית בחשיפה לאור השמש.

תופעות לוואי נוספת נוספת:
בחילה, אי נוחות והפרעות במערכות העיכול. תופעות לוואי אלו אמורים לחלו עם הפסקת השימוש בתרופה.

אם ההפרעות במערכות העיכול ממשיכות לאחר הפסקת השימוש בתכשיר, עליך להתייעץ עם הרופא שלך או הרוקח.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין מחמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעולו, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

• מגניע הרעלן! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשומרה במקומות סגור מחוץ להישג ידם ופווה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמןן הרעלן. אל תגרום להקה לא הוראה מהפורשת מהרופא.

• אין לשמש בתרופה אחרי תאריך התגובה (date of exp). המופיע על בקבוק תרופה אחריה. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של תופעת לוואי, או ע"י כינסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/> בוסף, ניתן לדוחות לחברת פאדרגיס באמצעות הכתובת הבאה: padagis.co.il

• **איך לאחסן את התרופה?**
מגע הרעלן! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשומרה במקומות סגור מחוץ להישג ידם ופווה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמןן הרעלן. אל תגרום להקה לא הוראה מהפורשת מהרופא.

• אין לשמש בתרופה לפני תאריך התגובה (date of exp) על ידי קר תמןן הרעלן. תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של תופעת לוואי.

• יש לאחסן מתחום -25°C.

• לאחר הפתיחה הראשונה ניתן לשמש בתמך 6 חודשים, ובכל מקרה לא יאוחר מהתאריך התגובה.

6. מידע נוסף

• **נוספ על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Purified Water, Alcohol 95%, Diethylene Glycol Monoethyl Ether (Transcutol), Cetiol HE, Hydroxyethyl Cellulose (Natrosol), Poloxyl-(23)-Lauryl Ether (BRIJ 35), Trolamine, Arlacel 186, Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben), Propyl Parahydroxybenzoate (Propyl Paraben)

• **כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארייה:** אקסיפן גל גל צבען שקו-צהבהב ארכוז בשפורט המכילה 50 גרם, או בקבוק רול-און המכיל 90 מ"ל. יתכן שלא כל גודלי הארייזות מסוימים.

• שם היצרן, בעל הרישום וכתובת: פאדרגיס ישראל פרמצטטיקה בע"מ, רח' רפקט 1, שוהם.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 065-11-27132-00-00-2022 בהतאם להנחיות משרד הבריאות.

• נערך במרץ 2022 לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה מוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים
(תקנירוף) התשנ"ז-1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

אקסיפן® ג'ל W/W% 0.5% בקבוק רול-און, שופורט

החומר הפעיל וכמותו:
פירוקסיקאם W/W% 0.5%
(Piroxicam 0.5% W/W)

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התכשיר" וסעיף 6 בעולן.

קרא בעיון את העולן עד סוף בטטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לשמש בתכשיר על פי הוראות המילון בסעיף 3 בעולן זה. היועץ ברוקח אם הנרג זקוק למידע נוסף.

עליך לפנות לרופא במידה שתסמיini המחלה (סימפטומים) מחקרים או אינם משתפרים לאחר ארבעה שבועות.

1. למה מיועדת התרופה?

אקסיפן ג'ל מיועד לטיפול מקומי במצב דלקת המלולים בכабב.

קבוצה רפואיית - תכשירים נוגדי דלקת לא סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני שימוש בתרופה

אין לשמש בתכשיר אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פירוקסיקאם או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילו התרופה (ראה סעיף 6).

- אתה רגיש (אלרגי) לתכשירים אחרים או כאשר תכשירים נוגדי דלקת אחרים של קושי נשמה, פוליפים באף, גירוי ודלקת בעור.

אין לשמש בתכשיר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

• אם הנרג סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכלב או הכליאות.

אינן מיעדות הנוגעות לשימוש בתכשיר:

• השימוש באקסיפן ג'ל דווקא במקרה תגובהם של סטיבורנס-אלג'וסון ונקב אפיזרמלי רעלני.

הפריחה העורית על הגורע עשויה להופיע תחילת כנוקודות אדומות ממוקדות או כתמים עגולים עם שלפוחיות במרכז. סטמינים ננספים שיש לבדוק כוללים: כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ודלקת בחלהמת העין (עינים אדומות ונפוחות).

תגובהם ערירות מסכנות חיים אלו מלות לרוב בתסמיינים דמו"ש שפעת. הפריחה עשויה להתפשט כשלפוחיות או קקלוף של העור. הסיכון הגבוה ביותר להופעת התגובה העורית הינו בשבע הראשן לטיפול.

אם פיתחת תגובה ערית חמורה לאחר שימוש בפירוקסיקאם בעבר, אין לחזור לשמש בו.

יש להפסיק את הפריחה ערית שפעתם באירוע ריאשוני של פירוקסיקאם בעור, אין לחזור לשמש בו. העור, נגעים ריריים או כל תסמן אחר לריגושים יתרה. במקורה זה יש לפחות מידיית לרופא ולדעתנו על השימוש באקסיפן ג'ל.

• תכשירים נוגדי דלקת לא סטרואידים, כולל אקסיפן גל, עלולים לגרום לנזק לכליות או לכשל כלייתי.

זהירות! חומר דליק, שמר מפני אש. אין להדליק סיגריה או להיחשך לאש עד ליבוש מוחלט של התכשיר.

ילדים ומתבגרים אקסיפן ג'ל לא מיועד לטיפול בילדים מתחת לגיל 12 שנים.

לא ידוע על תגובות בין תרופתיות בין אקסיפן ג'ל לתרופות אחרות. אם אתה לוחק או לך רקת לאחרונה תרופה אחרת, כולל תרופות לא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות אם הנרג מנסה להיכנס להריון או שהנרג עבר בבדיקות פוריות, יש לשקל את הפסקת הטיפול בתכשיר. אקסיפן ג'ל עלול להגביר את הסיכון להפלות בשלבי ההריון המוקדמים.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנרג מתכנת להיכנס להריון או שהנרג מניקה.

لتכשיר זה קיימות תגובות לוואי אפשרית של גגעה כל-יתנית בעורבר ומיעוט מי שפיר החל משבוע 20 להריון. מומלץ להימנע משימוש בתכשירים ממשפחת ה-NSAIDs-ה-קסילן החל משבוע 20 להריון ולהיוועץ באיש צוות רפואי במדינת הצורן.

הנήמה ושימוש במכונות ג'ל לא לשמש בתמוכות השימוש באקסיפן ג'ל לא צפוי להשפיע על היכולת של לנגן או לשמש בתמוכות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה אקסיפן ג'ל מכל:

• פרבימים העולמים Lageroms לתגובה אלרגית ("יתכנו תגובה מאוחרות").

• 18.1 גרם אנתולן שריפה על גב עור ניזוק.

האלכוהול בתכשיר זה עלול לגרום לדלקת בעור בתינוקות מתחילה לגיל 4 שבועות כולל תינוקות שנולדו לפני הזמן, ריכוז גבוה של אנתולן עלול לגרום למין מוגבל של פירוקסיקאם לשימושם מתקופת מוקדמים.

לואוי רעלות כליליות, שכן הוא יספג דלקת התינוק (במיוחד אם העור מכוסה).

3. כיצד לשמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או לרוקח אם אין בטוח בוגר למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

יש למරוח 1 גרם ג'ל (כ- 3 ס"מ) במקום הנגוע 3-4 פעמים ביום.

אם אין שיפור בתסמינים, יש לידע את הרופא.

אופן השימוש:

בקבוק רול-און:

יש לעסוט את האיזור הכוואב בעזרת הגדודית שבראש הקבוק במשך כחצ'י דקה.

לאחר מכן, אפשר לעסוט ביד את האיזור עד לספוגה מלאה של הגל בעור (עד שהגל "געלם").

יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש.

הערה: במידה שההשפעה בתרופה אינטנסיבית עלולה להיווצר על הגדודית שכבת דקה וצוף, עלולות להיות ריח אופני. שכבה זו אינה משפיעה על איכות ופעילות התרופה. יש לנגב את הגדודית עד ששה scavenger תיעלם ואיתה גם הרופא.