

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

גלוקומין® 850 מ"ג, קפליות

כל קפלייה מכילה מטפורמין הידרוכלוריד

(Metformin Hydrochloride) 850 מ"ג.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה, עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מצבם הרפואי דומה.

1. להם מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בסוכרת מסוג 2, במיוחד במטופלים עם מיקם עודף, כאשר שינוי בתזונה והתעמלות לבדם אינם מספיקים לייצוב רמות הגלוקוז בדם.

• במבוגרים, **גלוקומין** מותווה לטיפול יחיד או בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בסוכרת במתן דרך הפה או עם אינסולין.

טיפול יחיד או בשילוב עם אינסולין, ירידה בסיבוכי סוכרת נצפתה במטופלים מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 בעלי משקל עודף אשר סופגו במטפורמין כקו טיפול ראשון לאחר כישלון בשינוי התזונה.

קצובה תרפויטית: תרופות להורדת רמות הגלוקוז בדם, החומר הפעיל שייך לקבוצת הביגואנידים.

אינסולין הוא הרעול המיניצור על ידי הלבבל, הגורם לגוף לקלוט גלוקוז (סוכר) מהדם, הגוף שלך משתמש בגלוקוז כדי לייצר אנרגיה או אוגר אותו לשימוש עתידי.

אם אתה סובל מסוכרת, הלבבל שלך לא מייצר מספיק אינסולין או שגופך אינו יכול להשתמש כראו באינסולין המיוצר על ידו. זה גורם לרמה גבוהה של גלוקוז בדם. **גלוקומין** עוזר להוריד את רמת הגלוקוז בדם בעלם תתן ככל הפאשר.

אם אתה מבוגר בעל משקל עודף, נטילת **גלוקומין** לטווח ארוך מסייעת גם בהפחתת הסיכון לסיבוכים הקשורים לסוכרת. יש קשר בין **גלוקומין** לבין משקל גוף יציב או לירידה מתונה במשקל.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (מטפורמין) או לכל אחד מהרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

• אתה סובל מבעיות כבדד.

• אתה סובל מליקוי חמור בתפקוד הכליה.

• אתה סובל מסוכרת שאינה מאוזנת עם, לדוגמה, היפוגליקמיה חמורה (רמות גלוקוז גבוהות בדם).

• אתה סובל מבעיות לב, אתה סובל מבעיות חמורות, לא תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מצבם הרפואי דומה.
• **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**, עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
• תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מצבם הרפואי דומה.
• תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מצבם הרפואי דומה.
• **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**, עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

• איבדת יותר מדי נוזלים מהגוף (התיבשות) למשל כתוצאה משלשול מתמשך או חמור או מהקאות רצופות. התיבשות עלולה להוביל לבעיות אחרות. אשר יכולות לגרום לסיכון להמצת לקטית (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

• אתה סובל מזיהום חמור כגון זיהום המשפיע על הריאות/מערכת הסימפונות/הכליה שלך. זיהומים חמורים עלולים להוביל לבעיות בכליות, אשר יכולות לגרום לסיכון להמצת לקטית (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

• אתה סובל מאי ספיקת לב חמורה או עברת לאחרונה התקף לב, אתה סובל מבעיות חמורות במחזור הדם (כגון שקן או סובל משינוי נשימה. מצבים אלו עלולים להוביל למחסור באספקת החמצן לקרקעות, אשר יוכל לגרום לסיכון להמצת לקטית (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

• אתה עוצר כמיות גדולות של אכילה.
• אם אחד או יותר מהמצבים לעיל נכון לגביך, ברפא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בגלוקומין, ספר לרופא אם:

• אתה עומד לעבור בדיקה כגון צילום רנטגן או סריקה, הדרושת תערוכת חומר יגוד המכילים יוד לדמך.

• אתה עומד להקטין ניות חלב.

• עלך להפסיק את נטילת **גלוקומין** לתקופה מסוימת לפני ואחרי הבדיקה או הניתוח. הרופא שלך יחליט אם ופני זקוק לטיפול אחר בתקופת זמן זו. חשוב שתמלא אחר הוראות הרופא במדויק.

אזהרות מיוחדות נוספות

סיכון להמצת לקטית

גלוקומין עלול לגרום לתופעת לואי בדירה מאוד אך גם חמורה מאוד, הנקראת המצת לקטית. במיוחד אם הכליות שלך אינן מתפקדות כראוי. הסיכון לפתח המצת לקטית עולה גם במצבים הבאים: כאשר הסוכרת אינה מאוזנת, זיהומים חמורים, צום ממושך, צריכת אלכוהול מופרזת, התייבשות (ראה מידע נוסף מטה), עליות כבד ובכל מצב רפואי בו יש ירידה באספקת החמצן לאיברי הגוף (כגון מחלת לב רחבה וחמורה).

אם אחד או יותר מהמצבים לעיל נכון לגביך, היוועץ ברופא לקבלת הנחיות נוספות.

יש להפסיק את נטילת גלוקומין לתקופה קצרה, אם אתה סובל ממצב שיכול להיות קשור להתייבשות (איבוד ממשותני של נוזלים) כגון הקאות חמורות, שלשולים, חום, חשיפה לחום או אם אתה עוצר פחות נוזלים מהרגיל. היוועץ ברופא לקבלת הנחיות נוספות.

יש להפסיק את נטילת גלוקומין ולפנות לרופא או לחדר מיון של חולים מיד, אם אתה חווה חלק מהתסמינים של המצת לקטית, מאחר שמצב זה עלול לגרום לתרדמת.

התסמינים של המצת לקטית כוללים: הקאות, כאב בטן, התכווצויות שרירים, הרגשה כללית לא טובה העלוה בעייתפת חמורה, קשי נשימה, ירידה בטמפרטורת הגוף ובדופק.

המצת לקטית היא מצב חירום רפואי המחייב טיפול בבית חולים.

אם אתה עוצר לעבור ניתוח גדול, עליך להפסיק את נטילת **גלוקומין** במהלך ולמשך זמן מה אחרי ההליך. הרופא שלך יחליט מתי עליך להפסיק ומתי להתחיל מחדש את הטיפול בגלוקומין.

גלוקומין כטיפול יחיד אינו גורם היפוגליקמיה (רמת גלוקוז נמוכה מדי בדם). אולם, אם אתה נוסט ל**גלוקומין** יחד עם תרופות אחרות לטיפול בסוכרת היכולות לגרום להיפוגליקמיה (כמו סולפונילאוריאה, אינסולין, מגליטינידים), יש סיכון להיפוגליקמיה. אם אתה חווה תסמינים של היפוגליקמיה כגון חולשה, סחרחורת, הזעה מוגברת, דופק מהיר, הפרעות ראייה או קשיי ריכוז - שתייה או אכילת מזון המכילים סוכר עוזרים בדרך כלל במצב זה.

בדיקות ומעקב

הרופא שלך יבצע בדיקות סדירות לגלוקוז בדם ויתאים את המינון של **גלוקומין** לרמות הגלוקוז שלך.
בדם. יש להקפיד לשלוח עם הרופא באופן שגורתי. ניטור הל חשוב במיוחד בילדים, במבוגרים קשישים.
• במהלך הטיפול בגלוקומין, הרופא שלך יבדוק את תפקוד הכליות שלך לפחות פעם שבנה או בתדירות גבוהה יותר אם אתה קשיש ולא אם יש הרעה בתפקוד הכליות שלך.

הנגובות לבן תרופתי

אם עליך לעבור הזדקה לדם של חומר יגוד המכיל יוד, לדוגמה לצורך צילום רנטגן או בזמן ההזדקה, להפסיק לטויל **גלוקומין** לפני או אחרי הניתוח. הרופא שלך יחליט מתי עליך להפסיק ומתי להתחיל מחדש את הטיפול בגלוקומין.

אזהרות מיוחדות נוספות
אם אתה עשוי לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. ייתכן שתזדקק לניטור תכופ יותר של רמות הגלוקוז בדם ותפקוד הכליות של הרופא שלך יהיה צריך להתאים את המינון ל**גלוקומין**.

ספר לרופא או לרוקח במיוחד אם אתה לוקח:
תרופות משמידות את כמות השתן (מחסינים): תרופות לטיפול בכאב ודלקת (NSAID) ומעכבי COX-2, אגויפארופן, ביליקוטיב).
תרופות מסוימות לטיפול בלחץ דם (מעכבי אנזים המפרך אנגיוטנסין ACE, חוסמי הרצפטור לאנגיוטנסין II).

• אגויסטיים (לרצפטור בטא-2 כגון סלבוטמול או טרבוטולין (טיפול באסתמה).
• קורטיקוסטואידים (לטיפול במצבים שונים, כגון דלקת עז חמורה או באסתמה).

• תרופות העלולות לשנות את רמת ה**גלוקומין** בדםך, במיוחד במקרה של תפקוד כליתי ירוד (כגון רומבלין רפמפיצין, סימטידין, דולטגראביר, נרלין, טרימתופרם, ודטניב, איזובקאנזול, קריזוניבי, אולאפריב).
• תרופות אחרות לטיפול בסוכרת.

שימוש בתרופה ומיון

יש לטויל התרופה עם או מייד לאחר הארוחה על מנת להימנע מתופעות לואי במערכת העיכול.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

הימנע מצריכה מופרזת של אלכוהול בזמן הטיפול

ב**גלוקומין**, מאחר שתיתכן עלייה בסיכון להמצת

לקטית (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

היריון והנקה

ספרי לרופא אם את בהריון, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון, על מנת שחילטי אם יש צורך לשנות את הטיפול שלך או את ניטור רמות הגלוקוז בדם.

התרופה אינה מומלצת אם את מתקוה או מתכננת להניק.

הנאיה לשימוש במכונות

גלוקומין לבדו אינו גורם היפוגליקמיה (רמת גלוקוז נמוכה מדי בדם). לכן, התרופה לא אמורה להשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונות. אולם, יש לנקוט זהירות אם אתה נוסט ל**גלוקומין** יחד עם תרופות אחרות לטיפול בסוכרת העלולות לגרום להיפוגליקמיה (כגון סולפונילאוריאה, אינסולין, מגליטינידים). תסמינים של היפוגליקמיה כוללים חולשה, סחרחורת, הזעה מוגברת, דופק מהיר, הפרעות ראייה או קשיי ריכוז.

אם אתה נוסט לשימוש במכונות אם אתה מתחיל לחוש בתסמינים אלו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון והטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. **גלוקומין** אינו תחליף לקיום אורח חיים בריא. יש לקבוע אחר הנחיות התזונה שהמליץ הרופא ולהקפיד על פעילות גופנית סדירה.

המינון המקובל הוא:

ליום בגיל 10 ומעלה ומתבגרים:

המינון ההתחלתי הוא בדרך כלל 500 מ"ג או 850 מ"ג פעם ביום. המינון היומי המקסימלי הוא 2,000 מ"ג ביום מחולק על 2 או 3 מנות. הטיפול בילדים בגילאי 12-10 שנים מומלץ רק אם ניתנה הנחיה מפורשת מהרופא כיוון שהניסוי בקבוצת גיל זו מוגבל.

מבוגרים:

המינון ההתחלתי המקובל בדרך כלל הוא 500 מ"ג או 850 מ"ג פעמים ביום. המינון היומי המקסימלי הוא 2,550 מ"ג ביום, מחולק ל-3 מנות.

אם אתה סובל מליקוי תפקוד כליתי, ייתכן שרופאך ירשום לך מינון נמוך יותר.

אם אתה מטופל עם באינסולין, הרופא ינהה אותך כיצד להתחיל לטויל **גלוקומין**.

כאשר נדרש מינון של 500 מ"ג, ניתן לחצות את **גלוקומין** לקבלת מינון של 425 מ"ג, אשר יכול להיות חלופה לקפלייה המכילה 500 מ"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לקחת גלוקומין?

יש לטויל **גלוקומין** עם או מייד לאחר הארוחה, על מנת למנוע תופעות לואי במערכת העיכול.

יש לבלוע את הקפלייה עם כוס מים.

- אם אתה נוטל את התרופה אחת ביום, קח אותה ארוחת הבוקר.
- אם אתה נוטל את התרופה פעמיים ביום, קח אותה בבוקר (עם ארוחת הבוקר) ובערב (עם ארוחת הערב).
- אם אתה נוטל את התרופה פעמיים ביום, קח אותה בבוקר (עם ארוחת הבוקר), בצוהריים (עם ארוחת הצוהריים) ובערב (עם ארוחת הערב).

צורת הנטילה

- מותר לחצות בקפלייה את הקפליות.
- הקפליות לבצו תמישה או לעיסה של הקפליות. אין מידע לגבי תופעות לוואי עם מר של התרופה.

אם, לאחר זמן מה, אתה חושב שההשפעה של **גלוקומין** חזקה או חלשה מדי, היוועץ ברופא.

אם נטלת גלוקומין בעת גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר, אתה עלול לסבול מחמצת לקטית. תסמינים של המצת לקטית אינם ספציפיים כגון הקאות, כאב בטן עם התכווצויות שרירים, הרגשה כללית לא טובה המלווה בעייפות חמורה וקשי נשימה. תסמינים נוספים כוללים ירידה בטמפרטורת הגוף ובדופק. **אם אתה חווה תסמינים אלו, יש לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי, מאחר שממצת לקטית עלולה לגרום לתרדמת. הפסק מיד את נטילת גלוקומין ופנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים.**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לטויל את התרופה

אם שכחת לטויל תרופה זו בזמן המיועד, אין לטויל מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

יש להתימד בטיפול כמצב שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור לכאף בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין לטויל תרופות בחושרן! בדוק הנחיות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משפיקים אם אתה אתה להם.

יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**גלוקומין** עלול לגרום לתופעות לואי, בחלק מהשתמשים. אל תיבהל למקרא שאלות תופעות הלואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

גלוקומין עלול לגרום לתופעת לואי בדירה מאוד (תופעה שמופיעה בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000), אך חמורה מאוד שקראת המצת לקטית (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"). אם תופעה זו מתרחשת, **יש להפסיק את נטילת גלוקומין ולפנות מייד לרופא או לבית חולים**, מאחר שממצת לקטית עלולה לגרום לתרדמת.

תופעות לואי שכוחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך עשרה):

• הפרעות במערכת העיכול, כגון בחילה, הקאה, שלשול, כאב בטן ואיבוד תיאבון. תופעות אלו אלו ניתנות להקלה בדרך כלל בתחילת הטיפול עם **גלוקומין**. ניתן להקטיל על תופעות אלו על ידי חלוקת המינון במהלך היום כן על ידי נטילת **גלוקומין** עם או מייד לאחר הארוחה. **אם התסמינים ממשיכים, הפסק את נטילת גלוקומין והיוועץ ברופא.**

תופעות לואי שכוחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- שינויים בחוש הטעם.
- ירידה או רמות נמוכות של יטמיני B12 בדם (התסמינים עשויים לכלול עייפות קיצונית, לשון כאבת ואדומה (דלקת לשון - גלויטיס), תחושת סיקוט ומחטים (פרסדזיה) או עור חיור או צהוב].

הרופא שלך עשוי לערוך מספר בדיקות על מנת לללות את גורמי התסמינים מספר שחלקם עשויים להיגרם גם על ידי סוכרת או על ידי בעיות בריאות אחרות שאינן קשורות.

תופעות לואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- המצת לקטית. סיכור בדרך מאוד אך חמור מאוד, במיוחד אם הכליות שלך אינן מתפקדות כראוי. תסמינים של המצת לקטית אינם ספציפיים (ראה סעיף 2"אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- חיריות בבדיקות תפקודי כבד או צהבת (דלקת של הכבד, העלווה לגרום לעייפות, איבוד תיאבון, ירידה במשקל, עם או ללא הצהבה של העור או לובן העיניים), אם אתה חווה תסמינים אלו, **יש להפסיק את נטילת גלוקומין ולפנות לרופא שלך**.
- תגובות עוריות כגון אדמונית בעור (אריזמה), גרד או פריחה מוגברת (פרדט).

ילדים ומתבגרים

תונים מוגבלים לגבי לידים ומתבגרים הראו תופעות לואי דומות באופיין ובחומרתן לאלו שזוהו במבוגרים.

אם הפועה תופעת לואי, אם אחת מתופעות הלואי מחמירה או כאשר אתה סובל מנופעות לואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לזווח על תופעות לואי למשרד הבריאות במעטפת לחיצה על הקישור "לדיווח על תופעות לואי" עקב טיפול רופות". שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לואי, או על ידי כינסת ליעקשור.
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- במקום הרעיל! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור בתעודה סגור מחוץ לריגיש יד ושזוח ראייתם של ילדים ו/או חיותקטוע על ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ליל הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- תנאי אחסון:** אחסן במקום יבש, מתחת ל־25°C.
- אין להשליך תרופות לזבל או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח אף להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אחר יטיעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעיל התרופה מכילה גם:
Polymerized vinyl acetate, cellulose microcrystalline, hypromellose 2910, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, macrogrol 6000, carnauba wax.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
פלייה רגילה בעלל לבן עם קו חצייה בשני הצדדים. גודלי אריזות מאושרים: 10, 28, 30 או 100 קפלייות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

מספר באפרייל 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
עקר רישום התרופה **בפנסק התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 20-29498-112

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלו זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום: דקסקל בע"מ

רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל