

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## דקפפטיל דפו 11.25 מ"ג אבקה וממס להכנת תרחיף להזרקה תוך שרירית

**הרכב:**

כל בקבוקון של דקפפטיל דפו 11.25 מ"ג מכיל 11.25 מ"ג טריפטורלין (כ-אמבונאט).
11.25 mg triptorelin (as embonate)

**חומרים בלתי פעילים ואלרגניים:** ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
התרופה מיועדת לשימוש במבוגרים בלבד.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת

- לטיפול בסרטן ערמונית מתקדם, תלוי הורמונים
- להורדת רמת הורמוני המין

**קבוצה תרפיטית:** אנלוג ארוך טווח להורמון המשחרר גונדוטורפינים (GnRH - Gonadotropin releasing hormone)

### 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה רגיש (אלרגי) לטריפטורלין אמבונאט, הורמון המשחרר גונדוטורפינים (GnRH), אנלוגים אחרים של ההורמון המשחרר גונדוטורפין (GnRH ידוע גם בשם LHRH), או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף 6).

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

***לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:***

- אתה סובל ממצב רוח דיכאוני. היו דיווחים על דיכאון שעלול להיות חמור בקרב מטופלים הנוטלים דקפפטיל דפו.
- אתה משתמש בתרופות למניעת קרישת דם, שכן עלולה להופיע חבורה באזור הזריקה.
- אתה צורך כמויות גבוהות של אלקוהול, מעשן, סובל מאוסטאופורוזיס או יש לך היסטוריה משפחתית של אוסטאופורוזיס (מחלה הפוגעת בחוזק העצמות), תזונה לקויה, נטילה ממושכת של תרופות המפחיתות את צפיפות העצם (לדוגמה תרופות נגד פרקוסים, סטרואידים). טיפול ממושך עם דקפפטיל דפו עלול להוביל להיחלשות העצם במיוחד אם אחד מהתנאים מעלה מתקיים.
- אתה לוקה במחלות לב או כלי דם כלשהן, לרבות הפרעות בקצב הלב (אריתמיה) או מטופל בתרופות למחלות אלו. הסיכון להפרעות בקצב הלב עלול לעלות בעת שימוש בדקפפטיל דפו.
- יש לך סוכרת או בעיית לב או כלי דם.
- עברת סירוס ניתוחי, triptorelin לא יגרום לירידה נוספת ברמות טסטוסטרון, ולכן אין להשתמש בו.

***במהלך הטיפול בתרופה***

- תגובות אלרגיות: במקרים נדירים זמן קצר לאחר ההזרקה נצפו תגובות אלרגיות חמורות (ראה פרק "תופעות לוואי"). במקרים כאלה, יש לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי.
- במקרים נדירים של נימול ומיגרנה קשה יש להפסיק את הטיפול אם מקרים אלו נשנים אם חומרים.
- בתחילת הטיפול תחול עלייה בכמות הטסטוסטרון בגופך. הדבר עלול לגרום להחמרת תסמיני הסרטן. פנה לרופא שלך אם זה קורה. ייתכן כי הרופא ייתן לך תרופה (אנטי אנדרוגן) על מנת למנוע את החמרת התסמינים.
- במהלך השבועות הראשונים לטיפול, דקפפטיל דפו עלולה, בדומה לאנלוגים אחרים של GnRH, לגרום לתסמינים כתוצאה מלחץ בחוט השדרה (לדוגמה כאב, תחושת הירדמות או חולשה ברגליים) או מחסימת השופכה (צינור יציאת השתן מהגוף). אם אתה חש באחד מהתסמינים פנה לרופא מייד, הרופא יבדוק את מצבך ויטפל בהתאם.
- בדיקות של תפקוד בלוטת יותרת המוח או איברי מין, שנערכות במהלך הטיפול או לאחר הפסקת הטיפול עם דקפפטיל דפו עלולות להיות מטעות.
- אם יש לך הגדלה (גידול שפיר) של בלוטת יותרת המוח שלא היית מודע לה, היא יכולה להתגלות במהלך הטיפול עם דקפפטיל דפו. התסמינים כוללים כאבי ראש פתאומיים, הקאות, בעיות ראייה ושיתוק של שרירי העיניים. במקרים כאלה, יש לפנות מייד לקבלת טיפול רפואי.

**ילדים ומתבגרים:**

דקפפטיל דפו 11.25 מ"ג אינו מיועד לשימוש בילודים, ילדים ומתבגרים.

### בדיקות ומעקב

ייתכן שהרופא יורה לך לבצע בדיקות דם במהלך הטיפול, על מנת לעקוב אחר יעילות התרופה.

### אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**
במיוחד אם אתה לוקח:

- דקפפטיל דפו עלול להפריע לפעילותן של תרופות המשמשות לטיפול בהפרעות קצב הלב כגון כינידין (quinidine), פרוקאינאמיד (procainamide), אמידורון (amiodarone) וסוטלול (sotalol) או עלול לגרום לעלייה בסיכון להפרעות קצב במתן משולב עם תרופות אחרות (לדוגמה מתאדון (methadone) המשמש כמשכך כאבים וטיפול בהתמכרויות, מוקסיפלוקסצין (moxifloxacin) (אנטיביוטיקה), תרופות אנטיפסיוטיות לטיפול בבעיות נפשיות חמורות).

**היריון והנקה:**

דקפפטיל דפו 11.25 מ"ג אינו מיועד לשימוש בנשים.

### נהיגה ושימוש במכונות:

דקפפטיל דפו 11.25 מ"ג עלול לשנות את התגובות שלך במידה כזו שהיכולת לנהוג ולהפעיל מכונות תפגע. זה נכון במיוחד בשילוב עם אלקוהול. אתה עלול להרגיש מסוחרר, עייף או לחוות בעיות כמו טשטוש ראייה. תופעות אלו עלולות להיות תופעות לוואי אפשריות של הטיפול או כתוצאה מהמחלה עצמה. אם אתה חש בתופעות אלו אין לנהוג או להשתמש במכונות.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

דקפפטיל דפו 11.25 מ"ג מכיל פחות מ 1 mmol (23 mg) נתרן לבקבוקון. התרופה כמעט נטולת נתרן ולכן ניתן ליטול אותה במקרה של דיאטה דלת נתרן.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמידי בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא זריקה אחת כל שלושה חודשים.

הרופא או האחיות יזריקו את התרופה במתן תוך שרירי.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

**אם הזרקת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת לקבל זריקה** בזמן הדרוש (כל שלושה חודשים), התייעץ עם הרופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדקפפטיל דפו 11.25 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מייד לרופא אם אתה סובל מקשיי בליעה או נשימה, נפיחות בשפתיים, פנים, בלוע או בלשון, פריחה. אלו יכולים להיות תסמינים של תגובה אלרגית או אנגיודדמה (בצקת) שדווחה במקרים נדירים (עלול להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 איש).

**תופעות לוואי נוספות:**

כמו בטיפולים אחרים בתרופות מקבוצת GnRH agonists או לאחר סירוס ניתוחי, תופעות לוואי הכי נפוצות עלב הטיפול ב triptorelin הן כתוצאה פעילות רמקולוגית צפויה שלו. תופעות אלו כוללות גלי חום וירידה בחשק המיני.

עלייה בספירת הלימפוציטים (תאי דם לבנים) דווחה בקרב חולים שטופלו באנלוג של GnRH.

למעט תגובות אימונו-אלרגיות ותגובות באתר ההזרקה, כל תופעות הלוואי ידועות כקשורות לשינויים ברמת הטסטוסטרון.

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה**

- גלי חום
- חולשה
- הזעת יתר
- כאב גב
- תחושת עקצוץ ברגליים
- ירידה בחשק המיני
- אימפוטנציה

**תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100**

- בחילה, יובש בפה
- כאב, חבורות, אודם ונפיחות באזור ההזרקה, כאב שרירים ועצמות, כאב בידיים ורגליים, בצקת (הצטברות נוזלים ברקמות גוף), כאב בבטן התחתונה
- לחץ דם גבוה
- תגובות אלרגיות
- עלייה במשקל
- סחרחורת, כאב ראש
- אובדן חשק מיני, דיכאון, תודות במצב רוח

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000**

- עלייה בספירת טסיות דם
- דפיקות לב
- צלזולים באוזניים, סחרחורת (vertigo), טשטוש ראייה
- כאב בטן, עצירות, שלשול, הקאות
- טשטוש, רעד חזק המלווה בהזעה וחום, ישנוניות, כאב
- שינוי בבדיקות דם (כולל עלייה באנזימי כבד), עלייה בלחץ דם
- ירידה במשקל
- חוסר תיאבון, עלייה בתיאבון, שיגדון (כאב חזק ונפיחות במפרקים בדרך כלל בבוהן), סוכרת, עודף שומנים בדם

- כאבי מפרקים, התכווצויות שרירים, חולשת שרירים, כאב שרירים, נפיחות ורגישות, כאב עצמות
- תחושת עקצוץ או נימול
- חוסר יכולת לישון, עצבנות
- הגדלת שדיים בגברים, כאב בשדיים, הקטנת אשכים, כאב באשכים
- קשיי נשימה
- אקנה, נשירת שיער, גרד, פריחה, אדמומיות של העור, סרפדת
- השתנה לילית, הפרעות במתן שתן
- דימום מהאף

**תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000**

- כתמים אדומים או סגולים על העור
- תחושה לא תקינה בעין, הפרעות או טשטוש ראייה
- תחושת מלאות בבטן, גזים, הפרעות בחוש טעם
- כאב בחזה

