

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

ويلبوترين XR 150 ملغ أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:
بوپروپیون هیدروکلورید (bupropion hydrochloride) 150 ملغ

ويلبوترين XR 300 ملغ أقراص ذات تحرير مطول

يحتوي كل قرص على:
بوپروپیون هیدروکلورید (bupropion hydrochloride) 300 ملغ

لائحة المواد غير الفعالة في المستحضر انظر الفقرة 6 – "معلومات إضافية".
إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك
أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

ويلبوترين XR هو دواء مخصص لعلاج الإكتئاب. يتفاعل مع مركبات كيميائية في الدماغ تسمى نورأدريناлиين ودوپامين.
الفصيلة العلاجية:
مثبط إنقائي لإعادة إستيعاب نورأدريناлиين ودوپامين.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الأليرجي) لبوپروپیون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
 - كنت تتناول أدوية أخرى أيًّا كانت تحتوي على بوپروپیون
 - تم تشخيصك على أنه تعاني من الصرع أو لديك سابقة لاختلالات
 - يوجد لديك أو كان لديك اضطراب في الأكل (مثلاً، الشره (bulimia) أو القهم العصبي ((anorexia nervosa))
 - كان لديك ورم في الدماغ
 - كنت تشرب عادة المشروبات الروحية بشكل مفرط وقد توقفت للتو أو أنه على وشك التوقف عن شربها
 - كانت لديك مشاكل كبدية خطيرة
 - كنت قد توقفت مؤخراً عن تناول أدوية مهدئة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها في الوقت الذي تتناول
- ويلبوترين XR
- كنت تتناول أو قد تناولت أدوية أخرى للإكتئاب أو لداء الپارکينسون تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث فوراً مع الطبيب، بدون تناول ويلبوترين XR.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال ويلبوترين XR.

الأطفال والمرأهقون

ويلبوترين XR غير مخصص للعلاج لدى أطفال دون عمر 18 سنة.
هناك خطورة زائدة لسلوكيات وأفكار إنتحارية عندما يُعالج الأطفال دون عمر 18 سنة بمضادات الإكتئاب.

الكبار

يجب أن يعرف الطبيب قبل أن تتناول ويلبوترين XR إذا:
• كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم

- كان لديك سكري الذي لأجله تستعمل إنسولين أو أقراص تبيّن أن ويلبوترین XR يسبب نوبات (إختلالات) لدى ما يقارب 1 من بين 1,000 شخص. يرجح أكثر أن يحدث هذا العرض الجانبي لدى أشخاص من المجموعات المذكورة أعلاه. إذا كان لديك نوبة خلال العلاج فعليك التوقف عن تناول ويلبوترین XR. لا تتناول المزيد وتوجه إلى الطبيب.
- كنت تعاني من اضطراب ثانٍ القطب (تغيرات قصوى في المزاج)، لأن ويلبوترین XR قد يؤدي إلى عوارض لهذا المرض إذا كنت تتناول أدوية أخرى للاكتتاب، فإن إستعمال هذه الأدوية سوية مع ويلبوترین XR يمكن أن يؤدي لمتلازمة السيروتونين، حالة بإمكانها أن تشكل خطراً على الحياة (أنظر "تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية" في هذه الفقرة).
- كانت لديك مشاكل في الكبد أو في الكلى، قد يكون لديك احتمال أكبر للمعاناة من أمراض جانبية. إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث ثانية مع الطبيب قبل تناول ويلبوترین XR. قد يرغب بأن يكرس اهتماماً خاصاً لعلاجك، أو أن يوصي بعلاج آخر.

أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتتاب لديك

- إذا كنت مكتئباً، قد تراودك أحياناً أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو الإنتحار. قد تزداد هذه مع تناول مضادات الإكتتاب لأول مرة، حيث أن كافة هذه الأدوية تستغرق وقتاً كي تبدأ بالتأثير، على الأغلب نحو أسبوعين بل أكثر من ذلك في بعض الأحيان. من الجائز وأن يكون الاحتمال أكبر بأن تفكّر على هذا النحو إذا:
- كانت لديك في الماضي أفكار إنتحارية أو لإلحاق الأذى بنفسك.
 - كنت شاباً يافعاً. أظهرت المعلومات من التجارب السريرية وجود خطورة زائدة لسلوك إنتحاري لدى كبار دون عمر 25 سنة الذين يعانون من حالات نفسية والذين عولجوا بمضاد للاكتتاب.
- إذا كانت لديك أفكار لإلحاق الأذى بنفسك أو الإنتحار في أي وقت كان، اتصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى فوراً. قد تجد أنه من المفيد أن تحكي لأحد أقربائك أو صديق قريب بأنك تعاني من الإكتتاب، وأن تطلب منهم قراءة هذه النشرة. يمكنك أن تطلب منهم أن يبلغوك إذا كانوا يعتقدون أن الإكتتاب لديك يتفاقم، أو إذا كانوا قلقين بخصوص تغيرات في سلوكك.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو تناولت أدوية أخرى للاكتتاب أو لمرض باركينسون التي تسمى مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOIs) خلال الـ 14 يوماً الأخيرة، إحك للطبيب بدون تناول ويلبوترین XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2).
- إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. من الجائز أن يغير جرعة الدواء ويلبوترین XR، أو يقترح تغيير بأدوينتك الأخرى.
- لا تندمج أدوية معينة مع ويلبوترین XR. قد يزيد بعضها من احتمال حدوث نوبات أو إختلالات. قد تزيد أدوية أخرى من خطورة حدوث أمراض جانبية أخرى. فيما يلي تفصيل لبعض الأمثلة، لكن هذه ليست قائمة كاملة.

قد يكون هناك احتمال أكبر من المعتاد لحدوث إختلالات إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى للاكتتاب أو لأمراض نفسية أخرى
- كنت تتناول تينوفيلين للربو أو لمرض رئوي
- كنت تتناول ترامادول، مسكن قوي للألم
- تناولت أدوية مهدئة، أو إذا كنت على وشك التوقف عن تناولها بينما ما زلت تتناول ويلبوترین XR (أنظر أيضاً "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" في الفقرة 2)
- كنت تتناول أدوية ضد الملاريا (مثل ميفلووكوين أو كلورووكوين)
- كنت تتناول منشطات أو أدوية أخرى للسيطرة على الوزن أو الشهية للطعام لديك
- كنت تتناول ستيرونيدات (عن طريق الفم أو بالحقن)
- كنت تتناول مضادات حيوية تسمى كوينولونات
- كنت تتناول أنواع معينة من مضادات الهيستامين التي قد تسبب الميل إلى النوم
- كنت تتناول أدوية للاسكري.

إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فوراً، قبل تناول ويلبوترین XR. يدرس الطبيب الفوائد والمخاطر من أجلك عند تناول ويلبوترین XR.

قد يكون هناك إحتمال أكبر من المعتاد لحدوث أعراض جانبية أخرى إذا:

- كنت تتناول أدوية أخرى للإكتئاب (مثل أميتربيتيلين، فلوكوكسيتين، باروكسيتين، سيتالوپرام، إسيتالوپرام، فينلافاكسين، دوسولبيتين، ديسيرامين أو إيميرامين) أو لأمراض نفسية أخرى (مثل كلوزاپين، ريسپيريدون، تيوريدازين أو أو لانزابين).
 - من شأن ويلبوترين XR أن يتفاعل مع أدوية معينة تستعمل لعلاج الإكتئاب وقد تقاسى من تغيرات في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، ارتفاع نظم القلب، عدم إستقرار ضغط الدم ومنعكشات مفرطة، تصلب العضلات، فلة التنفس وأعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال).
 - كنت تتناول أدوية لداء الباركينسون (ليقودويا، أمانتادين أو أورفينادين)
 - كنت تتناول أدوية تؤثر على قرحة جسمك على تفكك ويلبوترين XR (كاربامازيبين، فينيتوين، فالپروات)
 - كنت تتناول أدوية معينة تستعمل لعلاج السرطان (مثل سيكلووفسفاميد، إيفوفساميد)
 - كنت تتناول كلوبيديوچريل الذي يستعمل بشكل خاص لمنع حدوث سكتة
 - كنت تتناول حاجبات بيتا معينة (مثل ميتورولول)
 - كنت تتناول أدوية معينة لعدم إنظام نظم القلب (بروپافينون أو فليكاينيد)
 - كنت تستعمل لصقات نيكوتين لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.
- إذا إنطبقت عليك إحدى هذه الحالات، تحدث مع الطبيب فوراً، قبل تناول ويلبوترين XR.

قد يكون ويلبوترين XR أقل نجاعة

- إذا كنت تتناول ريتونافير أو إيفاڤيرينز، أدوية لعلاج تلوث HIV.
- إذا إنطبق هذا عليك، إحك للطبيب. سوف يفحص الطبيب مدى نجاعة ويلبوترين XR بالنسبة لك. قد يكون من الضروري رفع جرعتك الدوائية أو تغيير علاج الإكتئاب لديك إلى علاج آخر. لا ترفع جرعة ويلبوترين XR خاستك بدون إستشارة الطبيب، حيث أن هذا الأمر قد يزيد من خطورة حصول أعراض جانبية لديك، يشمل إختلالات.

قد يقل ويلبوترين XR من نجاعة أدوية أخرى

- إذا كنت تتناول تاموكسيفن الذي يستعمل لعلاج سرطان الثدي.
- إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد تكون هناك حاجة لتغيير العلاج بعلاج آخر للإكتئاب لديك.
- إذا كنت تتناول ديجوكسين لقبك.
- إذا إنطبق هذا عليك، تحدث مع الطبيب. قد يدرس الطبيب ملامعة المقدار الدوائي لدیجوكسین.

استخدام الدواء واستهلاك الكحول

يمكن للكحول أن يؤثر على طريقة عمل ويلبوترين XR وعندما يؤخذان سوية، يمكنهما في حالات نادرة، أن يؤثرا على أعصابك أو على حالتك النفسية. بعض الأشخاص يجدون أنهم أكثر حساسية للكحول عندما يتناولون ويلبوترين XR. قد يوصيتك الطبيب بعدم شرب الكحول (بيرة، نبيذ أو مشروبات روحية) عندما تتناول ويلبوترين XR، أو أن تحاول أن تقلل جداً من الشرب. لكن إذا كنت تشرب الكثير حالياً، فلا تتوقف بشكل مفاجئ. قد يجعلك هذا معرضاً لخطرة حدوث إختلالات.

تحدث مع الطبيب بخصوص شرب الكحول قبل أن تبدأ بتناول ويلبوترين XR.

التأثير على فحوص البول

قد يشوش ويلبوترين XR على فحوص بول معينة لتشخيص أدوية أخرى. إذا توجب عليك الخضوع لفحص بول، إحك الطبيب أو المستشفى بأنك تتناول ويلبوترين XR.

الحمل والإرضاع

لا تتناول ويلبوترين XR إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إلا إذا أوصى الطبيب بذلك. إستشيري الصيدلي أو الطبيب قبل تناول هذا الدواء. بعض الأبحاث، لكن ليس جميعها، أشارت إلى ارتفاع خطورة حدوث تشوّهات خلقية، خاصة تشوّهات قلبية، لدى رُضع تناولت أمّهاتهم ويلبوترين XR. من غير المعروف فيما إذا كان ذلك في أعقاب إستعمال ويلبوترين XR.

يمكن لمركبات ويلبوترين XR أن تنتقل إلى حليب الأم. إستشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ويلبوترين XR.

السياقة وإستعمال الماكولات

إذا كان ويلبوترين XR يسبب لك الدوار أو الشعور بأنك توشك على الإغماء، لا تقد أو تشغل أية أدوات أو ماكولات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

قد يستغرق فترة من الزمن حتى تبدأ الشعور بالتحسن. يستغرق فترة من الزمن حتى يتم الحصول على تأثير كامل للدواء، في بعض الأحيان أسابيع أو أشهر. عندما يبدأ شعورك بالتحسن، قد يوصيك الطبيب بالإستمرار بتناول ويلبوترین XR لمنع عودة الإكتئاب.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية للكبار فقط هي قرص واحد من عيار 150 ملغ مرة في اليوم.

قد يزيد الطبيب جرعتك الدوائية إلى 300 ملغ مرة في اليوم إذا لم يتحسن الإكتئاب لديك بعد عدة أسابيع.

خذ جرعة أقراص ويلبوترین XR خاصة في الصباح. لا يجوز تناول ويلبوترین XR أكثر من مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

القرص مطلي بقشرة التي تحرر الدواء ببطء داخل جسمك. قد تلاحظ شيئاً في البراز لديك يبدو مثل قرص. إنها القشرة الفارغة التي تخرج من جسمك.

ابلع الأقراص **بشكلها الكامل**. لا يجوز مضغها، سحقها أو شطرها – إذا قمت بذلك، هناك خطورة بأن تأخذ مقدار دوائي مفرط، حيث أن الدواء سيتحرر إلى داخل جسمك بشكل أسرع. سوف يزيد ذلك من إمكانية حدوث أعراض جانبية لديك، يشمل نوبات (إختلالات).

بعض الأشخاص يستمرون بتناول قرص واحد من عيار 150 ملغ في كل يوم خلال كامل فترة علاجهم. قد يصف لك الطبيب ذلك إذا كانت لديك مشاكل كبدية أو كلوية.

كم من الوقت عليك أن تتناول الدواء

فقط أنت والطبيب يمكنكم أن تقررا كم من الوقت عليك تناول ويلبوترین XR. قد يستغرق أسبوع أو أشهر من العلاج حتى تلاحظ تحسن أيًا كان. تحدث عن أعراضك مع الطبيب بشكل دائم ليتم التقرير كم من الوقت عليك تناوله. عندما تبدأ بالشعور بتحسن، قد يوصيك الطبيب بالإستمرار بتناول ويلبوترین XR لمنع عودة الإكتئاب.

القنية مغلقة بخطاء صعب للفتح من قبل الأطفال

تعليمات الفتح: لإزالة الغطاء، يجب الضغط للأسفل وفي نفس الوقت التدوير لليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة).

تعليمات الإغلاق: يجب وضع الغطاء على الطرف المفتوح للقنية والتدوير بإتجاه اليمين (في إتجاه عقارب الساعة) حتى يغلق تماماً.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا كنت تتناول أقراصاً أكثر من اللازم، قد تزيد من خطورة حدوث نوبات أو إختلالات.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة.

تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد وإستشر الطبيب.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول ويلبوترین XR أو تقليل الجرعة الدوائية بدون إستشارة الطبيب قبل التوقف، حتى ولو طرأ تحسن على صحتك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من **الجرعة الدوائية في كل مرة** تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال ويلبوترين XR قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

أعراض جانبية خطيرة نوبات أو اختلالات

نحو 1 من كل 1,000 شخص الذين يتناولون ويلبوترين XR معرض لخطورة حدوث نوبة (اختلاج أو تشنج). يزيد إحتمال حدوث ذلك إذا كنت تتناول ويلبوترين XR أكثر من اللازم، إذا كنت تتناول أدوية معينة، أو إذا كنت معرضاً لخطورة أعلى من المعتاد لحدث نوبات. إذا كنت قلًّا، تحدث مع الطبيب.
إذا كانت لديك نوبة، إحك للطبيب بعد أن تتعافي. لا تتناول أقراصاً إضافية.

ردود فعل تحسسية

قد يصاب بعض الأشخاص بردود فعل تحسسية تجاه ويلبوترين XR. تشمل هذه:

- جلد أحمر أو طفح (يشبه الشرى)، حويصلات أو درنات حاكمة (شرى) على الجلد. إن بعض أنواع الطفح الجلدي هذه قد توجب علاجاً في المستشفى، خاصة إذا كنت تعاني أيضاً من آلام في الفم أو في العينين.
- صفير غير اعتيادي أو صعوبات في التنفس
- إنفاس في الجفونين، الشفتين أو اللسان
- آلام في العضلات أو المفاصل
- إنهايار أو فقدان الوعي.

إذا كانت لديك أية علامات لرد فعل تحسسي اتصل بالطبيب حالاً. لا تتناول أقراصاً إضافية.

قد تستمر ردود الفعل التحسسية لفترة طويلة. إذا وصف لك الطبيب شيئاً ليساعدك بخصوص أعراض الحساسية، تأكد من إنهائك للعلاج.

طفح جلدي لـ لوبيوس (ذئبة) أو تفاقم أعراض الـ لوبيوس

شيوخ غير معروف – لا يمكن تقييم الشيوخ من المعلومات المتوفرة لدى أشخاص يتناولون ويلبوترين XR.

يعتبر الـ لوبيوس إضطراب في الجهاز المناعي الذي يؤثر على الجلد وأعضاء أخرى.

← إذا قاسيت من احتدامات لـ لوبيوس، طفح جلدي أو آفات (خاصة في المناطق المعرضة للشمس) خلال تناول ويلبوترين XR، اتصل بالطبيب فوراً، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى التوقف عن العلاج.

بثار طفحي معتم حاد (Acute Generalised Exanthematous Pustulosis -AGEP)

شيوخ غير معروف - لا يمكن تقييم الشيوخ من المعلومات المتوفرة لدى الأشخاص الذين يتناولون ويلبوترين XR.

تشمل أعراض AGEP طفح مع بثور مليئة بالقبح/حويصلات.

← إذا كان لديك طفح مع بثور مليئة بالقبح/حويصلات، اتصل بالطبيب على الفور، لأنه قد تكون هناك حاجة للتوقف عن العلاج.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- صعوبات في النوم. تأكيد من تناولك ويلبوترين XR في الصباح
- صداع
- جفاف في الفم
- شعور بغثيان، تقيؤ.

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- سخونة، دوار، حكة، تعرق وطفح جلدي (في بعض الأحيان بسبب رد فعل تحسسي)
- رجحان، ضعف، إرهاق، آلام في الصدر
- شعور بالقلق أو العصبية

- ألم أو إضطرابات أخرى في البطن (إمساك)، تغيرات في مذاق الطعام، فقدان الشهية للطعام (anorexia)
- إرتفاع ضغط الدم يكون خطيراً أحياناً، تورّد
- طنين في الأذنين، إضطرابات في الرؤية.

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- شعور بالإكتئاب (أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء"، تحت "أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب لديك")
- شعور بارتباك
- صعوبة في التركيز
- نظم قلب متسرع
- إنخفاض في الوزن.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- اختلالات.

أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:

- خفقان القلب، إغماء
- تشنجات، تصلب العضلات، حركات خارجة عن السيطرة، مشاكل في المشي أو في التناول
- شعور بقلة الراحة، عدم الهدوء، عدائية، عدوانية، أحلام غريبة، شعور بالوخز أو قلة الإحساس، فقدان الذاكرة
- إصفرار الجلد أو بياض عينيك (يرقان) الذي قد يحدث بسبب إرتفاع إنزيمات الكبد، إلتهاب الكبد (hepatitis)
- ردود فعل تحسسية شديدة؛ طفح سوية مع آلام في المفاصل والعضلات
- تغيرات في نسب السكر في الدم
- تبول زائد أو أقل من المعتاد
- عدم السيطرة على التبول (تبول لا إرادي، تسرُّب بول)
- طفح شديد في الجلد قد يظهر في الفم وفي أجزاء أخرى من الجسم وقد يشكل خطراً على الحياة
- تفاقم الصدفية (بقع ثخينة من جد أحمر)
- شعور بالإنفصال عن الواقع أو شعور غريب (تبدل الشخصية)؛ رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة)؛ الشعور أو الإعتقد بأشياء غير صحيحة (أوهام)؛ الشك بشكل شديد (ذهان خيلي).

أعراض جانبية شيوها غير معروفة

ظهرت أعراض جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص لكن شيوها الدقيق غير معروف:

- أفكار عن إلحاق الأذى بالنفس أو أفكار إنتحارية خلال تناول ويلبويترین XR أو مباشرة بعد التوقف عن العلاج (أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء"). إذا كان لديك مثل هذه الأفكار، إنصل بالطبيب أو توجه إلى المستشفى بشكل فوري.
- فقدان العلاقة بالواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم على الأمور بذهن صافي (ذهان)، أعراض أخرى يمكن أن تشمل هلوسة و/أو أوهام.
- تآتأة.
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leucopenia) وإنخفاض في عدد الصفيحات الدموية (thrombocytopenia).
- إنخفاض بنسبة الصوديوم في الدم (hyponatremia).
- تغيير في الحالة النفسية (مثلاً، عدم هدوء، هلوسة، غيبوبة)، وتأثيرات أخرى مثل حرارة الجسم فوق 38 درجة مئوية، إرتفاع نظم القلب، عدم استقرار ضغط الدم ومنعكشات مفرطة، تصلب العضلات، قلة التنسيق و/أو أعراض الجهاز الهضمي (مثلاً غثيان، تقيؤ، إسهال)، أثناء تناول ويلبويترین XR سوية مع أدوية لعلاج الإكتئاب (مثلاً پاروكسيتين، سيتالوپرام، إسيتالوپرام، فلوكوكسيتين وفينلافاكسين).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجاًل رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة والضوء.
- للإستعمال خلال 30 يوماً من الفتح.
- تحتوي القنينة على وعاء صغير محكم الإغلاق يحتوي على فم وجل سيليكا للحفاظ على الأقراص جافة. إنترك الوعاء في القنينة. لا تبلعه.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تد ضمن الاستعمال. إن ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:
يحتوي القرص على:

Polyvinyl alcohol, glyceryl dibehenate.

يحتوي طلاء القرص على:

Ethylcellulose, povidone K-90, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer dispersion (Eudragit L30 D-55), macrogol 1450, silicon dioxide, triethyl citrate.

جير للطباعة:

Shellac glaze, iron oxide black (E172), ammonium hydroxide.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أقراص ويلبوري XR 150 ملغ هي أقراص مدورة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS5FV" بجير أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقاني بولي إيتيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلقة بقطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.
أقراص ويلبوري XR 300 ملغ هي أقراص مدورة بلون أبيض كريم حتى أصفر شاحب مع طباعة "GS5YZ" بجير أسود على جانب واحد وملساء من الجانب الثاني. تتوفر بقاني بولي إيتيلين بيضاء التي تحتوي على 7، 30 أو 90 (3X30) قرصاً. القنينة مغلقة بقطاء صعب للفتح من قبل الأطفال.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: چلاكسوسميكلайн (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: بوش هيلث كومپانيس INC، مانيتوبا، كندا.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
ويلبوري XR 150 ملغ: 140-05-31653
ويلبوري XR 300 ملغ: 140-06-31654
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في أيار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
© 2022 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.