

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

پریکات

مَحلول للحقن داخل العُصل

التركيب:

كل أمبولة تحتوي على 1 ملل.

كل 1 ملل يحتوي على:

هالوپریدول 100 ملغ (يُعادل 141.04 ملغ هالوپریدول دیکانوات)
Haloperidol 100 mg (equivalent to 141.04 mg haloperidol decanoate)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

الدواء غير مخصص للأطفال.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

علاج داعم لمرضى الفصام.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الذهان من عائلة البوتيروفينونات.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات لإضافية التي يحتويها الدواء - أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".
- كنت أقل إدراكاً للأمور من حولك أو أنّ ردود فعلك أصبحت بطيئة بشكل غير اعتيادي.
- كنت تعاني من مرض پاركينسون.
- إذا وُجد لديك الخرف من نوع الخرف المصحوب بأجسام ليوي ("Lewy body dementia").
- وُجد لديك مرض عصبي ضموري في المخ (شلل فوق النوى المتقدم) - (Progressive Supranuclear Palsy).
- وُجد لديك اضطراب في القلب يُسمى متلازمة مقطع QT المطول، أو كل مشكلة أخرى في نظم القلب التي تمثل إكتشافاً شاذاً في تخطيط القلب الكهربائي (ECG).
- وُجد لديك قصور في القلب أو أصبت مؤخراً بنوبة قلبية.
- كنت تعاني، أو عانيت في الماضي، من إضطرابات في نظم القلب أو نظم قلب بطيء بشكل خاص.
- كنت تتناول أدوية معينة ذات تأثير على نظم القلب.
- وُجد لديك إنخفاض في نسبة البوتاسيوم في الدم، لم يتم علاجه.
- كنت تعاني من مرض ذي تأثير على القسم في الدماغ المسمى بالعدق القاعدية (basal ganglia).
- كنت تتناول إحدى الأدوية التي تظهر في قائمة الأدوية التي يُمنع تناولها سوية مع **پریکات** (أنظر "التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية").
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كان أياً مما ذكر أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن واثقاً، استشر الطبيب قبل تناول المستحضر.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

أعراض جانبية خطيرة

پریکات قد يؤدي لمشاكل في القلب، لمشاكل في السيطرة على حركات الجسم أو الأظراف ولعُرض جانبي خطير يُسمى "المتلازمة العصبية الجينية". قد يؤدي أيضاً لردود فعل تحسسية خطيرة ولخثرات دموية. عليك أن تكون مدركاً للأعراض الجانبية الخطيرة أثناء تناولك **پریکات** لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل. أنظر "أعراض جانبية خطيرة" في الفقرة 4.

الأشخاص المسنون والأشخاص الذين يعانون من الخرف

تم التليخ عن إرتفاع بسيط في حالات الوفاة والسكتة لدى أشخاص مُسنين يعانون من الخرف الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان.

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج: إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- خثرات دموية أو أنّ أحد أفراد عائلتك يعاني أو عانى من هذه المشكلة.
- إن ظهور أعراض دموية في القدمين أو في الرئتين قد حصل لدى مرضى مُتعالجين بمستحضرات لعلاج مرض الفصام.
- مشاكل في القلب، نظم نبضات القلب بطيئة، تناول أدوية لعلاج مرض القلب، أو إذا كان هنالك سابقة عائلية لمشاكل في القلب، أحد أفراد عائلتك القريبة توفي بشكل فجائي من مشاكل في القلب.

إكتئاب غير مُعالج.

ضغط دم منخفض، أو إذا كنت تشعر بالدوار أثناء الإنتقال لوضعية الجلوس أو الوقوف.

- نسبة منخفضة من البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو شاردة كهربائية أخرى) في الدم. طبيبك يقرر كيفية علاج الأمر.
- مشاكل في الكلى، في الكبد أو في الغدة الدرقية.
- الصرع أو إذا عانيت ذات مرة من الإختلاجات (التشنجات).
- نزف في الدماغ، أو إذا أخبرك الطبيب أن لديك إحتمال أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية أكثر من أشخاص آخرين.
- مشاكل أكل متواصل.

- ورم غير سرطاني في الغدة الكظرية - pheochromocytoma.
- نسبة مرتفعة من هورمون الهرولاكتين في الدم، أو من سرطان الذي قد يسببه إرتفاع في مستوى الهرولاكتين (مثل سرطان الثدي).
- من الممكن أن تحتاج إلى متابعة حثيئة أكثر، ومن الممكن أن تكون هنالك حاجة لتغيير المقدار الدوائي الذي تتناوله من **پریکات**.
- إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت واحدة من الحالات المفضلة أعلاه تنطبق عليك، استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناولك **پریکات**.

الفحوص والمتابعة

من الممكن أن يرغب طبيبك بتوجيهك لإجراء فحص تخطيط القلب الكهربائي (ECG) قبل العلاج بـ **پریکات** أو في أثناءه.
إنّ فحص الـ (ECG) يعمل على قياس النشاط الكهربائي لقلبك.

فحوص الدم

من الممكن أن يرغب طبيبك بفحص نسب البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو شاردة كهربائية أخرى) في دمك، قبل العلاج بـ **پریکات** أو في أثناءه.

الأطفال والمراهقون

لا يجوز إستعمال **پریکات** لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة. وذلك لأن الدواء لم تتم دراسته في هذه الفئة العمرية.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

لا يجوز تناول **پریکات** إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج:

- مشاكل في نظم القلب لديك (مثل أمبودارون، دوفيتليد، ديزوبيراميد، دروندارون، إيبوتيليد، كينيدين، وسوتالول).
- الإكتئاب (مثل سيتالوپرام، أو إيسيتالوپرام).
- الذهان (مثل فلوفينازين، ليفوميبرومازين، بيرفينازين، بيموزيد، بروكلوپيرازين، برومازين، سيرتيندول، تيوردازين، تريفلوپيرازين، تريفلوپرومازين، وزيبراسيدون).
- تلوثات بكتيرية (مثل آزيتروميسين، كلاريثروميسين، إريثرومايسين، ليفولوكساسين، موكسيفلوكساسين، وتيليثروميسين).
- تلوثات فطرية (مثل بينتاميدين).
- مرض الملاريا (مثل هالوفانترين).
- الغثيان والتقيؤات (مثل دولاسترون).
- السرطان (مثل تورميفين وقاندانتيناب).

بالإضافة لذلك، بلغ الطبيب إذا كنت تتناول بيبريدول (لعلاج ألم الصدر أو لخفض ضغط الدم) أو ميتادون (لنسكين الآلام أو لعلاج إدمان المخدرات). هذه الأدوية قد تزيد من خطورة حدوث مشاكل في القلب، لذلك عليك إستشارة الطبيب إذا كنت تتناول إحدى تلك الأدوية، ولا يجوز تناول **پریکات** (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إذا").

مَن الجائر أن تحتاج لمتابعة خاصة إذا كنت تتناول ليثيوم وپریکات** في ذات الوقت.**

أُخبر الطبيب فوراً وتوقف عن تناول كلا الدوائين إذا:

- وجدت لديك سخونة مجهولة السبب أو حركات لا يمكنك السيطرة عليها.
- كنت تشعر بإرتباك، توهان (disorientation)، صداع، مشاكل بالتوازن وشعور بالنعاس. هذه علامات على وجود حالة خطيرة.
- بعض الأدوية قد تؤثر على طريقة عمل **پریکات** أو تزيد من خطورة حدوث مشاكل في القلب.**
بلغ الطبيب إذا كنت تتناول:
 - الپرازولام أو بوسپيرون (لعلاج القلق).
 - دولوكسيتين، فلوأو كسيتين، فلووكسامين، نيفازودون، پاروكسيتين، سرتالين، St. John's wort (مبيبريكوم پرفوراتوم) أو فينلافكاسين (لعلاج الإكتئاب).
 - بوبروبيون (لعلاج الإكتئاب أو للمساعدة على الإقلاع عن التدخين).
 - كارپامازيبين، فينوباريتال، أو فينيتوين (لعلاج مرض الصرع).
 - ريفامپيسين (لعلاج التلوثات البكتيرية).
 - إيتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية).
 - أقراص كيتوكونازول (لعلاج متلازمة كوشينج).
 - إيندينافير، ريتونافير أو ساكوينافير (لعلاج فيروس الفشل المعاعي البشري - HIV).
 - كلورپرومازين أو پروميتازين (لعلاج الغثيان والتقيؤات).
 - ثيراباميل (لعلاج فرط ضغط الدم أو مشاكل القلب).
- بالإضافة لذلك، بلغ الطبيب إذا كنت تتناول أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، مثل الأدوية المدرة للبول.
- من الممكن أن يحتاج الطبيب إلى تغيير المقدار الدوائي الذي تتناوله من **پریکات** إذا كنت تتناول إحدى هذه الأدوية.

پریکات قد يؤثر على طريقة عمل الأدوية من الأنواع التالية.

أُخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية من أجل:

- التهدئة أو المساعدة في إضطرابات النوم (أدوية مهدئة).
- علاج الألم (مسكنات آلام قوية).
- علاج الإكتئاب (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة).
- خفض ضغط الدم (مثل جوانتيديين وميتيل-دوبا).
- علاج ردود الفعل التحسسية الخطيرة (أدرينالين).
- علاج اضطرابات التركيز وفرط النشاط (ADHD) أو النوم الإنتيابي (narcolepsy) (المعروفة بالأدوية المنشطة).
- علاج مرض پاركينسون (مثل ليفودوبا).
- تميع الدم (فينينديون).

استشر الطبيب قبل تناول **پریکات** إذا كنت تتناول إحدى تلك الأدوية.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

شرب الكحول أثناء تناول **پریکات** قد يسبب لك الشعور بالنعاس وأقل يقظة. هذا يعني أنه يجب عليك توخي الحذر بشأن كمية الكحول التي تشربها. إستشر الطبيب بشأن شرب الكحول أثناء تناول **پریکات**، وبلغ الطبيب عن كمية الكحول التي تشربها.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل - إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، تُوْجْهي للطبيب من أجل الإستشارة. قد يشير عليك طبيبك بعدم تناول **پریکات** أثناء الحمل. المشاكل المذكورة أدناه قد تحدث لدى حديثي الولادة لأمهات يتناولن **پریکات** أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (الثالث الأخير):

- إرتجاف العضلات، تصلب أو ضعف بالعضلات
- نعاس أو عدم هدوء
- صعوبات في التنفس أو صعوبة في الإطعام
- من غير المعروف بشكل دقيق نسبة شيوع هذه المشاكل. إذا تناولت **پریکات** أثناء الحمل وطوّرت طفلك إحدى تلك الأعراض الجانبية، تُوْجْهي للطبيب.
- الإرضاع** - إستشيري الطبيب إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. ذلك لأن كميات صغيرة من الدواء قد تنتقل لحليب الأم ومن هناك إلى الرضيع. سيناقش طبيبك معك الأخطار والفوائد من الإرضاع أثناء تناولك **پریکات**.
- الخصوبة** - **پریکات** قد يؤدي لارتفاع في نسب الهورمون المسمى پرولاكتين، والذي قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال والنساء. استشر الطبيب إذا توفرت لديك أسئلة حول هذا الموضوع.

السياقة وإستعمال الماكنات

پریکات قد يؤثر في قدرتك على السياقة وإستعمال الأدوات والماكنات. أعراض جانبية، مثل شعور بالنعاس، قد تؤثر على يقظتك، خاصة في بداية العلاج أو بعد إعطاء مقداراً دوائياً مرتفعاً. لا يجوز السياقة أو إستعمال أية أدوات أو ماكنات بدون مناقشة ذلك مع الطبيب أولاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

هذا الدواء يحتوي على 15 ملغ كحول بنزيلي في كل 1 ملل من المحلول. الكحول البنزيلي قد يؤدي لردود فعل تحسسية.

إستشر الطبيب أو الصيدلي إذا وُجد لديك مرض في الكبد أو في الكلى، أو إذا كنت حاملاً أو مرضعة. وذلك لأن كميات كبيرة من الكحول البنزيلي من الممكن أن تتراكم في جسدك مما قد يؤدي لأعراض جانبية (تسمى "حمّاض إستقلابي").

هذا الدواء يحتوي أيضاً على زيت السمسم، والذي قد يؤدي في أحيان نادرة لردود فعل تحسسية خطيرة.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
لا يجوز البلع.

سيوفر طبيبك كمية **بريكات** التي قد تحتاج تناولها وما مدة العلاج وسيلتك لك المقدار الدوائي كأمر متعلق بـ:

- عمرك.
- إذا وُجدت لديك مشاكل في الكلى أو الكبد.
- رد فعلك لهالوبريدول في الماضي.
- أدوية أخرى تتناولها.
- **بريكات** يُعطى من قِبَل الطبيب أو الممرضة. هو مخصص للحقن داخل العضل.
- المستحضر مخصص للبالغين وعادة يتم حقنه في منطقة الريف مرة في الشهر. بحسب حالتك الطبية، قد يقرر الطبيب حقن فقط جزء من الأموية في بداية العلاج. ثم بعد ذلك، يمكن للطبيب أن يغير كمية الدواء المحقون أو المدة الزمنية بين الحقنيتين، حتى يتحقق التأثير المطلوب. من الممكن أن يمر بعض الوقت (3 حتى 9 أيام) حتى تشعر بالتأثير الكامل للدواء، بعد تلقيك الحقنة الأولى.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب التوجّه للطبيب واستشارته حول الذي يتوجب عليك فعله.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **بريكات** قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندمض من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

إنتهب للأعراض الجانبية الخطيرة

بلغ الطبيب بشكل فوري إذا لاحظت أو شككت بحدوث إحدى الاعراض التالية. من الممكن أن تحتاج لعلاج طبي عاجل.

مشاكل في القلب:

- اضطراب في نظم القلب - هذا العرض قد يؤدي إلى توقف العمل السليم للقلب ويمكن أن يسبب فقدان الوعي.
- نظم سريع لنبضات القلب بشكل شاذ.
- نبضات قلب إضافية.

مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يستعملون **بريكات** (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعملين).

حالات وفاة فجائية حصلت لدى المتعالجين الذين تناولوا هذا الدواء، إلا أنه من غير المعروف بشكل دقيق نسبة شيوغ حالات الوفاة هذه. بالإضافة لذلك، سكتة قلبية (توقّف دقات القلب) حصلت أيضاً لدى أشخاص قاموا بتناول أدوية مضادة للذهان.

مشكلة خطيرة تُسمى "المتلازمة العصبية الخبيثة" (Neuroleptic Malignant Syndrome)، هذه الظاهرة تسبب سخونة مرتفعة، تصلب خظير في العضلات، إرتباك وفقدان الوعي. من غير المعروف بشكل دقيق نسبة شيوغ هذا العرض الجانبي لدى الأشخاص الذين يتناولون **بريكات**.

مشاكل في السيطرة على حركات الجسم أو الأطراف (اضطراب خارج الهرمي - extrapyramidal disorder)، مثل:

- حركات فم، لسان، فك وأحياناً الأطراف (خلل حركي متأخر tardive dyskinesia).
- الشعور بعدم الراحة أو صعوبة في الجلوس براحة، زيادة حركات الجسم.
- حركات جسم بطيئة أو قليلة، تشنجات أو حركات تشنجية.

● إرتجاف أو تصلب في العضلات، تأرجح في المشي.
● عدم القدرة على التحرك.

● عدم وجود تعابير وجه طبيعية، التعبير في بعض الأحيان يشبه القناع.
● هذه الأعراض شائعة جداً لدى الأشخاص الذين يتناولون **بريكات** (قد تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين).

إذا عانيت من إحدى تلك الأعراض، من الممكن أن يتم إعطائك دواء إضافياً.

رد فعل تحسسي خطير قد يشمل:

- إنتفاخ في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة.
- صعوبة في البلع أو في التنفس.
- طفح مترافق مع حكة (شرى).

من غير المعروف بشكل دقيق نسبة شيوغ رد الفعل التحسسي لدى الأشخاص الذين يستعملون **بريكات**.

خثرات دموية في الأوردة، عادة في القدمين (خثار الأوردة العميقة - DVT). تم التبليغ عن هذا العرض لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان. علامات DVT في الرجل تشمل إنتفاخ، ألم واحمرار في الرجل، ولكن الخثرة قد تنتقل إلى الرتتين، مسببة بذلك ألماً في الصدر وصعوبات في التنفس. قد تكون الخثرات الدموية خطيرة جداً، لذلك أخبر الطبيب بشكل فوري إذا كنت تلاحظ إحدى تلك المشاكل. بلغ الطبيب بشكل فوري إذا كنت تلاحظ إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة المفضلة أعلاه.

أعراض جانبية أخرى:

بلغ الطبيب إذا كنت تلاحظ أو شككت بحدوث إحدى الأعراض الجانبية التالية.

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

- إكتئاب.
- صعوبات في النوم أو شعور بالنعاس.
- إمساك.
- جفاف في الفم أو زيادة في إفراز اللعاب.
- صعوبة في الأداء الجنسي.
- تهيج، ألم أو تجمع قيح (خراج) في موضع الحقن.
- زيادة في الوزن.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- توتر عضلي شاذ.
- صداع.
- حركة العينين نحو الأعلى أو حركة عينين سريعة لا يمكنك التحكم بها.
- مشاكل في الرؤية، مثلاً تشوش الرؤية.

بالإضافة لذلك، تم التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية، ولكن من غير المعروف بشكل دقيق نسبة شيوغها:

- مشكلة نفسية خطيرة، مثل الإعتقاد بأمر غير صحيحة (أوهام) أو رؤية، شعور، سماع أو شم أمور غير موجودة (هلوسة).
- شعور بالهياج أو الإرتباك.
- إختلاجات.
- شعور بالدوار، يشمل عند الإنتقال لوضعية الجلوس أو الوقوف.
- ضغط دم منخفض.
- مشاكل قد تسبب صعوبات بالتنفس، مثل:

- إنتفاخ حول حجيرة الصوت، أو تشنج مؤقت للأوتار الصوتية والذي قد يؤثر على الكلام.
- تضيق الشعب الهوائية في الرتتين.
- ضيق في التنفس.

- غثيان، تقيؤات.
- تغييرات في الدم، مثل:

- تأثير على خلايا الدم - تعداد منخفض لجميع أنواع خلايا الدم، يشمل إنخفاضاً خطيراً بعدد خلايا الدم البيضاء وعدد قليل للصفائح (الخلايا التي تساعد على تخثر الدم).

- إرتفاع نسبة بعض الهرمونات في الدم - بروتاكتين والهورمون المضاد لإدرار البول (متلازمة مرتبطة بخلل إفراز الهورمون الضاد للإدرار).
- إنخفاض نسبة السكر في الدم.

- تغييرات في الكبد والتي تظهر في فحوص الدم ومشاكل كبدية أخرى، مثل:
- إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين (يرقان).
- إلتهاب في الكبد.
- قصور كبد مفاجئ.

- إنخفاض في تدفق العصارة الصفراوية في القناة الصفراوية.
- مشاكل في الجلد، مثل:
- طفح أو حكة.
- تحسس شديد لضوء الشمس.
- تكوّن قشرة في الجلد أو تقشر الجلد.
- إلتهاب في الأوعية الدموية الصغيرة، والذي يؤدي لطفح جلدي مصحوب بتقوآت حمراء أو بنفسجية صغيرة.

- زيادة في التعرق.
- تفكك الأنسجة العضلية (إنحلال العضل rhabdomyolysis).
- تقلص عضلي، تشنجات أو تقلصات لا يمكنك التحكم بها، يشمل تشنج في الرقبة مما يؤدي بالرأس إلى الإفتتال لجهة واحدة.

- صعوبة أو عدم القدرة على فتح الفم.
- تصلب العضلات والمفاصل.
- عدم القدرة على التبول أو على إفراغ المثانة تماماً.
- إنتصاب مطول في القضيب الذكري مصحوب بألم.
- صعوبة الوصول للإنتصاب والحفاظ عليه (عجز جنسي).

- إنخفاض أو فقدان الرغبة الجنسية.
- تغييرات في الدورة الشهرية (الحيض) مثل توقف الدورة أو إطلاتها، نزف شديد، ألم في الدورة الشهرية.

- مشاكل في الثديين مثل:
- ألم أو عدم راحة.
- إنتاج غير متوقّع لحليب الأم.
- تضخم الثديين لدى الرجال.

- إنتفاخ ناتج عن إحتباس السوائل في الجسم.
- إرتفاع أو إنخفاض في درجة حرارة الجسم.
- مشاكل في المشي.
- فقدان الوزن.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ص" بواسطة العنوان: <https://unipharm.co.il/>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تتفادى إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبلة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على: Sesame oil, Benzyl alcohol.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبلة:

أميولات **بريكات** مصنوعة من الزجاج الداكن وتحتوي على 1 ملل محلول صافٍ، ذهني، لزج بلون أصفر حتى بني فاتح. الأميولات معبأة في لويحة ضمن عبلة كرتون. تحتوي كل عبلة على 5 أميولات.

صاحب الإمتياز: يونيفارم تسويق م.ص، ص.ب. 21429 تل أبيب، 6121301.

تم إعدادها في تموز 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

026 04 25277 00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.