

# سكايريزي™ 150 ملг محلول للحقن ضمن محقنة جاهزة للحقن

المادة الفعالة وتركيزها:

كل محقنة جاهزة للحقن تحتوي على ريسانكوزوماب 150 ملг في 1 مل، 1 ml/150 mg.

للقائمة المواد غير الفعالة وموادات المساعدة - الرجاء أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» في هذه النشرة.

إنقرأ النشرة بعثين حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

ووصف هذا الدواء للعلاج من أجل لا. تعطيله لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

## 1. لأى غرض مخصص الدواء؟

سكايريزي مخصص لعلاج الصدفية (psoriasis) اللوبيجية المتوسطة حتى الشديدة، لدى الكبار المرشحين للعلاج جهازي.

الفصيلة العلاجية:

من مثبطات الجهاز المناعي، من مثبطات إنترلوكين.

يمثل سكايريزي عن طريق حجب بروتين في الجسم المسمى "IL-1A"، الذي يسبب الإلتهاب. بذلك، يقلل الدواء من الإلتهاب.

يقلل الدواء أيضاً من أعراض الصدفية مثل حرق، حكة، ألم، أحمرار وتشكل قشرة.

## 2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) لـ ريسانكوزوماب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (مفصلة في الفقرة 6).

• وجود لديك تلوث، بما في ذلك سل شفط، والذي يعتقد طبيبك بأنه مهم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج وخالد إستعمال سكايريزي إنجل للطبيب إذا:

• لديك حالياً تلوث أو إذا كنت تعاني من تلوثات متكررة.

• لديك سل.

• تقييد مؤخرأً أو تخطيط لتلقي لقاح. عليك الامتناع عن تلقي لقاحات من تلقي لقاحات من أنواع معينة خلال فترة إستعمال سكايريزي.

ردوه فعل تحسسية

إحك للطبيب أو توجه حالاً لتلقي مساعدة طبية إذا لاحظت إحدى علامات رد الفعل التحسسي خلال إستعمال سكايريزي، مثل:

• صعوبة في التنفس أو في البلع

• إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة

• حكة شديدة في الجلد، التي تزداد بطفح أحمر أو بآفات جلدية بارزة

الأطفال والمرأهقات

سكايريزي غير مخصص لأطفال ومرأهقات دون عمر 18 سنة، ذلك لأنه لم يتم اختبار سكايريزي لدى هذه الفئة من العمر.

التدخلات/التداخلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرأً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالعكس إذا تقييد مؤخرأً أو تخطيط لتلقي لقاح. عليك الامتناع عن تلقي لقاحات من أنواع معينة خلال فترة إستعمال سكايريزي.

إذا كنت تناولت سكايريزي أو المرضية الخاصة بك قبل وخلال فترة إستعمال سكايريزي، مثل:

• إذا كنت أمراً في السنة الأولى من عمرك، فعليك إستعمال وسيلة من حمل خلال فترة إستعمال هذا الدواء، ولمدة 21 أسبوعاً على الأقل بعد المدار

الدوائي الآخر من سكايريزي.

لا توجد معلومات كافية بخصوص إستعمال سكايريزي أثناء الحمل، ولذلك، كوصيلة حذر، يوصي بالإمتناع عن إستعمال الدواء أثناء الحمل.

من غير المعروف إذا كان سكايريزي يطرح في حليب الأم. إحك طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع قبل إستعمال هذا الدواء.

السيادة وإستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر سكايريزي على إستعمال الماكينات والسيادة لديك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

الرجاء أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية» في هذه النشرة.

## 3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

على الإلستخيص من الطبيب أو الصيدلي الخاص به إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء من قبل الطبيب فقط.

يُعطي هذا الدواء بالحقن تحت جلدك (بسمي بالحقن تحت الجلد).

يحتوي كل مقدار دوائي على 150 ملг الذي يُعطي بحقنة واحدة. بعد المقدار الدوائي الأول، سوف تلتقي المقدار الدوائي التالي بعد مضي 4 أسابيع، وبعد ذلك 12 أسبوعاً.

إنت وطبيب، الصيدلي أو المرضية الخاصة بك يتوجب عليكم التقرير فيما إذا من المفترض أن تحقن هذا الدواء بنفسك. لا تحقن نفسك الدواء إلى أن تلتقي إرشاداً من طبيب، الصيدلي أو المرضية خاصةك. بإمكان المعالج أيضاً أن يحقق لك بعد تلقي إرشاد ملائم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إنقرأ بعنوان الفقرة 7 «تعليمات الإستعمال» في نهاية هذه النشرة قبل أن تحقن لنفسك سكايريزي.

إذا حفنت بالحقن مقداراً وواضاً أكبر

إذا حفنت بالحقن مقداراً وواضاً مفترضاً من سكايريزي أو إذا أعطيت الجرعة الدوائية في موعد أبكر مما حد في وصفة الطبيب أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت حقن سكايريزي

إذا نسيت حقن سكايريزي، فعليك حقن مقدار دوائي فوراً عند تذكرك بذلك. تحدث مع طبيبك إذا لم تكن واثقاً مما يتوجب عليك فعله.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.  
إذا توفرت عن إستعمال سكايريزي  
لا يجوز إستعمال سكايريزي بدون إستشارة الطبيب مسبقاً، إذا توفرت عن العلاج فإن الأعراض لديك يمكن أن تعود.  
لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء، ضع الخثارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.  
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سكايريزي قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدبر من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لأن تعاني أي منها.

## أعراض جانبية خطيرة

عليك التحدث مع الطبيب أو التوجه لتلقي مساعدة طبية بشكل فوري إذا وجدت لديك أعراض لتوث خظير، مثل:  
• سخونة، أعراض شديدة بالإلتفاف، اعرق، اعرق ليلي  
• الشعور بإرهاق أو ضيق في التنفس، سعال غير عابر  
• جلد ساخن، أحمر، ومؤلم، أو تشقق جلدي مؤلم يترافق بحويصلات يقرن طيبين فيها إذا بإمكانك مواصلة إستعمال سكايريزي.

## أعراض جانبية أخرى

إحك طبيبك إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:  
أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):

• لوائح في الطريق التنفسية الملوية التي تترافق بأعراض مثل ألم في الحنجرة واحتقان في الأنف

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

- الشعور بإرهاق
- تلوث فطري في الجلد
- روود فعل في مكان الحقن (مثل إحرار أو ألم)
- حكة
- صداع

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):

- نتوءات صغيرة وحمراء على الجلد

إذا ظهر عرض جنبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جنبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

## التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (il.gov) الذي يوجهك إلى المنழج المباشر للجبلة عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب النسم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التقييف بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر ملصقة المحقنة وعلبة الكرتون الخارجيه. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• سروط التخزين: يجب تخزين الدواء في درجات منخفضة (8-28 درجات مئوية). لا يجوز التجميد.

• يجب حفظ المحقنة في طبلة الكرتون الأصلية للحماية من الضوء.

• عند الحاجة، والإمكان تخزين المحقنة الجاهزة للحقن أياً خارج البراد (حتى 25 درجة مئوية كحد أقصى) حتى 24 ساعة في علبة الكرتون الأصلية لحمايتها من التلوث.

• لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا دعا السائل عكراً أو يحتوي على فتات أو جسيمات كبيرة.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو في سلة القمامه المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال.

## 6. معلومات إضافية

### ماذا يحتوي سكايريزي

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا:

Trehalose dihydrate, sodium acetate trihydrate, polysorbate 20, acetic acid glacial and water for injection

• يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 ملخ) في كل محقنة جاهزة للحقن، أي أنه عملياً «حال من الصوديوم».

### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

سكايريزي عبارة عن سائل واقٍ وعديم اللون حتى أصفر موجود بداخل محقنة جاهزة للحقن مع واقٍ إبرة. قد يحتوي السائل على جسيمات صغيرة بلون أبيض أو شفاف.

تحتوي كل علبة على مقدمة 1 جاهزة للحقن.

### صاحب الإمكانيات وعنوانه: أثفي بيوفاراما، مصر، حماراش 4، هود هشارون، إسرائيل.

• إسم المنتج و عنوانه: أثفي دوشلاند جي إم بي، إيتش آند كو، كي جي، كنوشتسراسه، 67061، لويفينسهاffen، ألمانيا.

• تم إعدادها في حزيران 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 169-73-36871

معلومات إضافية ولمركم برنامج الدعم

\*6718




من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.


أمسك المحقنة بحيث تكون الإبرة المقنطة متوجهة نحو الأسفل، بحسب الرسم.

إفحص السائل الذي في المحقنة.

- إنه لأمر سليم رؤية فقاعات في النافذة الصغيرة
- يجب أن يビدو السائل رائقًا حتى أصفر وقد يحتوي على جسيمات صغيرة بيضاء أو شفافة
- لا يجوز الاستعمال إذا بدا السائل عكرًا أو يحتوي على فتات أو جسيمات كبيرة



المرحلة 3



قبل أن تحقن سكايريزي، من المهم أن تعرف

- عليك أن تلتقي إرشاداً حول كيفية حقن سكايريزي قبل إعطاء الحقنة. تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة خاصتك إذا كنت بحاجة لمساعدة
- علم التواريخ في لوحة التقويم السنوي الخاصة بك، لكنك تعرف متى عليك حقن سكايريزي
- إحفظ سكايريزي في علبة الكرتون الأصلية لحماية الدواء من الضوء إلى أن يحين موعد استعمالها
- لا يجوز الحقن إذا كان السائل عكرًا أو يحتوي على فتات أو جسيمات كبيرة. يجب أن يビدو السائل رائقًا حتى مائل للأصفر وقد يحتوي على جسيمات صغيرة بيضاء أو شفافة
- لا يجوز خصم المحقنة
- ترثي في نزع غطاء الإبرة حتى قبيل الحقن فعليًا.

قم برجاع هذه الدواء للصيدلية

- إذا إنقضى تاريخ الصلاحية (EXP)
- إذا تمدد السائل ذات مرة (حتى ولو ذات)
- إذا سقطت المحقنة أو تضررت
- إذا كانت علبة الكرتون غير كاملة


الحقن مريح أكثر: أخرج عبوة الكرتون من البراد وأنترتها بدرجة حرارة الغرفة، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، لمدة 15 حتى 30 دقيقة قبل الحقن.

- لا يجوز تسخين سكايريزي بأية طريقة أخرى (مثلاً، بداخل الميكروويف أو في ماء ساخن)
- إحفظ المحقنة داخل عبوة الكرتون إلى أن تكون جاهزاً للحقن

إنبع المراحل أدناه في كل مرة تستعمل سكايريزي

نزع غطاء الإبرة.


- أمسك المحقنة بيد واحدة بين مقبض الإمساك وغطاء الإبرة
- بواسطة اليد الثانية، اسحب بلطف وأنزع غطاء الإبرة
- لا يجوز مس أو سحب المكبس خلال نزع غطاء الإبرة
- من الجائز أن ترى قطرة سائل في طرف الإبرة. هذا الأمر سليم
- ارم غطاء الإبرة
- لا يجوز لمس الإبرة بأصابعك ولا تسمح بلامسة الإبرة لأي سطح كان



المرحلة 4

أمسك جسم المحقنة بيد واحدة، بين الإبهام والسبابة، كأنك تمسك قلم رصاص.


- أقرض بلطف بواسطة يدك الثانية منطقة الجلد التي تم تنظيفها وأمسكتها بقوية.
- أدخل الإبرة حتى النهاية داخل الجلد بزاوية قدرها 45 درجة تقريباً
- بحركة سريعة وقصيرة، حافظ علىبقاء المحقنة ثابتة بنفس الزاوية.



المرحلة 5

ادفع ببطء المكبس نحو الداخل حتى النهاية، إلى أن يتم حقن كامل السائل.


- اسحب الإبرة من الجلد مع إبقاء المحقنة بنفس الزاوية.
- إنزع ببطء الإيهام عن المكبس. في هذه المرحلة، ستستagnي الإبرة
- إن يتم تفعيل وaci الإبرة إلى أن يتم حقن كامل السائل
- تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة خاصتك إذا بدا لك بأنه لم يعطوك ما قدراً دوائياً كاملاً
- إضغط بواسطة كربونطة أو ضماد شاشي على مكان الحقن وواصل الضغط لمدة 10 ثوانٍ.
- لا يجوز فرك الجلد في مكان الحقن. من الجائز حدوث نزف طفيف في مكان الحقن. هذا الأمر سليم.



المرحلة 6

ارم المحقنة المستعملة في وعاء خاص للتلفيات مباشرة بعد الإستعمال.

- لا يجوز رمي المحقنة المستعملة في القمامات المنزلية
- يوضح لك طبيبك، الصيدلي أو الممرضة خاصتك كيف يجب إعادة الوعاء الممتنى الخاص بالتلفيات




المرحلة 7

- المرحلة 1**
- أخرج المحقنة الجاهزة للحقن من غلافها بواسطة مقبض الإمساك.
- لا يجوز مس أو سحب المكبس عند إخراج المحقنة الجاهزة للحقن من غلافها
  - ضع الأشياء التالية على سطح نظيف ومستوى:
    - 1 محقنة كحولي (غير مشمول في علبة الكرتون)
    - 1 ضماد كحولي (غير مشمول في علبة الكرتون)
    - 1 كرة من القطن أو ضماد شاشي (غير مشمول في علبة الكرتون)
    - وعاء خاص للقمامة (ليس مشمول في علبة الكرتون)
  - أشطف وجفف يديك.



المرحلة 1

- المرحلة 2**
- اختر من بين الأماكن الثلاثة للحقن:
- القسم الأمامي من الخخذ الأيسر
  - الجزء الأمامي من الفخذ الأيمن
  - في البطن بمسافة قدرها 5 سم على الأقل من السرة
- قبل كل عملية حقن، إسحّ المكان الذي أنت مقبلًا على الحقن فيه بواسطة ضماد كحولي بحركة دائرية.
- لا يجوز لمس مكان الحقن أو الزفر عليه بعد تنظيفه. دع الجلد يجف قبل الحقن
  - لا يجوز الحقن عبر الملابس
  - لا يجوز الحقن في جلد مؤلم، مرضوض، محمر، قاسي، فيه ندب، أو فيه علامات شد
  - لا يجوز الحقن في أماكن مصابة بالصدفية



مناطق الحقن