

## سكايريزي™ 150 ملغ

### محلول للحقن ضمن قلم جاهز للحقن

المادة الفعالة وتركيزها: كل قلم جاهز للحقن يحتوي على ريسانكيماب 150 ملجم في 1 مللي. Risankizumab 150 mg/1 ml.

اللقيمات الماء غير الفعالة ومواد الدسائية - الرجال أنتظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك، لا تعطيه لآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

#### 1. لأى غرض مخصص الدواء؟

سكايريزي مخصص لعلاج الصدفية (psoriasis) الlobeحية المتوسطة حتى الشديدة، لدى الكبار المرضحين لعلاج جهازي.

#### الفحصيلة الملاجة:

من مثبطات الجهاز المناعي، من مثبطات إنترولوكين. يعمل سكايريزي عن طريق حجب بروتين في الجسم المسمى "IL-23"، الذي يسبب الالتهاب، بذلك، يقتل الدواء من الالتهاب.

يقل الدواء أيضاً من أمراض الصدفية مثل حرق، حكة، إحرار وتشكل قشرة.

#### 2. قبل استعمال الدواء

##### لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت محسساً (أيضاً) لـ ريسانكيماب أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها هذا الدواء (مفصلة في الفقرة 6).
- وج لديك ثلث، بما في ذلك مرض سلس نشط، والذي يعتقد طبيب بأنه مهم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستخدام الدواء:

##### قبل العلاج وخلال استخدام سكايريزي أخذ الطبيب إذا:

- لديك حالياً ثلث أو إذا كنت تعاني من تلوثات متكررة.
- لديك سلس.
- تلقيت مؤخراً أو تخطط للتقي لقاح. عليك الإمتناع عن تلقي لقاحات من نوع معينة خلال فترة إستعمال سكايريزي.

##### ردة فعل حساسية

إذا كنت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، لا يجوز التجايد.

إذا حذرت بالخطأ مقداراً دوائياً مفرطاً من سكايريزي أو إذا أعطيت مقدار الدوائي في معدود أكبر مما حدد في وصفة الطبيب أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا تسببت حقن سكايريزي إذا حذرت بالخطأ حقن سكايريزي، فعليك حقن مقدار دوائي فوراً عند ذكرك بذلك. تحدث مع طبيبك إذا لم تكن واثقاً مما يتوجب عليك فعله.

يجب الواظطة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن إستعمال سكايريزي لا يجوز التوقف عن إستعمال سكايريزي بدون إستشارة الطبيب أولاً، إذا توفرت عن العلاج فإن الأعراض لديك يمكن أن تعود.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الذي أتيت به في كل مرة تستعمل فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سكايريزي قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز إلا تعاني أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

عليك التحدث مع الطبيب أو التوجه للتقي لتقني مساعدة طبية بشكل فوري إذا وجدت لديك أعراض تلوث خطير، مثل:

• سخونة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تعرق باطن.

• الشعور ببرد أو شفيف في التقني، سعال غير عابر.

• جلد ساخن، أحمر، مؤلم، أو طفح جدي مؤلم يتراافق بجروح صلبات يقرر طبيب فيما إذا يمكناك مواصلة إستعمال سكايريزي.

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا تلقيت مؤخراً أو تخطط لتلقي لقاح. عليك الإمتناع عن تلقي لقاحات من أنواع معينة خلال فترة إستعمال سكايريزي.

إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو المرضحة خاصتك قبل وخلال إستعمال سكايريزي.

سكايريزي غير مخصص لأطفال ومرأهفين دون عمر 18 سنة، ذلك لأنه لم يتم اختبار سكايريزي لدى هذه الفئة من العمر.

#### التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا تلقيت مؤخراً أو تخطط لتلقي لقاح. عليك الإمتناع عن تلقي لقاحات من أنواع معينة خلال فترة إستعمال سكايريزي.

إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو المرضحة خاصتك قبل وخلال إستعمال سكايريزي.

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إخذ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا تلقيت مؤخراً أو تخطط لتلقي لقاح. عليك الإمتناع عن تلقي لقاحات من أنواع معينة خلال فترة إستعمال سكايريزي.

إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو المرضحة خاصتك قبل وخلال إستعمال سكايريزي.

إذا كانت إمراة في سن الخصوبة، فعليك إستعمال وسيلة منع حمل خلال فترة إستعمال هذا الدواء، ولذلك 21 أسبوعاً على الأقل بعد إيقاف الدوائي الأخير من سكايريزي.

لا توج معلومات كافية بخصوص إستعمال سكايريزي أثناء الحمل، ولذلك، كوكسيلة حذر، يوصى بالانتهاء من إستعمال الدواء أثناء الحمل.

من غير المعروف إذا كان سكايريزي يطرح في حليب الأم، إحكي لطبيبك إذا كنت مرضعة أو تحظين للرضاعة قبل إستعمال هذا الدواء.

#### السيادة وإستعمال الماكولات

من غير المتوقع أن يؤثر سكايريزي على إستعمال الماكولات وعلى السيادة لديك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

الرجاء أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية" في هذه النشرة.

#### 3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستياضاح من الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار المقادير الدوائية وطريقة الملاجء بدداد من قبل الطبيب فقط.

يعطى هذا الدواء بالحقن تحت جلدك (يسمي الحقن تحت الجلد). يحتوي كل مقدار دوائي على 150 ملجم الذي يعطى بحقنة واحدة، بعد المقدار الدوائي الأول، سوف تتفق المقدار الدوائي التالي بعد مضي 4 أسابيع، وبعد ذلك كل 12 أسبوعاً.

أنت والطبيب، الصيدلي أو المرضحة الخاصة بك متوجب عليكم التقرير فيما إذا تفاقم الفرق بين المقدار الدوائي وطريقة الملاجء، إرشاداً من طبيب، لا تخفق نفسك الدواء إلى أن تلقي إرشاداً من طبيب.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

اقرأ بتمعن الفقرة 7 "تعليمات الإستعمال" في نهاية هذه النشرة قبل أن تتحقق لنفسك سكايريزي.

#### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب النسم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن

متناول أيدي ومحالب ربة الأطفال و/أو الرضيع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.

لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر الملاصقة وعلبة الكرتون الخارجيه. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الآخر من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين في البراد (2-8) درجات مئوية. لا يجوز التجايد.

يجب حفظ القلم الجاهز للحقن في علبة الكرتون الخارجيه من الضوء.

عند الحاجة، بإمكان تخزين القلم الجاهز للحقن أيضاً خارج البراد (حتى حد أقصى قدر 25 درجة مئوية) حتى 24 ساعة في علبة الكرتون الأصلية لحمايته من الضوء.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا بدا السائل عكرأً أو يحتوي على فتات أو جسيمات كبيرة.

لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو في سلة القمامه المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تقدر قي إستعمال.

في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

• ماذا يحتوي سكايريزي

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:

Trehalose dihydrate, sodium acetate trihydrate, polysorbate 20, acetic acid glacial and water for injection

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 ملجم) في كل قلم جاهز للحقن، أي أنه عملياً "خل من الصوديوم".

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

سكايريزي عبارة عن سائل رائق وعديم اللون حتى أصفر موجود بداخل قلم جاهز للحقن. قد يحتوي السائل على سبيمات صغيرة بلون أبيض أو شفاف.

تحتوي كل عملية على قلم 1 جاهز للحقن.

**المرحلة 7**  
طقة "ثانية"  
مؤشر أصفر

عند إنتهاء عملية الحقن، إسحب ببطء القلم عن الجلد.  
يقطعي كم الإبرة الأبيض طرف الإبرة وبتصدر صوت "طقة" إضافي.  
بعد إنتهاء عملية الحقن، ضع قطعة قطن أو ضماد شاشي على الجلد في منطقة الحقن.  
• لا يجوز فرك زر تشغيل منطقة الحقن هو أمر سليم

**المرحلة 8**

أمسك القلم بحيث يكون الغطاء الرمادي الداكن متوجهاً نحو الأعلى، حسب الرسم.

- إسحب وأذزع الغطاء الرمادي الداكن
- إرم الغطاء الرمادي الداكن إفحص السائل الموجود في نافذة المراقبة.
- إنه لأمر سليم رؤية فقاعات في السائل
- يجب أن يبيدو السائل رائقاً حتى أصفر وقد يحتوي على جسيمات صغيرة بيضاء أو شفافة
- لا يجوز الإستعمال إذا بدا السائل عكراً أو يحتوي على فتات أو جسيمات كبيرة

**المرحلة 9**

إرم القلم المستعمل في وعاء خاص للنفايات باشرة بعد الاستعمال.

- لا يجوز رمي القلم المستعمل في سلة النفايات البيتية
- طبليين، الصيدلي أو المرضى خاصة يتشارحوا لك كف تهديد الوعاء الممليئ بالخاص بالنفايات

**المرحلة 4**  
إفحص السائل

أمسك القلم بحيث يكون الغطاء الرمادي الداكن متوجهاً نحو الأعلى، حسب الرسم.

**المرحلة 5**  
البطن أو الفخذ

أمسك القلم بحيث يكون بإمكانك الإمساك الرماديين.

إقلب القلم بحيث يتجه كم الإبرة الأبيض نحو منطقة الحقن ويكون بإمكانك رؤية زر التشغيل الأخضر.

اضغط (أقصى) باطف الجلد في منطقة الحقن الخاصة بك لتشكيل منطقة باردة وأمسك بها شفافياً.

وضع كم الإبرة الأبيض بزاوية قائمة (90 درجة) لمنطقة الحقن البارزة.

**المرحلة 6**  
طقة "أولى"  
ثانية 15

أمسك القلم بحيث يكون بإمكانك رؤية زر التشغيل الأخضر ونافذة المراقبة.

دفع وواصل الضغط على القلم مقابل منطقة الحقن.

- يتم تعديل القلم فقط عندما يضغط كم الإبرة الأبيض نحو الأسفل مقابل منطقة الحقن وذلك قبل الضغط على زر التشغيل الأخضر
- إضغط على زر التشغيل الأخضر وأبقى القلم لمدة 15 ثانية على هذا النحو.
- صوت "طقة" قوي يشير إلى بداية الحقن

**المرحلة 1**  
أخرج على الكرتون من البراد وأتركها في درجة حرارة الغرفة، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، لمدة 30 حتى 90 دقيقة قبل الحقن

- لا يجوز إخراج القلم من عليه الكرتون أثناء تمكنك من سكابيريزي من بلوغ درجة حرارة الغرفة
- لا يجوز تسخين سكابيريزي بأي طريقة أخرى، مثل، لا يجوز التسخين في الميكرويف أو في الماء الساخن
- لا يجوز استعمال القلم إذا تجمد السائل، حتى ولو ذاب

**المرحلة 2**

ضع الأشياء التالية على سطح نظيف ومسطح:

- قلم جاهز للحقن
- ضماد كموي (غير مشمول في علبة الكرتون)
- كرة قطن أو ضماد شاشي (غير مشمول في علبة الكرتون)
- وعاء خاص للنفايات (غير مشمول في علبة الكرتون)

أشطف وجف ديدك.

**المرحلة 3**

اختار من بين 3 مناطق للحقن:

- الجزء الأمامي من الفخذ الأيسر
- الجزء الأمامي من الفخذ الأيمن
- في البطن بمسافة قدرها 5 سم على الأقل من السرة

قبل كل عملية حقن، امسح المكان الذي أنت مقبلًا على الحقن فيه بواسطة ضماد كموي بحركة دائريّة.

- لا يجوز لمس مكان الحقن أو الزفر عليه بعد تنظيفه، دع الجلد يجف قبل الحقن
- لا يجوز الحقن عبر الملابس
- لا يجوز الحقن في جلد مؤلم، مرضوض، مهمم، قاسي، فيه ندب، أو فيه علامات شد
- لا يجوز الحقن في أماكن مصابة بالصنفية

**المرحلة 7**  
كل مرحلة تستعمل فيها سكابيريزي

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

**7. تعليمات الاستعمال**

**الرجاء إقرأ الفقرة 7 بكمالها قبل إستعمال سكابيريزي**

**سكابيريزي قلم جاهز للحقن**

غطاء رمادي داكن  
(لا يجوز نزعه إلا قبل الحقن)

زر تشغيل أخضر  
نافذة مراقبة  
إبرة

مقبضي إمساك رماديين  
كم إبرة أبيض

قبل أن تحقن سكابيريزي، من المهم أن تعرف

- قبل أن تلتقي إرشاداً حول كيفية حقن سكابيريزي قبل إعطاء الحقنة، تحدث مع طبليين، الصيدلي أو الممرضى خاصة إذا كنت بحاجة لمساعدة
- علم التواريخ في لوحة التقويم السنوي الخاصة بك، الذي تعرف متى عليك حقن سكابيريزي
- يحفظ سكابيريزي في علبة الكرتون الأصلية لحماية الدواء من الضوء إلى أن يحين موعد استعمالها
- قم بإخراج علبة الكرتون من البراد وأتركها بدرجة حرارة الغرفة، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، لمدة 30 حتى 90 دقيقة قبل الحقن
- لا يجوز الحقن إذا كان السائل في نافذة المراقبة عياراً أو يحتوي على فتات أو جسيمات صغيرة بيضاء أو شفافة
- لا يجوز خض القلم
- ترتيب في نزع الغطاء الرمادي الداكن حتى قبل الحقن فعلياً

قم بإرجاع هذا الدواء للصيدلية

- إذا إنقضى تاريخ الصلاحية (EXP)
- إذا تجمد السائل ذات مرة (حتى ولو ذاب)
- إذا سقط القلم أو تضرر
- إذا كانت علبة الكرتون غير كاملة

**صاحب الامتياز وعنوانه: أبيبي بيوفارما، مصر، هماراش 4، هود هشارون، إسرائيل.**

**اسم المنتج وعنوانه: أبيبي دوبتشلاند جي، إم.بي.إيتش أند ك. كي.جي، كنوشنترشن، 67061، لودفيغسهafen، ألمانيا.**

**تم إعدادها في حزيران 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.**

**رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 169-73-36871**

**معلومات إضافية ولمركز برنامج الدعم إتصلوا 6718 \***