

ناكسين 500 ملغ أقراص

التوزيع

يحتوي كل قرص على:

ناپروكسين 500 ملغ (Naproxen 500 mg)

لمعلومات عن مواد غير فعالة ومؤثرة للحساسية أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"، والبند 6 - "معلومات إضافية".

أقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. يحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا ذلك شابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

للتخفيف من علامات وأعراض أمراض روماتيزمية (روثية)، التهابات مفاصل، اضطرابات عضلية، التهابات أوتار، اضطرابات في الجهاز العضلي-الهيكلي وللتخفيف من الألم المظهر وآلام المفاصل (الدورة الشهرية).

المجموعة العلاجية: مضادات الالتهاب غير ستيرويدية (NSAIDs).

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسيةً لـ ناپروكسين، لـ ناپروكسين صوديوم أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء، أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".
- وجدت لديك حساسيةً (NSAIDs) للأسيبرين، لدواء آخر من مجموعة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو لكل دواء ممكن الأخر (مثل إيبوبروفين أو ديكلوفيناك). كانت توجد لديك اليوم أو في الماضي أية مشاكل في المعدة أو في الأمعاء مثل قرحة أو نزيف.
- عانيت في الماضي من نزيف أو من نتقّب في المعدة أثناء تناول أدوية من مجموعة NSAIDs.
- كانت لديك مشاكل خطيرة في الكلى، في الكبد أو في القلب.
- كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

إذا كانت لديك مشاكل في القلب، إذا أصبت في الماضي بسكتة دماغية أو إذا كنت تعتقد بأنك معرض لخطر حصول هذه الحالات (مثلاً إذا كان لديك ضغط دم مرتفع، سكري، مستويات كولسترول مرتفعة أو إذا كنت مدخنًا)، يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي بخصوص ناكسين.

قبل بدء العلاج بـ ناكسين 500 ملغ، أخبر طبيبك إذا كان لديك:

- ربو أو حالات حساسية (مثل رشح حساسي) أو إذا كان لديك في الماضي انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان.
- إحساس بالضعف (قد يكون ذلك بسبب المرض) أو إذا كنت بالغًا بالسّن.
- كتل (زوائد لحمية) في الأنف، إذا كنت تعطس كثيرًا أو إذا كنت تعاني من الرشح، إذا كان أنفك مسودًا أو يثير الحكّة (التهاب في الأنف).
- مشاكل في الكلى أو في الكبد.
- مشاكل في الأوعية الدموية (شرايين) في قسم معين في الجسم.
- مستويات مرتفعة جدًا من الدهون في الدم (فرط الدهون في الدم - Hyperlipidemia).
- مرض مناعي ذاتي، مثل التئبة الحمامية الجهازية (systemic lupus erythematosus - SLE) الذي يسبب الألم مفاصل، طفح جلدي وحسونة، والتهاب الأمعاء الخفيف (التهاب القولون - Colitis) أو مرض كرون (وهي حالات التي تؤدي إلى التهاب في الأمعاء، الأم في البطن، حالات إسهال، تقوّات وانخفاض في الوزن).
- إذا أنظفت عليك إحدى الحالات أعلاه أو إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

رودو فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول: مسكّنات الألم الأخرى، مثل الأسبيرين، إيبوبروفين، ديكلوفيناك وإپراسيتامول. أدوية لمنع تخثر الدم، مثل أسبيرين/حمض أسيتيل ساليسيليك، وارفارين، هيبارين أو كلويدوچريل.

هيدانتونين (للصرع)، مثل فينتويتين. أدوية سولفوناميدات مثل هيدروكلوروثيازيد، أسيتازولاميد، إيندايبيد، ومضادات حيوية سولفوناميدية (لحالات العدوى). سولفونيلوريات (السكري)، مثل جلينكليبريد أو جلينجليزيد. مثبطات إنزيم ACE أو أدوية أخرى لضغط الدم المرتفع مثل سيليازيريل، إينالبريل أو بروبونولول. أحماض المستقل أنجيوتنسين 2، مثل كانديسارتان، إيرومارتان أو لوسارتان.

• مدرّات البول (الضغط الدم المرتفع)، مثل فوروسيميد.

• جليكوزيدات قلبية (مشاكل القلب)، مثل ديجوكسين.

• ستيرويدات (للتخفيف والالتهاب)، مثل هيدروكورتيزون، پردنيزولون وديكساميثازون. • مضادات حيوية من مجموعة الكينولونوات (لحالات العدوى)، مثل سيبروفلوكساسين أو موكسيفلوكساسين.

• أدوية معينة لمشاكل نفسية مثل ليثيوم أو أدوية من مجموعة SSRIs (مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين) مثل فلواكسيتين أو سيتالوبرام.

• برونهيدس (للقرص).

• ميوتريكسات (يستعمل لعلاج مشاكل في الجلد، التهاب مفاصل أو سرطان).

• ميثوسبورين أو تاكروليموس (للمشاكل في الجلد أو بعد زرع أعضاء).

• زيدوفودين (لعلاج الإيدز وحالات عدوى HIV).

• ميفينديسولون (لوقف الحمل (الإجهاض) أو لتخفيف الولادة إذا توفى الجنين).

إذا كنت تتناول إحدى هذه الأدوية المذكورة أعلاه أو إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

استعمال الدواء والغذاء

يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء. يجب تناول الدواء مع أو بعد وجبة الطعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

• يُمنع تناول ناكسين 500 ملغ إذا كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، لأن هذا ممكن أن يسبب ضررًا لحينك.

• عند استعمال هذا المستحضر هناك احتمال حدوث عارض جانبي من ضرر في الكلى لدى الحين ونقص السائل السولي بدءًا من الأسبوع الـ 20 للحمل. يوصى بتجنّب استعمال مستحضرات من مجموعة NSAIDs بدءًا من الأسبوع الـ 20 للحمل

• واستشارة عضو من الطاقم الطبي عند الحاجة.

• إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدن بأنك حامل أو تخططين للحمل، استشير طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

• ناكسين 500 ملغ ممكن أن يؤدي إلى صعوبات في أن تحملي. يجب عليك إخبار الطبيب إذا كنت تخططين أن تحملي أو إذا واجهت صعوبات في أن تحملي.

السياسة واستعمال الماكينات

• ناكسين 500 ملغ ممكن أن يؤدي إلى تعب، نعاس، دوام، مشاكل في الرؤية والتوازن، اكتئاب أو صعوبات نوم.

• أخبر الطبيب إذا كنت تواجه إحدى هذه الأعراض ولن تقم بقيادة أو استعمال أية أدوات أو ماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

• يحتوي الدواء على سكر الذي يدعى لكتوز. إذا أخبرك طبيبك بأنك تعاني من عدم قدرة على تحمل لسكريات معينة، فتوجه إلى طبيبك، قبل أن تتناول هذا الدواء.

• يحتوي الدواء على مادة ملونة تدعى FD&C Yellow No. 6 (E 110) (Sunset yellow) التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة أو بطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحددها الطبيب فقط.

هذا الدواء ليس معادًا عادة للأطفال دون سن 12 عامًا.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

- يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.
- يجب تناول الدواء مع أو بعد وجبة الطعام.
- لا تتوقف معلومات بخصوص التسوق والمضغ. يُمنع شطر القرص نظرًا لعدم وجود خط شطر.
- من المحتمل أن تكون لأدوية معينة مثل ناكسين، علاقة مع ارتفاع صغير في خطورة حدوث نوبة قلبية (انتفاخ عضلة القلب) أو سكتة دماغية. تزداد هذه الخطورة عند تناول جرعة أعلى من تلك الاستعمالات لفترة طويلة. يُمنع تجاوز (تناول أكثر) الجرعة الموصى بها أو تجاوز فترة العلاج الموصى بها. استشر الطبيب إذا لم تكن متأكدًا.
- يجب الحرص على الشرب بصورة كافية خلال العلاج بـ ناكسين 500 ملغ. هذا الأمر هام جدًا خاصة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.
- خلال العلاج بـ ناكسين 500 ملغ، من المحتمل أن يطلب منك الطبيب زيارته من أجل الفحص فيما إذا كنت تتناول الجرعة الملائمة لك ولنقص وجود أعراض جانبية. هذا الأمر هام بالتالي للمرضى المسنين.

إذا نسيت من طريق الخطأ، جرعة أعلى، إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل

بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء

• إذا نسيت تناول جرعة، تجاوز الجرعة التي نسيتها وتناول الجرعة التالية كالمعتاد.

• يُمنع تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيتها.

• يُمنع تناول الأدوية في الظلام تخفف من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

• إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

