

أتيت 10 ملغ أقراص**أتيت 20 ملغ أقراص****أتيت 30 ملغ أقراص**

التركيب

كل قرص من أتيت 10 ملغ يحتوي على:
2.5 ملغ من كل واحد من المركبات التالية:

Dextroamphetamine Saccharate	ديكسترو أمفيتامين ساكارات
Amphetamine Aspartate Monohydrate	أمفيتامين أسيپاراتات مونوهيدرات
Dextroamphetamine Sulfate	ديكسترو أمفيتامين سولفات
Amphetamine Sulfate	أمفيتامين سولفات
كمية الأمفيتامين الإجمالية تعادل 6.3 ملغ.	

كل قرص من أتيت 20 ملغ يحتوي على:
5 ملغ من كل واحد من المركبات التالية:

Dextroamphetamine Saccharate	ديكسترو أمفيتامين ساكارات
Amphetamine Aspartate Monohydrate	أمفيتامين أسيپاراتات مونوهيدرات
Dextroamphetamine Sulfate	ديكسترو أمفيتامين سولفات
Amphetamine Sulfate	أمفيتامين سولفات
كمية الأمفيتامين الإجمالية تعادل 12.6 ملغ.	

كل قرص من أتيت 30 ملغ يحتوي على:
7.5 ملغ من كل واحد من المركبات التالية:

Dextroamphetamine Saccharate	ديكسترو أمفيتامين ساكارات
Amphetamine Aspartate Monohydrate	أمفيتامين أسيپاراتات مونوهيدرات
Dextroamphetamine Sulfate	ديكسترو أمفيتامين سولفات
Amphetamine Sulfate	أمفيتامين سولفات
كمية الأمفيتامين الإجمالية تعادل 18.8 ملغ.	

معلومات حول المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حاليهم الطبية مشابهة لحالتك.

يمكن أن يتم تناول الدواء من قبل الكبار ومن قبل الأطفال.

أيضاً وبناء على ذلك فإن المعلومات في هذه النشرة مخصصة أيضاً للأطفال الذين يتناولون هذا الدواء.

يحتوي الدواء على أمفيتامينات، التي من المحتمل إساءة إستعمالها. إن التناول لفترة زمنية طويلة قد يسبب التعلق.

إن إساءة إستعمال الأمفيتامينات قد يؤدي للموت المفاجئ وإلى أعراض جانبية قلبية شديدة.

1 لأي غرض مخصص الدواء؟

يحتوي الدواء على خليط من أملاح الأمفيتامينات التي تعتبر مواد منشطة للجهاز العصبي المركزي، ومخصص للإستعمال كالتالي:

- علاج إضطراب الإصقاء، الترکيز وفرط النشاط (= إضطراب في الإصقاء)، وباللغة الإنجليزية:

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder. يساعد الدواء على زيادة اليقظة وخفض عادة الإندرفاونية وفرط النشاط لدى المتعالجين الذين يعانون من إضطراب في الإصقاء. يجب إستعمال هذا الدواء ضمن برنامج تأهيلي لـ ADHD الذي يشمل إستشارة أو علاجات أخرى.

- علاج النوم الإنسيبي (مرض يتميز بتنوبات نوم خارجة عن السيطرة خلال اليوم).

الفصيلة العلاجية

خلط من أملاح الأمفيتامينات.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت تعاني من:

- مرض في القلب أو تكالس الشريانين
- فرط ضغط الدم من الدرجة المتوسطة أو الخطيرة
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- چلوكوما
- حالة قلق شديدة، توتر أو عدم هدوء
- سابقة لإدمان على الكحول أو على الأدوية
- إذا كنت تتناول دواء مضاد للإكتئاب من نوع مثبطات مونوأمين أوكيسيذار (MAOIs)، أو إذا تناولت دواء كهذا خلال الأسبوعين الأخيرين
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا علمت بوجود حساسية لـ أمفيتامينات، لأدوية أخرى منشطة أو لأحد مركبات الدواء الأخرى

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل بدء العلاج يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو إذا عانيت في الماضي من أي مشكلة طبية أو في حال وجود سابقة عائلية، بما في ذلك:

- مرض في القلب، عيب في الكلية، فرط ضغط الدم
 - مشاكل نفسية تشمل ذهان، هوس، مرض ثنائي القطب، إكتئاب، سابقة عائلية للإقدام على الإنتحار
 - خلاجات، متلازمة توريت
 - مشاكل في الكبد أو في الكلية
 - مشاكل في الغدة الدرقية
 - تشنجات أو نتائج غير سلية لفحص الموجات الدماغية (فحص التخطيط الكهربائي للدماغ EEG)
 - مشاكل في الدورة الدموية في أصابع اليدين والقدمين
- تحذيرات إضافية

على الطبيب دراسة إجراء فحص للأداء الوظيفي للقلب وذلك قبل بدء العلاج بالدواء.

على الطبيب دراسة إجراء فحوص منتظمة لضغط الدم ونبض القلب خلال فترة العلاج بالدواء.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت تتناول:

- أدوية مضادة للإكتئاب بما في ذلك أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكيسيذار (MAOIs)، انظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا كنت تعاني من"
- أدوية لعلاج فرط ضغط الدم
- أدوية مضادة لذوبان التشنج

● أدوية لخفيف الزكام أو أدوية مضادة للحساسية التي تحتوي على مزيجات الإحتقان

● أدوية لعلاج الحموضة المفرطة في المعدة

● أدوية ممीعة للدم

عليك معرفة الأدوية التي تتناولها أنت أو يتناولها طفلك. يجب

تحضير وحفظ قائمة الأدوية لعرضها على الصيدلي أو على

الطبيب إذا دعت الحاجة.

الحمل

عليك إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل، أو إذا كنت تخططين لحصول حمل.

الإرضاع

ينتقل الدواء إلى حليب الأم. يجب الإمتناع عن الإرضاع أثناء فترة إستعمال الدواء.

الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال لدى أطفال دون عمر 3 سنوات.

السيادة وإستعمال الماكولات

قد يضعف الدواء من القدرة على السيادة والقدرة على تشغيل ماكولات خطيرة.

إستعمال الدواء والطعام

بالممكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على 23 ملغ صوديوم في القرص، أي يعتبر خال من الصوديوم.

يحتوي هذا الدواء على سكروز. إذا قبل لك من قبل الطبيب لأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فتوجه إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء. كمية السكروز: أتيت 10 ملغ - حوالي 98 ملغ سكروز، أتيت 20 ملغ - حوالي 93 ملغ سكروز، أتيت 30 ملغ - حوالي 140 ملغ سكروز.

تحتوي أقراص أتيت 20 ملغ و- 30 ملغ على Yellow No. 6 Aluminium Lake لأن عراض تحسسية.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

عليك تناول الدواء كما وصف لك بالضبط. سوف يلام الطبيب المقدار الدوائي المناسب لك أو لطفلك بشكل فردي.

يفضل الإمتناع عن تناول الدواء متأخرًا في المساء بسبب إمكانية حدوث صعوبة في النوم.

بالإمكان شطر الأقراص في خط الشطر، لتناول نصف مقدار دوائي.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

فحوص ومتابعة

● من حين إلى آخر سوف يدرس الطبيب إمكانية إيقاف العلاج من أجل إجراء تقدير لإضطراب الإصقاء.

● يتوجب على الطبيب دراسة إجراء فحوص منتظمة للدم، القلب وضغط الدم خلال فترة العلاج بالدواء.

● بالنسبة للأطفال يجب قياس الوزن والطول.

سوف يدرس الطبيب إمكانية إيقاف العلاج في حال دلت النتائج على أي مشكلة.

إذا تناولت مقدارًا دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا يجوز تناول مقدارًا دوائياً مضاعفاً. تناول المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة مسبقة مع الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالي الصحية.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناولها.

فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أتيت قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدبر من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن لا تعاني أي منها.

الأعراض الجانبية التالية تُلْغِي عن حدوثها بعد إستعمال أدوية منشطة:**1- مشاكل تتعلق بالقلب**

● موت مفاجئ لدى مرضى يعانون من عيب أو خلل في الأداء الوظيفي للقلب

● حدث دماغي أو نوبة قلبية لدى الكبار

● ارتفاع في ضغط الدم ونظم القلب

عليك التوجه فوراً إلى الطبيب إذا شعرت أنت أو شعر طفلك بأعراض تعكس مشاكل في القلب خلال فترة إستعمال الدواء مثل آلام في الصدر، صعوبات في التنفس، أو إغماء.

2- مشاكل نفسية

عامة المرضي: الأطفال، الفتىان والكبار

- تطور إضطرابات سلوكية أو إضطرابات في التفكير أو تفاقم هذه الأعراض.

- تطور أو تفاقم مرض حالي ثانوي القطب.

- تطور أو تفاقم تصرف عدواني أو عدائي.

الأطفال والفتىان

- ظهور أعراض ذهانية (مثل سماع أصوات) أو هوس يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا شعرت أنت أو شعر طفلك بتفاقم أو بأعراض نفسية جديدة خلال فترة إستعمال الدواء، خاصة هلوسة أو شك.

3- مشاكل في جريان الدم في أصابع اليدين والقدمين (مرض

في الأوعية الدموية المحيطية، بما في ذلك متلازمة رينو)
إن إستعمال الدواء قد يؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية في أصابع اليدين والقدمين. هذه المشاكل يمكن أن تجلب بالشعور بتجمد، ببرودة أو بألم في الأصابع، أو بتغير في لون الأصابع من اللون الشاحب، إلى الأزرق، والأحمر. يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا تطورت هذه الأعراض أو إذا تطورت علامات لجروح مجهرولة السبب، التي تظهر في أصابع اليدين أو القدمين خلال فترة تناول الدواء.

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب فوراً إذا ظهرت علامات لفرط التحسس، مثل:
شري (رد فعل تحسسي في الجلد الذي يتجلب بطفح وحكة)، طفح.

أعراض جانبية أخرى

- تباطؤ في النمو (طول وزن) لدى الأطفال
- تشننجات، خاصة لدى مرضى عانوا منها في الماضي
- تغيرات في الرؤية أو تشوش في الرؤية
- متلازمة السيرروتونين - مشكلة التي قد تشكل خطراً على الحياة، تسمى متلازمة السيرروتونين، التي يمكن أن تحدث عندما يتم تناول أدوية مثل أنتينت مع أدوية معينة أخرى.
- أعراض متلازمة السيرروتونين يمكن أن تشمل:
- إهياج إنفعالي، هلوسة، سبات أو تغيرات أخرى في الحالة النفسية
- مشاكل في السيطرة على الحركات لديك أو تقلصات عضلية
- نبض سريع
- إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم
- تعرق أو سخونة
- غثيان أو تقيؤات
- إسهال
- تصลب أو توتر في العضلات

أعراض جانبية شائعة

• ألم في البطن

• إنخفاض الشهية للطعام

• عصبية

أعراض جانبية إضافية

أعراض قلبية: ضربات قلب، إعتلال عضلة القلب (مرض عضلة القلب).

الجهاز العصبي المركزي: أعراض ذهانية، فرط تهيج، قلة هدوء، عصبية، نشوة، إضطرابات حرارية، إنزعاج (مزاج يتجلب بعدم الرضا)، إكتئاب، رجفان، عدوانية، خلجان، غضب، الإكثار من الكلام (logorrhea)، إلحاق الضرر الذاتي بالجذ (dermatillomania).

العينين: توسيع حدة العين.

الجهاز الهضمي: جفاف الفم، طعم غير مستحب، إسهال، إمساك، إفقار (تضمر في تزويد الدم) من الأمعاء، قهق وفقدان الوزن. ردود فعل تحسسية: فرط الحساسية يشمل وذمة وعاشرة وتأققي، طفح شديد في الجلد يشمل متلازمة ستيفنس جونسون. جهاز الغدد الصماء: تغيرات في الشهوة الجنسية، عجز جنسي، إنتصاب متكرر أو مطول للقضيب التانسي.

الجلد: تساقط الشعر.

الجهاز العضلي الهيكلي: إحلال الربيبات (rhabdomyolysis).

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبیة

بإمكانك التبلیغ عن اعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبیة عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبیة، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصايتها بالتسنم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية والحماية من الضوء.

بإمكانك إستعمال الدواء حتى 90 يوماً من فتح القنفية للمرة الأولى، بما لا يتجاوز تاريخ إنقضاء الصلاحية.

لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو إلى القمامات. إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على: Compressible sugar, microcrystalline cellulose, corn starch, saccharin sodium, magnesium stearate and colloidal silicon dioxide.

أقراص 10 ملغ تحتوى أيضاً على FD&C Blue No. 1 Aluminium Lake

أقراص 20 ملغ و- 30 ملغ تحتوى أيضاً على FD&C Yellow No. 6 Aluminium Lake (sunset yellow FCF)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

أنتينت 10 ملغ:

قرص بيضوى لونه أزرق، في جانب واحد منه الطباعة "b" فوق "972" بين خطين أفقين. في الجانب الآخر الطباعة "0" و- "1" من جانبي خط الشطر [10] [1] بين خطين أفقين.

أنتينت 20 ملغ:

قرص بيضوى بلون الدراق، في جانب واحد منه الطباعة "b" فوق "974" بين خطين أفقين. في الجانب الآخر الطباعة "0" و- "3" من جانبي خط الشطر [20] [3] بين خطين أفقين.

أنتينت 30 ملغ:

قرص بيضوى بلون الدراق، في جانب واحد منه الطباعة "b" فوق "974" بين خطين أفقين. في الجانب الآخر الطباعة "0" و- "3" من جانبي خط الشطر [30] [3] بين خطين أفقين.

محتوى العبوة:

تحتوي كل قنفية بلاستيكية على 30 قرصاً ماص للرطوبة. لا يجوز بلع ماص الرطوبة ويجب تركه في القنفية حتى نهاية الإستعمال.

اسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه

تيقظ إسرائيل م.ض.

شارع دفورا هنفيه 124، تل أبيب 6944020.
تم إعداد هذه النشرة في شباط 2022، بموجب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

10 ملغ 154.13.34222

20 ملغ 154.14.34224

30 ملغ 154.15.34225

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.