

**עלון לצרכנית לפי תקנות הרחמים (תכשירים) התשמ"ו – 1986** התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

## דפו-פרובה TM 150 מ"ג/מ"ל תרחיף להזרקה

**מדרוקסיפרוגסטרון אצטאט 150 מ"ג/מ"ל medroxyprogesterone acetate 150 mg/ml**

מומרים בלתי פעילים ולארגניים: ראה סעיף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קריא בעלון את העלון עד סופו בטרם התחמשי בתרופה.**
היא עלולה להזיק להן גם אם נראה לך אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוק.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעבירי אותה לאחרות. היא עלולה להזיק להן גם אם נראה לך כי מצבן הרפואי דומה שלך.

יעילות התכשיר דפו-פרובה™ למניעת היריון מולטיבה בהתמתך לקבל זריקה של התכשיר אחת לשלוש שבועות.

### 1. למה להשתמש בתרופה?

● דפו-פרובה™ היא תרופה למניעת היריון, כאשר יש התוויה רפואית לכך ולא ניתן להשתמש באמצעי מניעה אוראליים (הנלקחים דרך הפה).

### קבועה תרפויטית: פרוגסטוגנים

נגזרת של פרוגסטרון – דפו-פרובה™ מכילה את החומר הפעיל מדרוקסיפרוגסטרון אצטאט, הדומה מבחינה כימית להורמון הטבעי פרוגסטרון. הפרוגסטרון מיוצר על־ידי השחלות במשך המחצית השנייה של מחזור הווסת. דפו-פרובה™ מונעת את הבשלת הביציות בשחלות, כתוצאה מכך נמנע מעבר הביצית השלמה אל הרחם ולכן לא מתאפשרת הפרייה ונמנע היריון. דפו-פרובה™ פועלת גם על־שינויים בדופן הרחם המקטינים את הסיכון לכניסה להריון ועל־הגדלת עובי הרירית בפתח הרחם המקשה על כניסת הזרע.

דפו-פרובה™ ניתנת בזריקה לתוך השריר **אחת ל-12 שבועות**.

### 2. לפני השימוש בתרופה

### אין להשתמש בתרופה אם:

x את רגישה (אלרגית) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
יש סיכון קטן לתגובה אלרגית חמורה לדפו-פרובה™, אשר תדרוש טיפול רפואי דחוף.

x הינך בהיריון או קיים חשש להיריון.

x חלתי או את חושבת שאת חולה בסרטן תלוי הורמונים בשד או באברי הרבייה.

x הינך סובלת מדימומים לא מוסברים מהרחם.

x הינך סובלת ממחלת כבד.

x את הינך קיבלת את המחזור החדשי.

### אזהרות מיוחדות להגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בדפו-פרובה™, ספרי לרופא אם את סובלת או שסבלת בעבר מאחד הממצבים הבאים:

● מיגרנות – אם את מפחחת מיגרנה, עלייך להיועץ ברופא לפני קבלת זריקות נוספות של דפו-פרובה™

● סוכרת או היסטוריה משפחתית של סוכרת
● כאב חמור או נפיחות של העוק (מעיד על אפשרות לקריש דם ברגל, אשר עלול להיקרא פלביטיס)

● הפרעות בקרישת הדם כגון פקקת בווריד עמוק (קריש דם ברגל), תסחיף ריאתי (קריש דם בריאה) או שבץ, מומלץ שלא תקבלי זריקות נוספות של דפו-פרובה™

● הפרעות בריאה במהלך השימוש בדפו-פרובה™, כגון אדנאן ראייה פתאומי חלקי או מלא או ראייה כפולה

● דיכאון או היסטוריה של דיכאון
● בעיות כבד או מחלת כבד
● בעיות בכליות או מחלת כליות
● היסטוריה של מחלת לב או הפרעות כולסטרוול, כולל היסטוריה משפחתית

● עברת לאחרונה שומה בעיית (Hydatidiform Mole), זנו של הריון לא תקין

● אסטמה
● אפילפסיה

● את משתמשת בתרופות מסוימות כגון: וילוקורובטיקואידיים במינון גבוה (סטרואידים), תרופות נגד אפילפסיה והורמונים של בלוטת התריס, ייתכן שהרופא ימליץ לך על אמצעי מניעה מתאים יותר עבורך.

### מחלות פסיכיאטריות

גשים מסוימות משתמשות באמצעים הורמונאליים למניעת היריון כולל דפו-פרובה™ דיווחו על דיכאון או מצב רוח דיכאוני. דיכאון יכול להיות רציני ויכול להוביל לעיתים למחשבות אבדוניות. אם את חווה שינויים במצב הרוח ותסמינים דיכאוניים, צרי קשר עם הרופא שלך לקבלת ייעוץ רפואי ונסיי בהקדם האפשרי.

### השפעה אפשרית על המחזור החדשי

דפו פרובה™ בדרך כלל תשפיע על אופי המחזור החדשי של האישה. לאחר הזריקה הראשונה סביר שהרימום שלך יהיה לא סדיר, ייתכן שהיה ארוך או שיהיה יוך הכמות. התופעה עלולה להימשך בחלק מהנשים ותחשבת לתקינה ואין מקום לדאגה. ל שליש מהנשים לא יהיה דימום כלל לאחר הזריקה הראשונה. לאחר 4 זריקות, רוב הנשים יבחינו כי המחזור החדשי פסק לחלוטין. אין הופעת הווסת אינה סיבה לדאגה.

אם את חווה דימום כבד מאוד או ממושך, יש להתייעץ עם הרופא. תופעה זו מתרחשת לעיתים רחוקות אך ניתנת לטיפול.

לאחר הפסקת דפו-פרובה™ המחזורים החדשיים שלך יחזרו לקדמותם תוך כמה חודשים.

### השפעה אפשרית על צפיפות העצם

דפו-פרובה™ פועלת על ידי הורדת רמות אסטרוגן והורמונים נוספים. אולם, רמות אסטרוגן מנכות יותר עלולות להביא לירידה בעובי העצם (ע"י הורדת צפיפות העצם). אצל נשים המשתמשות בדפו-פרובה™ בעלות נטייה לצפיפות עצם נמוכה יותר מאשר נשים באותו הגיל אשר מעולם לא השתמשו בה. ההשפעה של דפו-פרובה™ היא בשיאה בשנתיים-שלוש השנים הראשונות לשימוש. לאחר מכן ישנה התייצבות ברמת צפיפות העצם ונראה כי יש עלייה מסוימת בצפיפות העצם עם הפסקת השימוש בתרופה. עדיין לא ידוע האם שימוש בדפו-פרובה™ מעלה את הסיכון לאוסטיאופורוזיס (עצמות חלשות) ולשברים במשך החיים (לאחר גיל המעבר). להלן מובאים גורמי סיכון להפתחות אוסטיאופורוזיס במשך החיים. עלייך להיועץ ברופא לפני התחלת הטיפול. ייתכן שיש לשקול שימוש באמצעי מניעה אחר אם אחד מהגורמים הבאים רונוטי עבורך: שימוש כרוני באלכוהול או טבק, שימוש כרוני בתרופות המקטינות את צפיפות העצם כגון תרופות לטיפול באפילפסיה או סטרואידים, מידד מסת הגוף (BMI) נמוך או הפרעות אידלה (אנורקסיה או בולימיה), שבר טראומטי קודם אשר לא נגרם ע"י נפילה, נטייה משפחתית חזקה לאוסטיאופורוזיס.

### מחברות (על גיל 18)

בדרך כלל עצמות של מתבגרות גדלות במהירות ומתחזקות, ככל שמגיעים לבגרות במצב של עצמות חזקות יותר, כך גדלה ההגנה מפני אוסטיאופורוזיס בשלבים מאוחרים יותר של החיים. שימוש בדפו-פרובה™ עלול להביא לירידה בצפיפות העצם בתקופה חשובה זו בה הן מאוחרות לגדול, להעם השפעת התרופה חשובה במיוחד בקבוצת גיל זו. ישנה עלייה חזרה בחוק העצם כאשר מפסיקים את השימוש בדפו-פרובה™, אך לא ידוע אם מגיעים בסופו של דבר לאותן רמות של צפיפות עצם שהיו מושגות ללא שימוש כלל בדפו-פרובה™. **לפני השימוש בדפו-פרובה™ על מתבגרות**

**לדון עם הרופא בשאלה האם יתאים להן יותר**

**אמצעי מניעה אחר.**

בתקופת הטיפול עם דפו-פרובה™, מומלץ לבצע פעילות גופנית נושאת משקל באופן סדיר ולשמור על תזונה בריאה הכוללת כמות מספקת של סידן (למשל: מוצרי חלב) וויטמין D (למשל: משומן דגים).

### סיכון אפשרי לסרטן

מחקרים בנשים שהשתמשו בסוגים שונים של אמצעי מניעה הראו כי בנשים שהשתמשו בדפו-פרובה™ לא נצפתה עלייה בסיכון הכללי לפתח סרטן שחלה, סרטן הרחם, סרטן צוואר הרחם או סרטן הכבד.

### סיכון אפשרי לסרטן שד

סרטן השד הינו נדיר בנשים מתחת לגיל 40, גם אם הן משתמשות באמצעי מניעה הורמונאליים וגם אם לא. דפו-פרובה™ מעלה מעט את הסיכון לחלות בסרטן שד לעומת נשים שאף פעם לא השתמשו בה. אולם, כל עלייה בסיכון היא קטנה בהתייחס לסיכון הכללי לחלות בסרטן שד, במיוחד בנשים צעירות.

בנשים מבוגרות הסיכון לחלות בסרטן שד הינו גבוה יותר ולכן העלייה במספר המקרים עקב דפו-פרובה™ גדולה יותר בנשים מבוגרות מאשר בנשים צעירות.

לדוגמא:

בנערה בת 15 אשר משתמשת בדפו-פרובה™ למשך 5 שנים העלייה בסיכון לחלות בסרטן שד עד גיל 30 הינה זניחה.

אישה בת 25 אשר משתמשת בדפו-פרובה™ למשך 5 שנים מעלה את הסיכון שלה לחלות בסרטן שד עד גיל 44-מקרים ל-10,000 נשים (אשר לא השתמשו בדפו-פרובה™) ל-47 מקרים ל-10,000 נשים, זאת אומרת עלייה של 3 מקרים ל-10,000 נשים.

אישה בת 35 אשר משתמשת בדפו-פרובה™ למשך 5 שנים מעלה את הסיכון שלה לחלות בסרטן שד עד גיל 50 ל-160 מקרים ל-10,000 נשים (אשר לא השתמשו בדפו-פרובר™) ל-170 מקרים ל-10,000 נשים, זאת אומרת עלייה של 10 מקרים ל-10,000 נשים.

### סיכון אפשרי להיווצרות מורסה (מוגלה) באתר הזרקה

ישנו סיכון להיווצרות מורסה באתר הזרקה, כפי שקיים בכל מתן של זריקה הינחת לשריר. ייתכן שידרש טיפול רפואי או ניתוח.

### סיכון אפשרי לעלייה במשקל

חלק מהגשים עלו במשקל בזמן השימוש בדפו-רובה™. במחקרים נמצא כי במהלך השנתיים הראשונות בשימוש בדפו-פרובה™, הייתה עלייה במשקל של בין 2.3-3.6 ק"ג. נשים שהשלמו 4-6 שנות טיפול העלו בממוצע 4.7-7.5 ק"ג.

### בדיקת רירית צוואר הרחם

ייתכן כי תוצאות בדיקת רירית צוואר הרחם ובדיקות מעבדה נוספות יושפעו בזמן הטיפול בדפו-פרובה™, לכן חשוב שתיעדי את הרופא שלך על השימוש בתרופה.

### הגנה מפני זיהומים המועברים במגע מיני

דפו-פרובה™ אינה מגנה מפני בדיקות ביהום HIV-1 (אידס) ובזיהומים אחרים המועברים דרך מגע מיני.

קיום מין בטוח, כולל שימוש נכון ועקבי בקונדומים, מפחית הבדיקות ביהומים המועברים דרך מגע מיני במגע מיני. HIV כולל (אידס).

התייעצי עם הרופא, האחות או הרוקח לגבי הדרך להפחתת הסיכון בהידבקות בזיהומים המועברים דרך מגע מיני, כולל HIV.

### בדיקות ומעקב

ייתכן שהרופא שלך יישאל על מצבים רפואיים שלך ושל בני משפחתך, יבדוק את לחץ הדם שלך וישלול את האפשרות שהינך בהיריון. ייתכן שהיה צורך בבדיקות נוספות כגון: בדיקת שד, אך רק אם בבדיקות אלו נדרשת עבורך או אם יש לך חששות יוצאי דופן.

### תגובות בין-תרופתיות

**אם את לוקחת, לא לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח.**
במיוחד יש ליידע את הרופא אם את לוקחת:

אניגולוטניאמיד או תרופות אחרות לדילול הדם (נוגדי קרישה) מאחר שהן יכולות להשפיע על אופן פעולתה של דפו-פרובה™.

### היריון, הנקה ופוריות

היריון:

אין להשתמש בדפו-פרובה™ אם הינך בהיריון מאחר שתרופות המכילות הורמונים עלולות להשפיע על העובר המתפתח.

אם את חושבת שנוכסת להריון במהלך השימוש בדפו-פרובה™, ספרי לרופא מיד. הרופא יבדוק שאינך בהריון לפני מתן הזריקה הראשונה וכן, אם כל זריקה נוספת ניתנת באיחור של יותר מ-89 ימים (12 שבועות ו-5 ימים).

פוריות:

● רמת הפוריות הרגילה שלך אמורה לחזור כאשר תפוג השפעתה של הזריקה. זמן זה משתנה בשנים שונות, ואינו תלוי בתקופת השימוש בדפו-פרובה™.

● במחקרים נמצא כי מעל 80% מהנשים שניסו להרות התעברו תוך 15 חודשים ממועד מתן הזריקה האחרונה, אולם טווח הזמן נע בין 4 חודשים אחרי הזריקה האחרונה למעלה משנתיים.

● מספר נשים הרו כבר לאחר 14 שבועות ממועד הזריקה האחרונה.

*הנקה:*

דפו-פרובה™ אינה מונעת ייצור חלב בשד, כך שנשים מניקות יכולות להשתמש בה. אולם, עדיף כי בשבועות הראשונים לאחר הלידה, חלב האם לא יכיל שאריות של תרופות, כולל דפו-פרובה™.

אם הינך מניקה, ייתכן כי הרופא שלך ימליץ לך לחכות לפחות 6 שבועות לאחר הלידה לפני שתחילי להשתמש בדפו-פרובה™ כאמצעי מניעה.

● לא נצפו השפעות מזיקות בינוקות ובילדים שנחשפו לאחר דפו-פרובה™ בחלב אם.

### נהיגה ושימוש במכוונת

דפו-פרובה™ עלולה לגרום לכאבי ראש וסחרחורות, לכן עלייך להיות זהירה עד אשר תדע את תרופה זו שמפיעה על יכולתך לנהוג או להפעיל מכוונת. אם אינך בטוחה, היוועצי ברופא.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה דפו-פרובה™ מכילה מתיל פאראבן, פרופיל פארבאן ונתרן

מתיל פארבאן ופרופיל פארבאן יכולים לגרום לתגובות אלרגיות (ייתכן שמאוחזרות) ובאופן חריג גם לכיווץ בסימפונות.

התרופה מכילה נתרן בכמות קטנה מ-1 מילימול (23 מ"ג) לכל 150 מ"ג/מ"ל, היא בעיקרון "נטולת נתרן".

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

דפו-פרובה™ ניתנת בזריקה חד-פעמית של 1 מ"ל (150 מ"ג מדרוקסיפרוגסטרון אצטאט) לתוך שריר הזרוע העליונה או העכוז של 12 שבועות. על הנשים, המתחילות בשימוש בדפו-פרובה™ לראשונה, לקבל את זריקת התכשיר בטווח חמשת הימים הראשונים של המחזור החדשי או תוך 5 ימים לאחר הלידה אם הן לא מניקות.

אם התרופה ניתנת ליי ההוראות, את מוגנת מיידית מפני היריון ואין צורך להשתמש באמצעי מניעה נוסף.

דפו-פרובה™ פועלת בגופך כאמצעי מניעה במשך 12 שבועות. לאחר מתן הזריקה, לא ניתן לבטל השפעתה.

כבדי שדפו-פרובה™ תהיה אמצעי מניעה יעיל, **חובה** לתת אותה כל 12 שבועות. הקפידי לקבוע את לרופא כל 12 שבועות.

אם השימוש בדפו-פרובה™ הוא מיד לאחר לידה או הפסקת היריון, הסיכון לדימום ואיגילי כבד או ממושך עלול לעלות.

### אין לעבור על המנה המומלצת!

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה**, פני מיד לחדר מיון של בית חולים והביאי אריזת התרופה איתך.

### אם שכחת לסיול את התרופה

אם שכחת לקבל את הזריקה או שחלפו יותר מ-12 שבועות ממועד הזריקה הקודמת, יש סיכוי גדול יותר שתיכניס להריון. היוועצי ברופא לגבי המועד המתאים לקבלת הזריקה הבאה של דפו-פרובה™ ולגבי השימוש באמצעי מניעה אחר עד למועד הזרקה.

### מעבר מאמצעי אחר למניעת היריון

כאשר את מחליפה אמצעי מניעה אחר, הרופא שלך יזיקי לך את הזריקה הראשונה במועד המתאים בכדי לוודא שאינך בסיכון לכניסה להריון. אם את עוברת שימוש בגלולות, עלייך לקבל את הזריקה הראשונה של דפו-פרובה™ במהלך 7 הימים הראשונים שחלפו מנטילת הגלולה האחרונה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא.

### אין לסיטול תרופות בחושיך בדקי תהויות והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הרכיבי הפעיים אם הינך זקוקה להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועצי ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבלי מאף אחת מהן.

**יש לפנות מיד לרופא** אם את מבחינה באחת מתופעות הלוואי הבאות:

● תגובת רגישות יתר (אלרגיה), מתרחשת בשכיחות לא ידועה), התסמינים כוללים: פריחה עורית פתאומית, התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון, צצופים או קשיים בנשימה

● קריש דם בריאות (מתרחש לעיתים **נדירות** – מופיע בעד 1 מתוך 1,000 משתמשות)

- קוצר נשימה
- כאבי בחזה הקשורים לנשימה
- שיעול דמי

● קריש דם ברגל (מתרחש לעיתים **נדירות** – מופיע בעד 1 מתוך 1,000 משתמשות)

● פקקת בווריד עמוק (DVT) הינו מצב בו נוצר קריש דם באחד הוורידים העמוקים, בדרך כלל ברגל.

● תסמינים של **פקקת בווריד עמוק** כוללים:

● כאב, רגישות או נפיחות בשוק, בקרסול או בכף הרגל

● כאב או דלקת בוורידים ברגל

● קושי להטיל את מלאו משקל הגוף על הרגל הפגועה

● שינוי בצבע עור הרגל לסגול, או שהעור הופך לאדום וחם למגע

● צהבת (צהבת העור או הלבון שבעיניים)

נשים ששתמשות בדפו-פרובה™ נוטות לצפיפות עצם נמוכה יותר מאשר נשים באותו גיל בלוא השתמשו בתרופה. ההשפעה של התרופה גבוהה יותר בשנתיים-שלוש הראשונות של השימוש. לאחר מכן, ישנה התייצבות בצפיפות העצם ונראה כי ישנה החלמה מסוימת לאחר הפסקת השימוש בתרופה. לא ניתן לקבוע עדיין אם דפו-פרובה™ מעלה את הסיכון לאוסטיאופורוזיס (עצמות חלשות) ולשברים בגילאים מבוגרים יותר.

### תופעות לוואי נוספות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד:** מופיעות ביותר מ-1 מתוך 10 משתמשות

● עצבנות, כאב ראש, כאבי בטן או חוסר נוחות בבטן, שינויים במשקל הגוף.

**תופעות לוואי שכיחות:** מופיעות בעד 1 מתוך 10 משתמשות

● דיכאון, ירידה בליבידו (ירידה בתשוקה המינית), סחרחורות, בחילות, נפיחות, נשירת שיער, אקנה, כאב גב, הפרשות מהנקה, אגישות בשדיים, מחזור חודשי נאבא או חסר, זיהום בדרכי השתן, בצקת/אצירת נוזלים, חולשה, כאב בגפיים.

### תופעות לוואי שכיחות:

1 מתוך 100 משתמשות

עלייה או ירידה בתאבון, קשיי שינה, עוויתות (פרקוסים), ישנוניות, קצוץ, גלי חום, הפרעה בכבד, צמיחת שיער הפנים, נפידת או חרלת, גרד בעור, כתמים עמוימם זמניים, דימום או הכתמה ואגילניים לא צפויים או יוצאי דופן, הפרשת חלב מהשדיים או בזמן היריון או הנקה, כאב באגן, כאבים בזמן קיום יחסי מין, הפסקת הפרשת חלב בנשים מניקות.

**תופעות לוואי נדירות:** מופיעות בעד 1 מתוך 1,000 משתמשות

סרטן השד, ירידה בתאי דם אדומים, הפרעות בדם, קושי להגיע לאורגנמה, שינוי התנהגותי, שינוי במצב הרוח, עצבנות, חרדה, מיגרנה, שיתוק, עילפון, תחושת סחרחורת או סחרור, דופק מהיר, יתר לחץ דם, דליות בוורידים (ורידים בולטים), דימום מפי הטבעת, הפרעות בריכוך הפרעה באנזימי כבד, הצטברות שומן (במקום הזרקה), דלקת בעור, היווצרות רקמה צלקתית, סימני מתיחה, כאב במפרק, התכווציות שרירים, ירידה בצפיפות העצם (אוסטיאופורוזיס), כאב או דלקת בנרתיק, צעירה או הפסקה ממושכת של הווסת, כאב בחזה, דימום או דימום מוגבר מהרחם, וסות עם דימום כבד או ממושך מהרגל, יובש בנרתיק, שינוי בגודל השד, ציסטות בשחלה או בנרתיק, תסמונת קדם וסתיחי, עלייה בעובי רירית הרחם, גרישם בשדיים, דימום מהפטמה, עיכוב בביצין ומחזור חודשי ארוך, תחושת היריון, חום, יפיפות, כאבים או רגישות במקום הזרקה, גוש או גומה במקום הזרקה, תחושת צמא, צרידות, שיתוק בעצב בפנים, ירידה בסבילות לסוכרים, משטח צוואר רחם חריג, שינויים בצבע העור, הגדלת בלוטות הלימפה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר את סובלת מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

יש לאחסן מתחת ל-C°25.
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם אל ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**
Polyethylene glycol 3350, Sodium chloride, Polysorbate 80, Methyl paraben, Propyl paraben, Sodium hydroxide, Hydrochloric acid, Water for injection.

### כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

דפו-פרובה™ 150 מ"ג/מ"ל: מרק מוכן להזרקה של 1 מ"ל תרחיף לבן סטרילי.

**בעל הרישום וכתובתו:** פייוור פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ, רח' שנקר 9, הרצליה פיחוח 46725.