

ستيجلوجان 5/100 ملغ أقراص ستيجلوجان 15/100 ملغ أقراص قرص مطلي

كل ستيجلوجان 5/100 ملغ قرص مطلي يحتوي على:
5 ملغ إرتوجلوفوزين (على شكل إرتوجلوفوزين حمض البيروجلوتاميك L) و 100 ملغ سيتاجليبتين (على شكل سيتاجليبتين فوسفات مونوهيدرات).

5 mg ertugliflozin (as ertugliflozin L-pyroglutamic acid) and 100 mg sitagliptin (as sitagliptin phosphate monohydrate).

كل ستيجلوجان 15/100 ملغ قرص مطلي يحتوي على:
15 ملغ إرتوجلوفوزين (على شكل إرتوجلوفوزين حمض البيروجلوتاميك L) و 100 ملغ سيتاجليبتين (على شكل سيتاجليبتين فوسفات مونوهيدرات).

15 mg ertugliflozin (as ertugliflozin L-pyroglutamic acid) and 100 mg sitagliptin (as sitagliptin phosphate monohydrate).

لقائمة المواد غير الفعالة، انظر الفصل 6 "معلومات إضافية". انظر أيضا البند 2.9 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
- وُصِف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين، لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد ستيجلوجان؟

- ستيجلوجان معد للبالغين في سن 18 عاما فصاعدا والذين لديهم السكري من النوع 2 كعلاج إضافي للحمية الغذائية والنشاط الجسماني، لتحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم (glycemia):
- عندما لا يكفي ميتفورمين و/أو سلفونيل يوريا (SU) وأحد مركبات ستيجلوجان للسيطرة بشكل ملائم على مستوى السكر في الدم.
- لدى المرضى الذين يتلقون علاجاً مدمجاً بإرتوجلوفوزين وسيتاجليبتين في أقراص منفردة.

المجموعة العلاجية:

- ينتمي إرتوجلوفوزين إلى مجموعة أدوية تعرف بمثبطات الناقل المشترك للصوديوم-الجلوكوز-2 (SGLT2).
- ينتمي سيتاجليبتين إلى مجموعة أدوية تعرف بمثبطات DPP-4 (ثنائي الببتيديل بيبتيدياز-4).

كيف يعمل ستيجلوجان

- يعمل إرتوجلوفوزين على تثبيط بروتين SGLT2 في الكلى. وهكذا يؤدي إلى إفراز الجلوكوز في البول.
- يساعد سيتاجليبتين على زيادة مستويات الإنسولين التي تُنتج بعد تناول الطعام، ويقلل أيضاً كمية السكر التي ينتجها جسمك.

ما هو السكري من النوع 2؟

مرض السكري من النوع 2 هو حالة لا ينتج فيها جسمك كمية كافية من الإنسولين أو أنّ الإنسولين الذي ينتجه جسمك لا يعمل كما ينبغي. يمكن أن ينتج جسمك أيضاً الكثير من السكر. عندما يحدث هذا، يتراكم السكر (الجلوكوز) في الدم. هذا الأمر قد يؤدي إلى مشاكل طبية خطيرة، مثل مرض القلب، مرض الكلى، والعمى وخلل في تدفق الدم.

2. قبل استعمال ستيجلوجان

2.1 يمنع استعمال ستيجلوجان إذا:

كانت لديك حساسية (أرجية) لإرتوجلوفوزين أو لسيتاجليبتين أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (الواردة في الفصل 6).

2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال ستيجلوجان

قبل بدء العلاج بستيجلوجان، أخبر الطبيب إذا كنت:

- تعاني من مشاكل في الكلى.
- تعاني أو عانيت في الماضي من حالات عدوى فطرية في المهبل أو العضو الذكري.
- قد عانيت من مرض قلب حاد أو سكتة دماغية.
- تعاني أو عانيت في الماضي من مرض في البنكرياس (مثل التهاب البنكرياس).
- تعاني من السكري من النوع 1. يُمنع استعمال ستيجلوجان لعلاج هذه الحالة.
- تتناول أدوية أخرى لعلاج مرض السكري: هناك احتمال كبير لأن ينخفض مستوى السكر في دمك عند استخدام الدواء مع بعض الأدوية الأخرى.
- مُعرّضاً لخطر حدوث الجفاف (مثلاً: إذا كنت تتناول أدوية تزيد إنتاج البول [مدرات البول] أو أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع، أو إذا كان عمرك يزيد عن 65 عاماً). اسأل الطبيب عن طرق تجنّب حدوث الجفاف.
- تعاني أو سبق وعانيت من حصى في المرارة، الاعتماد على الكحول، أو مستويات عالية جداً من التريجليسيريدات (شكل من أشكال الدهون) في الدم. يمكن أن تزيد هذه الحالات الطبية فرصة إصابتك بالتهاب البنكرياس (انظر الفصل 4).
- تعاني من فقدان الوزن السريع، غثيان أو تقيؤ، ألم في البطن، عطش شديد، تنفس سريع وعميق، ارتباك، نعاس أو تعب بشكل شاذ، ظهور رائحة حلوة لنفسيك، طعم حلو أو معدني في فمك أو تغيّر رائحة بولك أو تعرّك، توجه إلى الطبيب أو إلى أقرب مستشفى فوراً. قد تكون هذه الأعراض علامة على حدوث "الحماض الكيتوني السكري" (diabetic ketoacidosis) – مشكلة يمكن أن تعاني منها تكون متعلقة بمرض السكري نتيجة زيادة مستويات "الأجسام الكيتونية" في البول أو الدم لديك، وتظهر في الفحوصات. قد يزداد خطر الإصابة بالحماض الكيتوني السكري مع الصيام المتواصل، الإفراط في استهلاك الكحول، الجفاف، التقليل المفاجئ لجرعة الإنسولين، أو مع الحاجة المتزايدة إلى كميات أعلى من الإنسولين بسبب الخضوع لعملية جراحية كبرى أو التعرّض لمرض خطير.

من المهم فحص راحتي قدميك بانتظام والتقيّد بأية نصيحة أخرى يعطيك إياها اختصاصي الرعاية الصحية بشأن العناية بكف القدم.

تم الإبلاغ عن حدوث حالات التهاب البنكرياس لدى بعض المرضى الذين عولجوا بسيتاچلپتين (انظر الفصل رقم 4).

تحدّث مع الطبيب فوراً في حال تطور لديك دمج من أعراض الألم، الحساسية للمس، الاحمرار أو التورم في الأعضاء التناسلية أو في المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج، مع حمّى أو الشعور بالإعياء عمومًا. قد تشير هذه الأعراض إلى وجود عدوى نادرة أو خطيرة لا بل مهدّدة للحياة، تدعى التهاب اللقافة الناخر في العجان (necrotizing fasciitis) أو غرغرينا فورنييه (Fournier's gangrene) التي تدمر الأنسجة تحت الجلد. يجب معالجة غرغرينا فورنييه فوراً.

يمكن أن يحدث انخفاض في نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم) عند تناول هذا الدواء بالدمج مع الإنسولين أو الأدوية التي تزيد إفراز الإنسولين من البنكرياس. قد يقلل طبيبك جرعة الإنسولين خاصتك أو أي دواء آخر تتناوله.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلّق باستعمال الدواء، استشير الطبيب الخاص بك أو الصيدلي.

سكّر البول

سيُظهر فحص البول لديك نتيجة إيجابية لوجود السكر (جلوجوز) أثناء تناولك لهذا الدواء، وذلك بسبب طريقة عمل ستيجلوجان.

2.3 الفحوصات والمتابعة

يطلب منك طبيبك إجراء فحوصات دم لفحص أداء كليتك قبل العلاج بستيجلوجان وخلالها.

افحص السكر في دمك، وفق إرشادات الطبيب.

يراقب طبيبك السكري لديك عبر إجراء فحوصات دم منتظمة، بما في ذلك فحص مستويات السكر في دمك والهيموغلوبين A1C لديك.

2.4 الأطفال والمراهقون

يُمنع إعطاء هذا الدواء للأولاد والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. من غير المعروف إذا كان هذا الدواء آمناً وناجعاً عند استعماله لدى الأولاد والمراهقين تحت عمر 18 عاماً.

2.5 التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

- أدوية تزيد إنتاج البول (مدرات البول).
 - أدوية أخرى تُقلل كمية السكر في دمك، مثل الإنسولين أو الأدوية التي تزيد إفراز الإنسولين من البنكرياس.
 - ديجوكسين (دواء يستخدم لعلاج وتيرة نظم القلب غير المنتظمة ومشاكل القلب الأخرى). قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص مستوى الديجوكسين في دمك إذا كنت تتناوله مع ستيجلوجان.
- إذا كان أيّ من الحالات المذكورة أعلاه ينطبق عليك (أو إذا لم تكن متأكداً)، أخبر طبيبك.

2.6 استعمال هذا الدواء والطعام
يمكن تناول القرص مع أو من دون طعام.

2.7 الحمل والإرضاع
إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل، أو تخططين للحمل، اسألي الطبيب الخاص بك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
ليس معروفًا فيما إذا كان **ستيجلوجان** قد يؤدي إلى ضرر لدى جنينك. عليك تجنب تناول هذا الدواء أثناء الحمل.

ليس معروفًا فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل إلى حليب الأم. تحدثي مع طبيبك حول الطريقة الأفضل لإطعام طفلك إذا كنت تتناولين **ستيجلوجان**. عليك تجنب تناول هذا الدواء إذا كنت مرضعة أو تخططين للرضاع.

2.8 السياقة واستعمال الماكينات
هذا الدواء لا يؤثر أو أنه يؤثر قليلاً في القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حدوث الدوخة والنعاس عند استخدام سيتاچلپتين، اللذين قد يؤثران في السياقة أو تشغيل الماكينات. يُمنع السياقة أو استعمال أية الآلات أو ماكينات إذا شعرت بالدوار أثناء تناول **ستيجلوجان**.

يمكن أن يؤدي تناول هذا الدواء بالدمج مع الإنسولين أو الأدوية التي تزيد إفراز الإنسولين من البنكرياس إلى انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص سكر الدم)، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الرجفان، التعرق أو تغييرات في الرؤية، وقد يؤثر في قدرتك على السياقة وتشغيل الماكينات.

2.9 معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء
يحتوي هذا المستحضر الطبي على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص، وهو يعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل ستيجلوجان؟
عليك استعمال **ستيجلوجان** دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها من **ستيجلوجان** هي قرص واحد في كل يوم.
تعتمد جرعة **ستيجلوجان** التي سيتم تناولها على حالتك وكمية إرتوجليفلوزين وسيتاچلپتين اللازمة للتحكم في مستوى السكر في دمك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

- عليك ابتلاع القرص كاملاً؛ إذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاع القرص، فيمكنك شطره، مضغه، كسره، أو سحقه للاستعمال الفوري.
- تناول قرصاً واحداً كل صباح. حاول أن تتناوله في نفس الساعة؛ سيساعدك ذلك على تذكر تناوله.
- يمكن تناول القرص مع أو من دون طعام.
- عليك الاستمرار في اتباع الحمية الغذائية التي تم وصفها لك، وبرنامج النشاط الجسماني أثناء تناول **ستيجلوجان**.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى مما يجب
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت أن تتناول ستيجلوجان
إذا نسيت تناول جرعة، تناولها فور تذكرك. ولكن، إذا كان الوقت قد حان لتناول جرعتك التالية، فتجاوز الجرعة التي نسيتها وعد إلى جدولك المعتاد لتناول الجرعة. لا تتناول جرعة مضاعفة (جرعتين في الوقت ذاته) تعويضاً عن الجرعة المنسية.
يجب المداومة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول ستيجلوجان
لا يجوز لك التوقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة طبيبك. قد تزداد مستويات السكر في دمك إذا توقفت عن تناول الدواء.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب ستيجلوجان أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تعاني من أيٍّ منها.

توقف عن تناول ستيجلوجان وتوجه إلى الطبيب فوراً، إذا لاحظت أحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

- ألم حاد ومستمر في منطقة البطن الذي قد يمتد إلى الظهر مع أو من دون غثيان وتقيؤات، لأن هذه العلامات يمكن أن تدل على التهاب البنكرياس (pancreatitis).
- رد فعل تحسسي خطير (وتيرة غير معروفة)، يشتمل على طفح جلدي، شرى، حويصلات على الجلد/تقشر الجلد وتورم الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة، الذي قد يُسبب صعوبة في التنفس أو الابتلاع. قد يصف لك الطبيب دواء لعلاج رد الفعل التحسسي ودواء آخر لعلاج السكري.

عليك التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى المستشفى القريب إذا عانيت من أحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية:

الحماض الكيتوني السكري (عرض جانبي نادر، قد يظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000)

تُمثل الأعراض التالية علامات الحماض الكيتوني السكري (انظر أيضاً الفصل "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال ستيجلوجان"):

- مستويات مرتفعة من "الأجسام الكيتونية" في البول أو الدم لديك
 - فقدان الوزن السريع
 - غثيان أو تقيؤ
 - ألم في البطن
 - عطش شديد
 - تنفس سريع وعميق
 - ارتباك
 - شعور بالتعب أو التعب الشاذ
 - رائحة حلوة لنفسيك، طعم حلو أو معدني في فمك، أو رائحة مختلفة لبولك أو لتعرقك
- قد يحدث هذا بغض النظر عن مستوى السكر في الدم. قد يقرر طبيبك إيقاف علاجك بـستيجلوجان بشكل مؤقت أو دائم.

التهاب اللقافة الناخر في العجان أو غرغرينا فورنييه (وتيرة غير معروفة، عرض لم يتم تحديده تواتره بعد)

عدوى خطيرة في الأنسجة الرخوة للأعضاء التناسلية أو المنطقة الواقعة بين الأعضاء التناسلية والشرج (انظر الأعراض في الفصل "تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال ستيجلوجان").

قصور عمل القلب. القصد من قصور عمل القلب هو أن قلبك غير قادر على ضخ الدم بشكل كاف.

قبل أن تبدأ بتناول ستيجلوجان، أخبر طبيبك إذا عانيت في الماضي من قصور في عمل القلب أو إذا كانت لديك مشاكل في الكلى. اتصل بطبيبك فوراً إذا تعرضت لأحد الأعراض التالية: ضيق متزايد في التنفس أو مشكلة في التنفس، لا سيما عندما تكون مستلقياً، تورم أو احتباس السوائل، لا سيما في راحتي القدمين، الكاحلين أو الساقين، ارتفاع سريع في الوزن تحديداً، وتعب شاذ. من المحتمل أن تكون هذه أعراض قصور عمل القلب.

ردود فعل جلدية (وتيرة غير معروفة)

قد يتطور لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تدعى مثبطات DPP-4 مثل سيتاچلپتين رد فعل جلدي يدعى شبيه الفقاع الفقاعي (bullous pemphigoid) الذي قد يتطلب علاجاً في المستشفى. أخبر طبيبك فوراً إذا تطورت لديك حويصلات أو جرح في الطبقة الجلدية الخارجية (تآكل). قد يوصي لك طبيبك بالتوقف عن تناول ستيجلوجان.

يجب التوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا اختبرت الأعراض الجانبية التالية:

التهاب في المجاري البولية (عرض جانبي شائع جداً، قد يظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10)

تشتمل أعراض التهاب المجاري البولية على ما يلي:

- شعور بالحرقنة أثناء التبول
 - بول يبدو عكراً
 - ألم في الحوض أو في منتصف الظهر (عندما تكون الكلى مصابة)
- بالرغم من كونه نادراً، إلا أنه إذا كان لديك سخونة أو يمكن مشاهدة وجود دم في البول، عليك تبليغ الطبيب فوراً.

الجفاف (فقدان كمية كبيرة من الماء من جسمك؛ عرض جانبي شائع، قد يظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100)

تشتمل أعراض الجفاف على ما يلي:

- جفاف الفم
- الشعور بالدوار، الدوخة، أو الضعف، خاصة عند الوقوف

• إغماء

أنت أكثر عرضة للإصابة بالجفاف إذا كنت:

- تعاني من مشاكل في الكلى
- تتناول الأدوية التي تزيد من إنتاج البول (مُدْرَات البول) أو تلك الخافضة لضغط الدم
- تبلغ 65 سنة من العمر وأكثر

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم؛ عرض جانبي شائع)

سيخبرك طبيبك عن كيفية علاج انخفاض سكر الدم وماذا عليك أن تفعل إذا كنت تعاني من أحد الأعراض أو العلامات أدناه. قد يقلل الطبيب جرعة الإنسولين الخاص بك أو أية أدوية أخرى للسكري.

قد تشمل علامات أو أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم على ما يلي:

- الصداع
- النعاس
- العصبية
- الجوع
- الدوخة
- الارتباك
- التعرق
- الشعور بالعصبية
- الضعف
- ضربات قلب سريعة

مشاكل في الكلى (وتيرة غير معروفة)

تتطلب غسيل الكلى أحياناً.

ألم في المفاصل (وتيرة غير معروفة)

قد يطور بعض الأشخاص الذين يتناولون أدوية تدعى مثبطات DPP-4 مثل سيتاچلپتين ألما في المفاصل قد يكون خطيراً. اتصل بطبيبك إذا كنت تشعر بألم حاد في المفاصل.

أعراض جانبية إضافية تشمل على:

- عدوى فطرية بالمهبل (القطار)

أعراض جانبية شائعة

- عدوى فطرية في العضو الذكري
- تغيرات في التبول، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى التبول المتكرر، بكميات أكبر، أو في الليل
- عطش
- حكة مهبلية
- قد تُظهر فحوصات الدم تغييرات في كمية اليوريا (urea) في دمك
- قد تُظهر فحوصات الدم تغييرات في كمية الكوليسترول الكلي وكمية الكوليسترول السيئ (يدعى LDL – نوع من الدهون في دمك)
- قد تُظهر فحوصات الدم تغييرات في كمية كريات الدم الحمراء في دمك (تدعى الهيموغلوبين)
- الإمساك
- الغازات
- تورم راحتي اليدين أو راحتي القدمين
- إنفلونزا
- الصداع
- عدوى في المسالك التنفسية العلوية
- احتقان الأنف أو زكام وألم في الحنجرة
- الفصال العظمي
- ألم في الذراعين أو الساقين
- الغثيان/التقيؤ

أعراض جانبية ليست شائعة (قد تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 1,000)

- قد تُظهر فحوصات الدم تغييرات متعلقة بوظائف الكلى (مثل "الكرياتينين")
- آلام في البطن
- إسهال
- نعاس
- جفاف الفم
- دوخة
- حكة

عرض جانبي نادر

- انخفاض عدد الصفائح الدموية

أعراض جانبية وتيرتها غير معروفة (أعراض لم تُحدد وتيرة انتشارها بعد)

- مشاكل في الكلى (تتطلب في بعض الأحيان غسيل الكلى)
- ألم في المفاصل
- ألم في العضلات
- ألم في الظهر
- مرض الرئة الخلالي
- شبيه الفُقاع الفُقاعي (نوع من الحويصلات الجلدية)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن إبلاغ وزارة الصحة بأعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية نتيجة العلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزّن ستيجلوجان؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من ذات الشهر.
- شروط التخزين:
 - يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 30°C. يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة.
 - يُمنع استعمال هذا الدواء إذا كانت العلبة متضررة أو إذا كانت عليها علامات تشير إلى أنها مفتوحة.
 - يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات المنزلية. استشر الصيدلي لمعرفة كيفية التخلص من الدواء. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي ستيجلوجان أيضًا على:

نواة القرص: microcrystalline cellulose (E460), calcium hydrogen phosphate (anhydrous), sodium stearyl fumarate (E487), croscarmellose sodium, magnesium stearate (E470b)
طلاء القرص: hypromellose (E464), hydroxypropyl cellulose (E463), titanium dioxide (E171), iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172), iron oxide black (E172), carnauba wax (E903)

كيف يبدو ستيجلوجان وماذا تحوي العبوة

- ستيجلوجان 5/100 ملغ أقراص هي أقراص لونها بيج، لوزيّة الشكل، مطبوع على أحد جانبيها الرقم "554" والجانب الآخر أملس.
- ستيجلوجان 15/100 ملغ أقراص هي أقراص لونها بُنيّ، لوزيّة الشكل، مطبوع على أحد جانبيها الرقم "555" والجانب الآخر أملس.

أحجام العبوات:

أحجام العبوات هي 14، 28، 30، 84، 90 و 98 قرصًا مُغلّفًا في لويحات (بليستر) خالية من الثقوب و 1 x 30 قرصًا مطليًا في لويحات ذات ثقوب.

قد لا يتمّ تسويق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه:
شركة ميرك شارپ ودوهم (إسرائيل - 1996) م.ض.، ص.ب. 7121 بيتاح تيكفا، 49170.

اسم المنتج وعنوانه: شركة ميرك شارپ ودوهم، نيوجرسي، الولايات المتحدة.

تم تحريرها في شباط 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ستيچلوجان 5/100 ملغ أقراص: 167-01-36006

ستيچلوجان 15/100 ملغ أقراص: 167-02-36036

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.