**Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986**

Препарат продается без рецепта врача

# Типтипот Симикол

**Капли для перорального применения**

Активный ингредиент и его концентрация:
Симетикон 20 мг/0,3 мл (66,67 мг/1 мл)
Simethicone 20 mg/0.3 ml (66.67 mg/1 ml)
Список содержащихся в препарате неактивных компонентов и аллергенов приведен в разделе 6 и в разделе «Важная информация о некоторых ингредиентах препарата».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед приёмом препарата.**
Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
Способ применения препарата изложен в пункте «Дозировка» данной инструкции.
Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) обострились или если не наблюдается улучшения.

## 1. Показания к применению:

Препарат предназначен для облегчения болей в животе, вызываемых скоплением газов у младенцев и маленьких детей.
**Терапевтическая группа:** Препараты для облегчения состояния при скоплении газов в пищеварительном тракте.

## 2. Перед применением препарата:

**☒ Не следует пользоваться препаратом, если:**

- Известно о чувствительности (аллергии) к действующему веществу или к любому из дополнительных компонентов, содержащихся в препарате (см. пункт 6).

**❗ Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**
**Если ребенок принимает, либо недавно принимал другие препараты, включая безрецептурные лекарства и пищевые добавки, следует сообщить об этом врачу или фармацевту.** Особенно если ребенок принимает:

- Левотироксин для лечения нарушений щитовидной железы. Типтипот Симикол может снизить количество усваиваемого Левотироксина и ослабить его эффект.

**❗ Беременность, грудное вскармливание и фертильность:**
Типтипот Симикол предназначен специально для детей. Если вы - взрослая женщина, и при этом используете препарат, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед началом лечения, если вы беременны, не исключаете, что беременны, планируете беременность, либо кормите грудью.
Не принимайте препарат во время беременности, кроме как по указанию врача.
**❗ Важная информация о некоторых из ингредиентов препарата:**
Препарат содержит 1,2 мг бензоата натрия на каждые 0,6 мл. Бензоат натрия может усугубить неонатальную желтуху (пожелтение кожи и глаз) у младенцев до 4-недельного возраста.
Препарат содержит менее 23 мг натрия в каждой дозе, и потому считается не содержащим натрия.

## 3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа приема препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Принятая дозировка:
0,3 мл (20 мг) перед каждым приемом пищи. При необходимости можно увеличить дозировку до 0,6 мл (40 мг).
Не следует превышать суточную дозу в 12 разовых доз по 0,3 мл, либо в 6 разовых доз по 0,6 мл (в общей сложности 240 мл в сутки).
В период лечения препаратом желательно проконсультироваться с врачом относительно выявления причины скопления газов.
**Не превышать рекомендуемую дозу.**
**Способ применения:**

1. Хорошо встряхнуть перед использованием.
2. Наполнить прилагающийся шприц до желаемого деления и накапать в рот.
3. После использования следует разобрать шприц и тщательно промыть обе его части теплой водой.

При использовании жидких препаратов следует применять шприц или пипетку, предназначенные для измерения нужного количества препарата. В случае если дозирующий инструмент к упаковке не прилагается, проконсультируйтесь с фармацевтом. Не следует использовать домашнюю чайную ложку для измерения количества препарата. Домашние чайные ложки имеют разные размеры, и есть вероятность получения неправильного количества препарата.
**При передозировке у ребенка,** либо если ребенок принял препарат по ошибке, необходимо срочно обратится к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата.
**Если вы забыли дать препарат** в предназначенное для этого время, не следует давать двойную дозу. Дайте следующую дозу в обычное время и проконсультируйтесь с врачом.
**Лекарства нельзя принимать в темноте! <u>При каждом</u> приёме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки. Если у вас есть дополнительные вопросы относительно использования препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.**

LFL 639 06/22

## 4. Побочные эффекты:

Как и при приеме любого другого препарата, использование Типтипот Симикол может привести к возникновению побочных эффектов у некоторых потребителей. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, ребенок не будет страдать ни одним из них.
Возможные побочные эффекты: тошнота, запор или аллергическая реакция, такая как кожная сыпь, кожный зуд, отек лица или языка, либо затрудненное дыхание.
**В случае появления или обострения какого-либо из побочных явлений, либо проявления иного, не указанного в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.**
<u>Извещение о побочных эффектах:</u>
Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на домашней странице веб-сайта министерства здравоохранения (www.health.gov.il), или по ссылке: https://sideeffects.health.gov.il/

## 5. Как хранить препарат?

Не допускайте отравления! Во избежание отравлений это лекарство, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.
Не используйте препарат после истечения срока годности (exp.) указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
Хранить при температуре ниже 25°C.
После первого вскрытия флакона можно использовать препарат Типтипот Симикол в течение двух месяцев.

## 6. Дополнительная информация:

Помимо активных ингредиентов, препарат содержит:
Polysorbate 80, Sorbitan Monostearate 60, Microcrystalline cellulose, Strawberry Flavour, Citric acid (anhydrous), Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Xanthan Gum, Saccharin sodium, Purified Water.
**Как выглядит препарат и содержимое упаковки?**
Стеклянная бутылка, содержащая 30 мл белой вязкой эмульсии со вкусом клубники.
**Производитель/владелец регистрационного удостоверения и его адрес:** CTS Chemical Industries Ltd., улица Акидма 3, Кирьят-Малахи.
Данная инструкция была отредактирована 06/2022 в соответствии с предписаниями Министерства здравоохранения.
Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 533826579
Для простоты и легкости чтения эта инструкция сформулирована в мужском роде. Тем не менее, данный препарат предназначен для представителей обоих полов.