

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية

(مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب



تييتيبوت سيميكل

قُطرات للبلع

المادة الفعالة وتركيزها:

سيميثيكون 20 ملغ/0.3 مل (66.67 ملغ/1 مل)
Simethicone 20 mg/0.3 ml (66.67 mg/1 ml)

المواد غير الفعالة ومسميات الأرجية في المستحضر - انظر البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمَت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لتخفيف آلام البطن لدى الأطفال الرضع والأولاد الصغار، الناجمة عن تراكم الغازات.

الفصيلة العلاجية: أدوية للتخفيف من الغازات في الجهاز الهضمي.

2. قبل استعمال الدواء:

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- غلم بوجود حساسية (أرجية) للمادة الفعالة أو لأي من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).

❗ التحذيرات بين الأدوية:

- إذا كان الولد يستعمل الآن، أو قد استعمل مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فاخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كان الولد يستعمل:
- ليفوثيروكسين لعلاج الاضطرابات في الغدة الدرقية. قد يقلل تييتيبوت سيميكل كمية ليفوثيروكسين التي يتم امتصاصها ويضعف من تأثيره.

❗ الحمل، الإرضاع والحساسية:

تييتيبوت سيميكل مخصص تحديداً للأولاد. إذا كنت بالغة وتستعملين الدواء، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، قد تكونين حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعاً.

لا يجوز استعمال المستحضر في فترة الحمل إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على 1.2 ملغ من بينزوات الصوديوم في كل 0.6 مل. قد يزيد بينزوات الصوديوم من حدة البرقان (اصفرار الجلد والعينين) لدى الأطفال الرضع حتى عمر 4 أسابيع.

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في كل جرعة ولذلك يعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الموصى بها عادة هي:

0.3 مل (20 ملغ) قبل كل وجبة طعام. يمكن رفع الجرعة الدوائية إلى 0.6 مل (40 ملغ) عند الحاجة.

يُمنع تجاوز 12 جرعة من 0.3 مل أو 6 جرعات من 0.6 مل (240 ملغ بالمجموع الكلي) خلال 24 ساعة.

من المفضل استشارة الطبيب خلال فترة العلاج بالدواء بهدف تشخيص المسبب لتراكم الغازات.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال:

1. خضه جيداً قبل الاستعمال.
2. املأ المحقنة المرفقة إلى المستوى المرغوب به واقطر به الفم.
3. بعد الاستعمال يجب فصل أذن المحقنة عن بعضها وشطف جزأي المحقنة جيداً بالماء الفاتر.

عند استعمال الأدوية السائلة، يجب عليك استعمال المحقنة أو القطارة المخصصة لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. إذا لم يتم إرفاق أداة قياس بالعبوة، فاستشر الصيدلي. لا يجوز استعمال المعلقة الصغيرة البيئية لقياس كمية الدواء. تختلف الملاعق الصغيرة البيئية من حيث حجمها وقد لا تحصل على كمية الدواء الصحيحة عند استعمالها.

إذا تناول الولد جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيتم إعطاء الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز إعطاء جرعة مضاعفة. أعط الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال تييتيبوت سيميكل إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تلاق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا يعاني الولد من أي واحد منها. الأعراض الجانبية المحتملة هي الغثيان، الإمساك أو رد الفعل التحسسي مثل الطفح الجلدي، الحكة الجلدية، انتفاخ الوجه أو اللسان أو الصعوبات في التنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق النسخ إلى الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il/

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد وأول الأطفال الرضع وعن مجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم. لا تسبب التقوى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C.

بعد فتح تييتيبوت سيميكل لأول مرة يمكن استعماله لمدة شهرين.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Polysorbate 80, Sorbitan Monostearate 60, Microcrystalline cellulose, Strawberry Flavour, Citric acid (anhydrous), Sodium Benzoate, Sodium Citrate, Xanthan Gum, Saccharin sodium, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قنبية زجاجية تحتوي على 30 ملل من المستحلب الأبيض واللزج بطعم الفراولة.


اسم المصنع/صاحب الامتياز وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيميائية مرض، شارع هيكما 3، كريات ملاحي.

تم تحرير هذه النشرة في 06/2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

533826579

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.



LFL 639 06/22