

# أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ كبسولات

تحتوي كل كبسولة على:

أزيتروميتسين (على شكل بيديهيرات) 250 ملغ

لقائمة الماء غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" وكذلك الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى تنهيها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه لآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم

الطبية مشابهة لحالتك.

## (1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

لعلاج التلوثات الناجمة عن جراثيم حساسة الدواء في الطرق التنفسية (التهاب القصبات الهوائية، التهاب الرئتين، التهاب الجيوب الأنفية، التهاب الحنجرة والتهاب اللوزتين)، الجلد والأنسجة الرخوة، الآذنين، والتلوثات في الأعضاء التناسلية الناجمة عن المتعدنة الحشرية (chlamydia trachomatis).

مضاد حيوي من فصيلة الماكروليدات.

## (2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- X كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة (أزيتروميتسين) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء التي تظهر في الفقرة 6
- X وجدت لديك ساقية لرد فعل تحسسي للمستحضر أو لإيزيتروميتسين أو لمضاد حيوي آخر من فصيلة الماكروليدات أو الكليوتيليات.
- X عانيت في الماضي من برقان نتيجة إنسداد تدفق الصفراء في الكبد (cholestatic jaundice) أو من خلل في الأداء الوظيفي للכבד الذي ظهر جراء إستعمال أزيتروميتسين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت:

- تعاني من التهاب في الرئتين.
- تعاني من مشاكل في الكبد مثل التليف الكيسي.
- تعاني من مرض الذي يؤدي إلى ضعف عضلي (الوهن العضلي الوبي).
- تعاني من مشاكل في أداء الكبد أو الكل.
- تعاني من نبض غير منتظم، خاصة من مشكلة تسمى "إطالة مقطع QT".
- تعاني من مشاكل طبية أخرى.
- في فترة الحمل أو مرحلة، تخطيطين لحصول حمل أو الإرضاع - أنظر فقرة "الحمل والإرضاع".

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً دوحة أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأعراض إذا كنت تتناول:

- ديجوكسين.
- مستحضرات مضادة للمحموضة الحاوية على الومنيوم أو مغذنيوم.
- مستحضرات مضادة للتثثر (مثل وارفارين) - يجب الخضوع لتابعة ومراقبة لمؤشرات التثثر.
- نيفيلافينافير (العلاج الإيدز) - لأن المشاركة قد ترفع من نسب الأزيتروميتسين في الدم.
- فيبينتوين.
- كولشيسين.

## استعمال الدواء والطعام

يجب التناول ساعة قبيل الطعام أو ساعتين بعد الطعام.

الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج وذلك إذا كنت في فترة الحمل أو تخطيطين لحصول حمل. لا يُعرف فيما إذا كان أزيتروميتسين سليح الضرب بجينيك. لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج وذلك إذا كنت في فترة الإرضاع أو تخطيطين للإرضاع. يُلغى بـ 250 ملغ ينتقل إلى حليب الأم. إستشيري الطبيب بخصوص الطريقة الأفضل لإطعام رضيع خالٍ فترة العلاج بـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوى الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في الكبسولة وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

## (3) كيفية إستعمال الدواء؟

دائماً يجب إستعمال المستحضر بموجب تعليمات الطبيب عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص القدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب تناول الكبسولة بشكلها الكامل. يُمنع فتح وبعثرة محتوى الكبسولة، لأن تأشير الإعطاء بهذه الطريقة لم يُفحض.

لا يجوز إعطاء كبسولات للأطفال يزنون أقل من 45 كلغ.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به!

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى واستشر الطبيب.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، فتناول مقداراً دوائياً حال تذكر بذلك. لكن إذا حان موعد المقدار الدوائي الخاص بك القائم، فيجب تقوية المقدار الدوائي المنسي وتناول المقدار الدوائي التالي كالمعتاد. لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدار دوائي مضاف عن المقدار الدوائي المنسي!

يجب المراقبة على العلاج بموجب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تقوية تناول مقدار دوائي من أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ أو التوقف عن تناول الدواء، حتى ولو بذلت شغف بشكل أقسى، إلى أن تصلح الداء التي تعاني فيها

من رد فعل حساسية خطير أو أن الطبيب أوصاك بالتوقف عن تناول الدواء (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية") إذا قوّت تناول مقدار دوائي آخر أو إذا استكملاً كافة العلاج

بـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ، فإن العلاج قد لا يُؤثر كما ينبغي، وسوف يكون من الصعب أكثر معالجة التلوث لديك. إن اتمام كافة العلاج يقلل من خطورة أن تُطُور الجراثيم مقاومة لـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ.

إذا طورت الجراثيم مقاومة لـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ، فإن أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ ومضادات حيوية أخرى قد لا تكون ناجحة في المستقبل.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع لافتات طبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

## (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تندفع من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز أن تتعانى أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب في حال حدوث:

• رد فعل حساسي خطير. قد تحدث ردود فعل حساسية بعد تناول مقدار دوائي واحد فقط. التي يحتويها أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ، حتى بعد تناول مقدار دوائي واحد فقط. توقف عن العلاج وتوجه حالاً إلى الطبيب إذا شعرت بواءد أو أكثر من الأعراض التالية:

- صعوبات في التنفس أو صعوبات في البصر.

- إنفاس في الشفتين، في اللسان أو في الوجه.

- تضيق في الحنجرة، بحة.

- نبض سريع.

- إغماء.

- طفح جدي (شرى).

- ظهور جيد لسوخة وإنفاس في الغدد الليمفاوية.

يجب التوقف عن إستعمال أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ مع ظهور العلامة الأولى لطفح جدي والتوجه حالاً إلى الطبيب. إن الطفح قد يكون علامة لرد فعل أكثر خطورة لـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ.

• ضرر كبدى (ضرر كبدى). توقف عن إستعمال الدواء وتوجه حالاً للطبيب في حال إصرار الجلد أو إصفرار بياض العينين، بول بلون داكن، عطان أو نقائط، ألم أو حساسية عند لمس البطن. سخونة، ضغف عام، حكة، إرهاق مفطر، قلة الشهية للطعام، تغيرات في لون البراز. قد تكون تلك علامات لرد فعل خطير لـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ (ضرر كبدى).

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب في حال حدوث:

• تغيرات طفيفة في ظنم القلب التي قد تتشكل خطراً على الحياة، تشمل توقف القلب (cardiac arrest)، إطالة قطع QT، توسراد دى بواتن.

ينبغي أى تسراد يتسارع (فقان)، إنزعاج في الصدر أو عدم انتظام النبض، توجه للطبيب حالاً إذا شعرت أنت أو طفلك بتضيق عصبي أو غير منتظم، دوار أو صعوب.

قد يسبب أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ مشكلة نادرة في القلب والتي تعرف بإطالة مقطع QT. قد تؤدي هذه الحالة إلى عدم سلامه النبض وقد تكون الخطورة أكبر.

الحدوث ذلك لدى المستعين، لدى متعالجين لديهم ساقية لاصفحة عائلية لإطالة مقطع QT، لدى متعالجين لديهم نسبة منخفضة من البوتاسيوم في الدم، لدى متعالجين يتناولون أدوية معينة للسيطرة على ظنم القلب (اضطرابات النظم).

• تفاقم الوهن العضلي الوبي (مرض يؤدي إلى ضعف عضلي).

قد تفاقم مصادمات حيوية مثل أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ أعراض الوهن العضلي الوبي، بما في ذلك ضعف عضلي ومشاكل في التنفس.

• إسهال مائي، إسهال مستمر أو دم في البراز. قد تقاسى من تقلسات وسخونة. قد تظهر تلك بعد انتهاءك من العلاج بـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ.

## الأعراض الجانبية شائعة:

الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لـ أزيتروميتسين إينوفمد 250 ملغ هي:

• براز لين أو إسهال

• عثان

• ألام في البطن

• تقيقات

• إلتهاب في المهبل

• ملطف

• عسر هضم

• صداع

## **أعراض جانبية إضافية:**

ألم في الصدر، ضربات قلب سريعة، نفحة، براز أسود، يرقان، التهاب في الكلم، تلوث فطري، دوار، فُيرتيغۇ، ميل للنوم، إرهاق، حكة، حساسية للضوء، إنفصال تحت الجلد، إمساك، قهم، التهاب الأمعاء الدقيقة، التهاب في المعدة، فقر دم، إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (leukocyte)، قلة هدوع، عصبية، أرق، سخونة، وذمة في الوجه، الشعور بوعكة عامة، ألم، سعال، التهاب الحنجرة، رشح، إكزيما، تعرق، التهاب في العين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## **(5) كيفية تخزين الدواء؟**

**تجنب التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادى إصابتهم بالتسنم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين في درجة حرارة دون 25 درجة مئوية في العلبة الأصلية.

## **(6) معلومات إضافية**

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Cellulose microcrystalline, maize starch, magnesium stearate, sodium laurylsulfate.

Hard gelatin capsule: gelatin, titanium dioxide, edible black color printing ink.

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:**

كبسولة ذات جسم وغطاء بلون أبيض قاتم. طبع على الجسم والغطاء "250" بلون أسود. الكبسولات معبأة ضمن لوحيات حيث تم تعبئتها ضمن علب كرتون.

يتوفر الدواء ضمن علبة، كما هو مفصل:

علب كرتون تحتوي على لوحيات/بليستر ذات 2، 4 أو 6 كبسولات. عدد اللوحات (بليستر) في كل علبة كرتون قد يتغير حسب حجم العلبة. يظهر على علبة الكرتون عدد الكبسولات في العلبة.

من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

**صاحب الإمتياز:** إينوفامد م.ض، ص.ب. 40500، إيفن يهودا.

**اسم المنتج:** جوبيلنت جينيركس، نويده، أوتار براديش، الهند.

تم إعدادها في آذار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

160 55 35154

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.