

# אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג כמוסות

לכמוסה מכלילה:

אזיתרומיצין (כדיהידראט) 250 מ"ג

Azithromycin (as dihydrate) 250 mg

רשימת חומרים בלתי פעילים באגרוניום בתכשיר ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וכן סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם גם אם ראה לך כי מצבם הרפואי דומה שלך.

## 1) למה מיועדת התרופה?

לטיפול בזיהומים הנגרמים על-ידי חיידקים הגרישים לתרופה בדרכי הנשימה (ברונכיטיס, דלקת ריאות, סינוסיטיס, דלקת גרון ודלקת שקדים), עור ורקמות רכות, אוזניים, זיהומים באיברי המין הנגרמים על-ידי מלמדיה טרכומטיס.

## קבוצה תרופית:

אנטיביוטיקה מסוג מקרולידים.

## 2) לפני השימוש בתרופה

### א) להשתמש בתרופה אם:

- X אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אזיתרומיצין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המופיעים בסעיף 6.
- X יש לך עבר של תגובה אלרגית לתכשיר או לאזיתרומיצין או לאנטיביוטיקה אחרת מקבוצת המקרולידים או הקטולידים.
- X סבלת בעבר מצהבת כתוצאה מחסימת רימת המרה בכבד (cholestatic jaundice) או מליקוי בתפקוד הכבד שהופיעו בעקבות שימוש באזיתרומיצין.

### אזהרות מיוחדות הנכבדות לשימוש בתרופה

- **אל להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך:**
  - סובל מדלקת ריאות.
  - סובל מסיסטיק פיברוזיס.
  - סובל או קיים חשד לזיהום חיידקי בדם.
  - סובל ממחלה שגורמת לחולשת שרירים (מיאסטניה גריס).
  - סובל מבעיות בתפקוד הכבד או הכליות.
  - סובל מדופק לא סדיר, בעיקר מבעיה שנקראת "הארכת מקט QT".
  - בהריון או מניקה, ומתכנת להיכנס להריון או להניק – ראי סעיף "הריון והנקה".

### אינטראקציות/תגובות בין תרופות

**אם אתה לוקח או לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר לרופא או לרוקח.** במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- דיגוקסין.
- תכשירים נוגדי חומצה המכילים אלומיניום או מגנזיום.
- תכשירים נוגדי קרישה (כגון וארפרין) – יש להיות במעקב אחרי מדדי קרישה.
- גלפניאברי (טיפול באייס) – מכיוון שהשילוב עלול להעלות את רמת האזיתרומיצין בדם.

פניטואין.

קולכיצין.

### שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול שעה לפני האוכל או שתיים אחרי האוכל.

### הריון והנקה

אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מתכנת להיכנס להריון. לא ידוע אם אזיתרומיצין זיק לעובר שלך.  
אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך מניקה או מתכנת להניק. דווח שאזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג עובר לחלב אם. היוועץ ברופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך במהלך הטיפול באזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בכמוסה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### 3) כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא! עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
המינון ואופן הטיפול ייקבעו על-ידי הרופא בלבד.  
יש ליטול את הכמוסה בשלמותה. אסור לפתוח ולפזר את תוכן הכמוסה. מכיוון שהשפעת המין קטנה זו לא נבדקה.  
אין לתת כמוסות לילדים השוקלים פחות מ-45 ק"ג.

### אין לעבור על המנה המומלצת!

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או בטעות בעל ילד מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר לטיפול בבית החולים והבא אריות התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד,** קח מנה מיד שכונכת. אך אם הגיע הזמן לנחה הבאה שלך, יש לדלג על המנה שנשכחה. יש להמשיך לטיפול כרגיל. בשום אופן אין ליטול מנה כפולה במקום המנה שנשכחה!

יש להמשיך לטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם יש לך סיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא. אין לדלג על נטילת מנה של אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג או להפסיק ליטול את התרופה, גם אם אתה מתחיל להרגיש יותר טוב, עד להשלמת הטיפול, למעט מקרים בהם הינך סובל מתגובה אלרגית חמורה או שרופאך הורה לך להפסיק ליטול את התרופה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

**אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג, הטיפול עלול שלא להשפיע כפי שצריך,** ויחיה קשה יותר לטפל בזיהום שלך. השלמת כל הטיפול תקטין את הסיכון שהחיידקים יפתחו עמידות לאזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג.

במידה והחיידקים יפתחו עמידות לאזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג, אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג ותרופות אנטיביוטיות אחרות עלולות לא להיות יעילות בעתיד.

**אין ליטול תרופה בתורית בדרך את התורית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4) תופעות לוואי

כמו בתרופה, השימוש באזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

### יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרה של:

- תגובה אלרגית חמורה. תגובות אלרגיות עלולות להתרחש לאחר נטילת אזיתרומיצין, החומר הפעיל באזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג, אפילו לאחר נטילת מנה אחת בלבד. הפסק את הטיפול ופנה לרופא מיד אם אתה מרגיש אחד או יותר מהתסמינים הבאים:
  - קשיי נשימה או קשיי בליעה.
  - נפיחות בשפתיים, בלשון או בפנים.
  - היצרות בגרון, צרידות.
  - דופק מהיר.
  - עילפון.
  - פריחה בעור (חרלת).
  - הופעה חדשה של חום ונפיחות בבלוטות לימפה.

יש להפסיק את השימוש באזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג עם הסימן הראשון לפריחה עורית ולפנות מיד לרופא. פריחה עלולה להיות סימן לתגובה חמורה יותר לאזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג.

- נזק כבד (פגיעה כבדית). הפסק את השימוש בתרופה ופנה מיד לרופא במקרה של הצהבה בעור או של לבון העיניים, שתן בצבע כהה, בחילות או הקאות, כאב או גרשות ולמגע בבטן, חום, חולשה, גירוד, עייפות יתר, תיאבון ירוד, שינויים בצבע הצואה. אלו יכולים להיות סימנים לתגובה חמורה לאזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג (פגיעה כבדית).

### יש לפנות מיד לרופא במקרה של:

- שינויים חמורים בקצב הלב אשר עלולים להיות מסכני חיים, הכוללים עצירת הלב (דום לב), הארכת מקט QT, טורסד דה פואנט – הפרעת קצב חדרית, הרגשה שהלב שלך דופק או מאיץ (פליטיציות), אי-נוחות בחה או דופק לא סדיר. פנה לרופא מיד אם אתה או ילדך מרגישים בדופק מהיר או לא סדיר, סחרור או חולשה.
- אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג עלול לגרום לבעיות לב נדירה הידועה כהארכת מקט QT. מצב זה עלול לגרום לדופק לא תקין ולחיות מסוכן מאוד. הסיכון לכך גבוה יותר בקרב קשישים, במטופלים עם היסטוריה משפחתית של הארכת מקט QT, במטופלים עם רמת אשלגן נמוכה בדם, במטופלים הנוטלים תרופות מסוימות לשליטה בקצב לב (נוגדי הפרעות קצב).
- החמרת מיאסטניה גריס (מחלה שגורמת לחולשת שרירים).
- אנטיביוטיקות כמו אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג עלולות להחמיר תסמינים של מיאסטניה גריס, כולל חולשת שרירים ובעיות נשימה.
- שלשול מיימי, שלשול מתמשך או דם בצואה. אתה עלול לחוות התכווצויות וחום. עלולים להופיע לאחר שסיימת את הטיפול באזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג.

### תופעות לוואי שכיחות:

תופעות הלוואי השכיחות ביותר של אזיתרומיצין אינובמד 250 מ"ג הן:

- צואה רכה או שלשול
- בחילות
- כאבי בטן
- הקאות
- דלקת בנרתיק
- פריחה
- קשיי עיכול
- כאבי ראש

### תופעות לוואי נוספות:

כאב בחזה, פגיעות לב מהירות, נפיחות, צואה שחורה, צהבת, דלקת בכליות, זיהום פטרייתי, סחרחורת, וריטגו, שינויות, עייפות, גרד, רגישות לאור, נפיחות תת-עורית, עצירות, אנורקסיה, דלקת של המעי הדק, דלקת קיבה, אנמיה, צלקת במספר תאי דם לבנים (ליוקיטיים), אי-שקט, עיבנות, נודי שינה, חום, בצקת בפנים, תחושת חולי כללית, כאב, שיעול, דלקת גרון, נזלת, אקומה, הזעה, דלקת בעין.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי מכללן הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5) איך לאחסן את התרופה?

**מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ולא תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.  
אל לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.  
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אחירתן של אותו חודש.

**יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C באריזה המקורית.**

### 6) מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Cellulose microcrystalline, maize starch, magnesium stearate, sodium laurylsulfate.

Hard gelatin capsule: gelatin, titanium dioxide, edible black color printing ink.

### יצרן נרואית התרופה ומה תוכן האריזה:

כמוסה עם גוף ומכסה בצבע לבן אטום. על הגוף והמכסה מוטבע בצבע שחור "250".  
הכמוסות ארוכות בבליסטרים אשר ארוזים בקופסאות קרטון.

התרופה מסופקת באריזה, כמפורט:

אריזות קרטון המכילות מגוון/בליסטרים עם 2, 4 או 6 כמוסות. מספר הבליסטרים בכל אריזת קרטון עשוי להשתנות לפי גודל האריזה. על אריזת הקרטון מופיע מספר הכמוסות באריזה.

ייתכן ולא כל גודלי האריזות מתוקים.

**בעל הרישום:** אינובמד בע"מ, 602, אבן יהודה 40500.

**שם היצרן:** ג'ובלינט ג'אנריקס, נידרה, אוטאר פרדש, הודו.

נערך במרץ 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 35154 55 160.  
שם הפטנט והלוקח הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

AZIT CAP PL SH 190422