

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

(תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

דובאטו טבליות מצופות

כל טבליה מכילה:

דולוטגראביר (כנתרן) 50 מ"ג

dolutegravir (as sodium) 50 mg

לאמיבודין 300 מ"ג

lamivudine 300 mg

Dov.PT v5A 27024



לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון זה העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

דובאטו משמשת לטיפול בזיהום של HIV-1 (נגיף הכשל החיסוני הניושי) במבוגרים ובמתבגרים מעל גיל 12 השוקלים לפחות 40 ק"ג, ללא עמידות ידועה או חשד לעמידות לתכשירים השייכים לקבוצת מעכבי אינטגראז או ללאמיבודין, ובעלי עומס נגיפי שאינו עולה על 500,000 יונקתים למ"ל.

קבוצה תרפויטית

דובאטו מכילה שני חומרים פעילים המשמשים לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV): דולוטגראביר ו-לאמיבודין. דולוטגראביר שייך לקבוצת תרופות אנטי-רטרוויראליות הנקראות *מעכבי אינטגראז (INIs)*, ולאמיבודין שייך לקבוצת תרופות אנטי-רטרוויראליות הנקראות *אנלוגים נוקלאוזידים מעכבי טרנסקריפטאז (NRTIs)*.

דובאטו אינה מרפאה זיהום של HIV; היא שומרת את כמות הנגיף בגופך ברמה נמוכה. הדבר עוזר לשמור את מספר תאי ה-CD4 בדםך. תאי CD4 הם סוג של תאי דם לבנים שהינם חשובים בסיוע לגופך להילחם בזיהום.

לא כל אחד מגיב לטיפול בדובאטו באותו אופן. הרופא שלך ינטר את יעילות הטיפול שלך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה **אלרגי** (רגיש) לדולוטגראביר או ללאמיבודין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

- אתה לוקח תרופה בשם **פמפרידין (fampridine)**, המשמשת לטיפול בטרטת נפוצה.

←**ספר לרופא** אם אתה חושב שאחד מאלה חל עליך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

חלק מהאנשים שלוקחים דובאטו או טיפולים משולבים אחרים ל-HIV נמצאים בסיכון גבוה יותר מאחרים לפתח תופעות לוואי חמורות. עליך להיות מודע לסיכונים הנוספים:

- אם יש לך מחלת כבד מתונה או חמורה
- אם היתה לך אי פעם מחלת כבד, כולל דלקת כבד מסוג B או C (אם יש לך דלקת כבד מסוג B, אל תפסיק להשתמש בדובאטו מבלי להיוועץ ברופא שלך, כיוון שדלקת הכבד שלך עלולה לחזור)
- אם יש לך בעיה כליתית

←**דבר עם הרופא שלך לפני השימוש בדובאטו** אם אחד מאלה חל עליך. ייתכן שתצטרך בדיקות נוספות, כולל בדיקות דם, בזמן שאתה לוקח את התרופה שלך. ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי" למידע נוסף.

תגובות אלרגיות

דובאטו מכילה דולוטגראביר. דולוטגראביר יכול לגרום לתגובה אלרגית חמורה הידועה כ**תגובת רגישות יתר**. עליך לדעת על סימנים חשופים שיש להיזהר מפניהם בזמן שאתה נוטל דובאטו.

←**קרא את המידע** "תגובות אלרגיות" בסעיף 4 של עלון זה.

שים לב לתסמינים חשובים

חלק מהאנשים שלוקחים תרופות לזיהום של HIV מפתחים מצבים אחרים, שיכולים להיות חמורים. אלה כוללים:

- תסמינים של זיהומים ודלקת כאבים במפרקים, נוקשות ובעיות בעצמות
 - עליך לדעת על סימנים ותסמינים חשובים שיש להיזהר מפניהם בזמן שאתה נוטל דובאטו.
- ←**קרא את המידע** "תופעות לוואי אפשריות נוספות" בסעיף 4 של עלון זה.

הגן על אנשים אחרים

זיהום של HIV מתפשט במגע מיני עם אדם הנושא את הזיהום או בהעברה של דם מזוהם (לדוגמה, על ידי הזיהום מחטים להזרקה). אתה עדיין יכול להעביר HIV בעת טטילת תרופה זו, אם כי הסיכון יורד עם טיפול אנטי-רטרוויראלי יעיל. שוחח עם הרופא שלך על האמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע הדבקת אנשים אחרים.

ילדים

תרופה זו לא מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 12 שנים, משום שלא נחקרה במטופלים אלה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או אם אתה מתכנן לקחת תרופות אחרות כלשהן כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אל תקח דובאטו עם התרופה הבאה:

- פמפרידין (fampridine), המשמשת לטיפול בטרטת נפוצה.

תרופות מסוימות עשויות להשפיע על אופן פעילותה של דובאטו, או להעלות את הסבירות שתחווה תופעות לוואי. דובאטו יכולה גם להשפיע על אופן פעילותן של תרופות אחרות.

ספר לרופא שלך אם אתה לוקח אחת מהתרופות ברשימה הבאה:

• מטפורמין, לטיפול בסוכרת

תרופות ומכונות נוגדי חומצה, לטיפול בקשיי עיכול וצרכות. **אם אתה נוגד חומצה** במהלך 6 השעות לפני שאתה לוקח דובאטו, או לפחות שעתיים אחרי שלקחת אותה

• תוספי תזונה או מולטי-ויטמינים המכילים סידן, ברזל או מגנזיום. **אם אתה נוטל דובאטו עם אוכל**, אתה יכול ליטול תוספי תזונה או מולטי-ויטמינים המכילים סידן, ברזל או מגנזיום בו זמנית עם דובאטו. **אם אתה לא נוטל דובאטו עם אוכל, אל תקח תוסף תזונה או מולטי-ויטמין המכיל סידן, ברזל או מגנזיום** במהלך 6 השעות לפני שאתה נוטל דובאטו, או לפחות שעתיים אחרי שנטלת אותה

- אמטריציטאבין, אטראבירן, אפאבירנה, בביראפין או טיפרנאביר/רטרונאביר, לטיפול בזיהום של HIV

- תרופות (לרוב נוזליות) שמכילות סורביטול וסוכרים כוהליים אחרים (כגון: קסיליטול, מניטול, לקטיטול או מלטיטול), אם נלקחות באופן קבוע

- קלדרביין, המשמשת לטיפול ב**לוקמיה או בטרטת נפוצה**

- ריפאמפיצין, לטיפול בשחפת (TB) **וזיהומים חיידקיים** אחרים

- פניטידין ופנובארביטאל, לטיפול ב**אפילפסיה**

- אוקסקארבאזפין וקארבאמאזפין, לטיפול ב**אפילפסיה או בהפרעה דו קוטבית**

- St. John's wort** (*היפויקום פרפורטום*), תרופה שמחית לטיפול ב**דיכאון**.

←**ספר לרופא שלך לרוקח** אם אתה לוקח אחת מהתרופות האלו. הרופא שלך עשוי להחליט להתאים לך את המנה שלך או להחליט שאתה זקוק לבדיקות נוספות.

הריון והנקה

הריון

אם את בהריון, חושבת שיתכן ואת בהריון, או אם את מתכננת הריון:

←**התייעצי עם הרופא שלך** בנוגע לסיכונים והיתרונות שניתלת בדובאטו.

גבלות דובאטו בזמן הכניסה להריון או במהלך 6 השבועות הראשונים של ההריון עלולה להעלות את הסיכון למום מולד הנקרא מום של הזינור העצבי (neural tube defect) כגון שדרה שסועה – spina bifida (חוט שדרה פגום).

במידה והינך יכולה להכנס להריון בזמן נטילת דובאטו:

←**דברי עם הרופא שלך** דוניי איתו על הצורך בשימוש באמצעי מניעה, כגון קונדום או גלולות.

יש לייצע את הרופא באופן מיידי אם נכנסת להריון או אם את מתכננת להרות. הרופא שלך יבדוק את הטיפול שלך. אין להפסיק את נטילת דובאטו מבלי התייעץ עם הרופא שלך, משום שזה עלול לפגוע בך ובעוברך.

הנקה

לנשים שהן נשאיות HIV אסור להניק מכיוון שזיהום של HIV עלול לעבור אל התינוק דרך חלב אם.

לעבור קטנה עם המרכיבים של דובאטו יכולה גם היא לנכות לחלב האם שלך.

אם את מניקה, או חושבת להניק:

←**פני לרופא שלך מיידי**.

נהיגה ושימוש במכוונות

דובאטו עלולה לגרום לך לסחרחורת ולתופעות לוואי אחרות הגורמות לך להיות פחות ערני.

←אין לנהוג או להפעיל מכונות מלא אם אתה בטוח שאינך לא משפיע.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, לכן ניתן לומר כי היא למעשה נוטלת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראת הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- המינון המקובל הוא **טבליה אחת** של דובאטו פעם ביום.

יש לבלוע את הטבליה עם מעט נוזל. ניתן לקחת דובאטו עם או ללא אוכל.

אין מידע לגבי כתישה/חצייה/לעיסה.

שימוש במתבגרים

מתבגרים בגיליים 12 עד 17 השוקלים לפחות טבליה אחת 40 ק"ג יכולים לקחת את מנת המבוגרים של טבליה אחת פעם ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם לקחת יותר מדי טבליות של דובאטו, **פנה לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ**. אם אפשרי הראה להם את אריזת דובאטו.

אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיידי לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו

אם החמצת מנה, קח אותה ברגע שאתה נזכר. אבל אם המנה הבאה שלחץ צריכת את הליקוח תוך 4 שעות, אל על המנה שהחמצת וכך את המנה הבאה בזמן הרגיל. לאחר מכן המשך בטיפול שלך כרגיל.

←**אל תקח מנה כפולה** כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין להפסיק לקחת דובאטו ללא התייעצות עם הרופא שלך

קח דובאטו כל עוד הרופא שלך ממליץ לך. אל תפסיק לקחת דובאטו אם אתה חושב שאתה יכולה להפסיק את הטיפול עתיד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדובאטו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. **חשוב מאוד לשוחח עם הרופא שלך אודות שינויים כלשהם במצבך הבריאותי**.

תגובות אלרגיות

דובאטו מכילה דולוטגראביר. דולוטגראביר יכול לגרום לתגובה אלרגית חמורה הידועה כ**תגובת רגישות יתר**. זוהי תגובה שאינה שכיחה באנשים הנוטלים דולוטגראביר (עשויה להופיע ב-עד 1 מתוך 100 אנשים).

במידה ואתה מפתח אחד מהתסמינים הבאים:

- פריחה עורית
- חום

- חוסר אנרגיה (עייפות)

- נפיחות, לפעמים של הפנים או הפה (*אנגיואדמה*), הגורמת לקושי בנשימה

- כאבי שרירים או מפרקים.

←**פנה מיידי לרופא**. הרופא שלך עשוי להחליט לבצע בדיקות על מנת לבדוק את הכבד, הכליות או הדם שלך, ועשוי להורות לך להפסיק לקחת דובאטו.

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אלה עלולות להופיע **ביותר מ-1 מכל 10 אנשים:**

- כאב ראש

- שלשול

- בחילה.

תופעות לוואי שכיחות

אלה עלולות להופיע ב-**עד 1 מכל 10 אנשים:**

- דיכאון (רגשות של עצב עמוק וחוסר ערך עצמי)
- פריחה

- גרד (*pruritus*)

- הקאה

- כאב בטן או אי-נוחות בבטן

- גזים (*נפיחות*)

- סחרחורת

- נמנום

- נדודי שינה (*אינסומניה*)

- חלומות חריגים

- חוסר אנרגיה (*עייפות*)

- גשירת שיער

- חרדה

- כאב מפרקים

- כאב שרירים.

תופעות לוואי שכיחות העשויות להופיע בבדיקות דם:

- עלייה ברמת אנזימי הכבד (*aminotransferases*)

- עלייה ברמת האנזימים (בעיקר במטופלים אשר הים *creatinine phosphokinase*).

תופעות לוואי לא שכיחות

אלה עלולות להופיע ב-**עד 1 מכל 100 אנשים:**

- דלקת של הכבד (*הפטטיס*)

- ניסיון התאבדות (בעיקר במטופלים אשר היה להם בעבר דיכאון או בעיות בבריאות הנפש)

- חשבוניות אובדניות (בעיקר במטופלים אשר היה להם בעבר דיכאון או בעיות בבריאות הנפש)

- התקף חרדה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות העשויות להופיע בבדיקות דם:

- ירידה במספר התאים המעורבים בקרישת דם (*תרומבציטופניה*)

- ספירה נמוכה של תאי דם אדומים (*אנמיה*) או ספירה נמוכה של תאי דם לבנים (*נויטרופניה*).

תופעות לוואי נדירות

אלה עשויות להופיע ב-**עד 1 מכל 1,000 אנשים:**

- כשל כבדי (סימנים עלולים לכלול הצהבת העור ולובן העיניים או שתן כהה מן הרגיל)

- נפיחות, לפעמים של הפנים או הפה (*אנגיואדמה*), הגורמת לקשיים בנשימה

- דלקת בלבלב (*פנקארטיטיס*)

- פירוק רקמת שריר

- התאבדות (במיוחד אצל מטופלים שסבלו מדיכאון או בעיות נפשיות בעבר).

←**ספר לרופא שלך מיידי** אם אתה חווה בעיות נפשיות כלשהן (ראה גם בעיות נפשיות אחרות לעיל).

תופעות לוואי נדירות העשויות להופיע בבדיקות דם:

- עלייה בבילירובין (בדיקת תפקודי כבד)

- עלייה ברמת אנזים הנקרא *עמילא*.

תופעות לוואי נדירות מאוד

אלה עשויות להופיע ב-**עד 1 מכל 10,000 אנשים:**

- חמצת לקטית (עודף חומצה לקטית בדם)

- חוסר תחושה, תחושות עקצוץ בעור (כמו "סיכות ומחטים")

- הרגשה של חולשה בגפיים.

תופעת לוואי נדירה מאוד שיכולה להופיע בבדיקות דם:

- כשל מח העצם לייצר תאי דם אדומים חדשים (*pure red cell aplasia*).

תופעות לוואי אפשריות נוספות

אנשים הנוטלים טיפול משולב ל-HIV עלולים לסבול מתופעות לוואי אחרות.

תסמינים של זיהום ודלקת

אנשים עם זיהום מתקדם של HIV או איידס הינם בעלי מערכת חיסונית חלשה, ויש סבירות גדולה יותר שיתפתחו זיהומים חמורים (*זיהומים אופורטוניסטים*). יתכן וזיהומים מסוג זה היו "רדומים" ולא זוהו על ידי המערכת החיסונית החלשה לפני שהטיפול התחיל. לאחר התחלת הטיפול, המערכת החיסונית מתחזקת, ועשויה לתקוף את הזיהומים, מה שיכול לגרום לתסמינים של זיהום או דלקת. התסמינים בדרך כלל כוללים חום, בתוספת חלק מהבאים:

- כאב ראש

- כאב בטן

- קשיי נשימה.

במקרי נדירים, כאשר המערכת החיסונית מתחזקת, היא יכולה גם לתקוף רקמת גוף בריאה (*הפרעות אוטואימוניות*). התסמינים של הפרעות אוטואימוניות עלולים להתפתח חודשים רבים לאחר שהתחלת לקחת תרופה לטיפול בזיהום ה-HIV שלך. התסמינים עשויים לכלול:

- דפיקות לב (דופק לב מהיר או בלתי סדיר) או רעד

- פעילות יתר (חוסר מנוחה ותנועה מוגזמים)

- חולשה מתחילה בידיים ובכפות הרגליים ומתקדמת מעלה כלפי מרכז הגוף.

אם אתה מפתח תסמינים כלשהם של זיהום או אם אתה מבחין בכל אחד מהתסמינים לעיל:

←**נפר מיידי לרופא שלך**. אל תקח תרופות אחרות וגד הזיהום ללא ייעוץ מהרופא שלך.

כאבי מפרקים, נוקשות ובעיות בעצמות

חלק מהאנשים שלוקחים טיפול משולב ל-HIV מפתחים מצב הנקרא *אוסטאונקרוזיס* (נמק העצם).
עקב זה, חלקים מרקמתי העצם נפגעים לצמיתות במצב הירידה באספקת הדם לעצם. אנשים עשויים להיות בסבירות גבוהה יותר לפתח מצב זה:

- אם הם לוקחים טיפול משולב במשך זמן רב

- אם הם לוקחים גם תרופות נוגדות דלקת הנקראות קורטיקוסטרואידים

- אם הם שותים אלכוהול

- אם המערכת החיסונית שלהם חלשה מאוד