

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

דולוקסטין סנדוז®

30 מ"ג ג'י.א.ר.סי

כמוסות עמידות בחומציות הקיבה

חומר פעיל:

דולוקסטין (כהידרוכלוריד) 30 מ"ג duloxetine (as hydrochloride)

דולוקסטין סנדוז®

60 מ"ג ג'י.א.ר.סי

כמוסות עמידות בחומציות הקיבה

חומר פעיל:

דולוקסטין (כהידרוכלוריד) 60 מ"ג duloxetine (as hydrochloride)

חומרים בלתי פעילים ואולרגניים בתכשיר: ראה טעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על

התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נרשמה לטיפול בפתחלת, אך תעביר אותה לאחרים. עלוליה להזיק להם אפילו

אם נראה כי כן מחלתם דומה.

תרופות נגדדות דיכאון וחרדה מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים בני 24.

עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים

הנהגותיים כגון החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה.

אם חלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.

1. למה מיועדת התרופה?

דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי משמשת לטיפול במבוגרים הסובלים מ:

- מופעים של דיכאון מאז'ורי
- כאב נירופתי הקשור לניורופתיה סוכרתית הקיפית
- הפרעת חרדתית בעלת 6 פרק 6 "מידע נוסף" (generalized anxiety disorder, GAD)

פיברומיאלגיה

כאב כרוני של שריר השלד כאשר לא ניתן לתת טיפול אחר או שטיפול קודם נכשל.
ההווה זו

מבוססת על מחקרים בחולים עם כאב כרוני של הגב התחתון (CLBP) וכאב כרוני כתוצאה

מאוסטוארתרוטיס.

קבוצה תרפויטית: דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי הינה ממשפת חרדת תרופה ה-SNRI וגורמת לעלייה

של רמות הserotonin (הנוראדרנלין (noradrenaline).

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- הינך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").
- הינך סובל ממחלת כבד.
- הינך סובל ממחלת לב-לתי קשה.
- הינך נוטל או נטלת ב-14 הימים האחרונים תרופה אחרת שידועה כמעכבת מונואמין אואוקסידיאז (MAOI – Monoamine Oxidase Inhibitor), כולל מתילן בלו תוך-ורידית והאנטיביוטיקה ליחולדי; אין להתחיל טיפול בתרופות מסוג מעכבי מונואמין אוקסידאז, אם לא עברו לפחות 5 ימים מזמן הפסקת הטיפול בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי; ראה "תגובות בין תרופתיות".
- הינך נוטל תירואידאזן.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

גלאוקומה בעין זווית (angle closure glaucoma) – הרחבת האישונים, שנגרמת לעיתים כתוצאה משימוש בתרופות נגודות דיכאון כגון דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי, יכולה לגרום במטופלים בעלי מבנה זוויתי צר שלא עברו ניתוח לכריתת קשתית, לאירוע של גלאוקומה מסוג זווית צרה.

בעיות של תפקוד מיני לנזן

דבר עם הרופא שלך אם יש לך שינויים בתפקוד המיני, או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע

לתפקוד המיני במהלך הטיפול בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי. ייתכן שהרופא יוכל להציע לך

פתרונות.

לפני הטיפול בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי ספר לרופא אם אתה:

- סובל ממחלת כליות
- סובל או סבלת בעבר מפרכוסים (התקפיים)
- סובל או סבלת בעבר מהפרעה דו-קוטבית (מאניה-דפרסיה) או ממאניה
- סובל מבעיות בעיניים, כגון סוגים מסוימים של גלאוקומה (לחץ תוך עיני מוגבר)
- סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד או אם אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול
- צריכת אלכוהול מופרזת מבקביל לנטילת דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי. עלולה להזיק לכבד
- סובל או סבלת בעבר מדימומים או תקפים (נטויה לפתח חבורות)
- סובל מרמות נתרן נמוכות או אתה בסיכון לירידה ברמות הנתרן (למשל אם אתה נוטל תרופות משנתונ, במיוחד אם אתה קשיש)
- סובל מבעיות לב או לחץ דם גבוה ואם אתה נוטל תרופות להורדת לחץ דם
- סובל מסוכרות (הטיפול בדולוקסטין סדוז ג'י.א.ר.סי עלול לפגוע באיזון רמות הסוכר אצל חולי המתסובלים)
- סובל מקצב הטרקונות איטי של הקיבה
- סובל היסטוריה של שימוש לרעה בתרופות

מחשבות על התאבדות והחמרת הדיכאון או הפרעת החרדה

דיכאון והפרעות פסיכיאטריות חמורות נספוגות ידועים כגורמי הסיכון הגבוהים ביותר לאובדנות. למרות זאת, בחלק מהילדים, המתבגרים והבוגרים הצעירים אשר לקחו תרופות נגד דיכאון, נצפתה עלייה במחשבות במעשים אובדיניים, בעיקר בתחילת הטיפול, או כשהמינון משתנה.

אם אתה מדוכא ו/או סובל מהפרעות חרדה, יכולות לעלות בדעתך לפעמים מחשבות על גרימת נזק לעצמך או על התאבדות. מחשבות אלה עלולות להופיע בכשיחות גבוהה יותר

כאשר מתחילים לייטול תרופות נגודות דיכאון, בדרך כלל בחודשים הראשונים של הטיפול או כשהמינון משתנה.

ייתכן שתהיה לך נטייה רבה יותר לחשוב מחשבות כאלה אם:

- היו לך בעבר מחשבות על התאבדות או על גרימת נזק לעצמך
- אתה מבוגר צעיר. מידע שנאסף בניסויים קליניים הראה סיכון מוגבר להתנהגות אובדנית אצל מבוגרים בני פחות מ-24 שנים הסובלים ממצבים פסיכיאטריים ואשר טופלו בתרופות נגודות דיכאון

- אתה סובל (או יש לך היסטוריה מהפחתית) מהפרעה דו-קוטבית (מאניה-דפרסיה)

שים לב לכל שינוי במצב הרוח, בהתנהגות, במעשים, מחשבות או ברגשות, ובמיוחד לשינויים פתאומיים. אם בזמן לשהו יש לך מחשבות על גרימת נזק לעצמך או על התאבדות, התקשר לרופא או גש מיד לבית-חולים. שים לב במיוחד לשינויים אלו בתחילת טיפול ולאחר שינוי במינון.

התסמינים הבאים דווחו במבוגרים, ילדים ומתבגרים שטופלו בתרופות נגד דיכאון; חרדה, חוסר שקט, התקפי פאניקה, חוסר שינה, עצבנות, עיונות, גאגרסיות, אימפולסיביות, אקאזיה (חוסר נמנחה פסיכו-מוטורי), היפומאניה, במיוחד, בעיקר בתחילת הטיפול, או כשהמינון משתנה.
החמרת הדיכאון ו/או הופעת תדפיס אובדיניים לא הוכח, אולם נראה כי הם מהווים סימנים ראשוניים להתנהגות אובדנית.

ייתכן שיועיל שתיידע קרוב משפחה או חבר קרוב שאתה סובל מדיכאון או שיש לך הפרעת

חרדה, ותבקש מהם לקרוא את העלון הזה. אתה יכול לבקש מהם לומר לך אם לדעתם

הדיכאון או החרדה שלך מחמרים, אם לא הם מודאגים משינויים בהתנהגות שלך. כמו כן,

הקפד להגיע לכל הפגישות עם הרופא המטפל.

מומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים במצב הרוח ובהתנהגות כגון

הגברת החרדה, התקפי פאניקה, חוסר תשונה ו/אי שקט, מאניה או היפומאניה, התקפנות או

הפרעות בשינה, במיוחד בתחילת הטיפול או כאשר המינון משתנה. במקרה שחלו שינויים

כגון אלה, יש לפנות מיידיית לרופא. יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים

צעירים בני 18-24.

שימוש בילדים ומתבגרים בני פחות מ-18 שנים

דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים בני פחות מ-18 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא אם אתה לוקח:
תכשירים אחרים המכילים דולוקסטין ביומינים שונים להתוויות אחרות - יש להימנע משימוש בו זמני עם תרופה זו.
בדוק עם הרופא האם אתה כבר נוטל תרופות אחרות שמכילות דולוקסטין.

מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs – Monoamine Oxidase Inhibitors): עלוך להימנע

מליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי אם אתה נוטל או אם נטלת לאחרונה (14- הימים

אחרונים), תרופה מסוג מעכב מונואמין אוקסידאז (MAOI). נטילת מעכב מונואמין

אוקסידאז (כגון מתילן בלו תוך-ורידית) יחד עם תרופות מסוג רבوت, כולל

הדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי, עלולה לגרום לתופעות לואי חמורות עד כדי סכנת חיים. עלוך

להמתין 14 ימים לפחות לאחר הפסקת ליטול מעכב מונואמין אוקסידאז לפני שנתחיל

ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי. כמו כן, עלוך להמתין 5 ימים לפחות לאחר שאתה מפסיק

ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי. לפני שנתחיל ליטול מעכב מונואמין אוקסידאז.

תרופות שמעלות את רמת הserotonin (התרופות אלו מעבירות את הסיכון ביניהן לתסמונת

סרטונוין (ראה פרק 6 "תופעות לוואי")

- משככי כאבים חזקים כגון טראמאדול (tramadol) ופנטניל
- טריפטאנים (triptans) (לטיפול במיגרה)
- טריפטופאן (tryptophan) – חומצה אמינית המופיעה בזמזנון, תמיסות עירוי להזנה ותוספי מזון

- נוגדי דיכאון טריציקליים
- פרע מנוגד דיכאון (פרינקום – St. John's Wort)
- תרופות נגודות דיכאון מקבוצת SNRI- SSRI
- סופספרין (buspirone)
- מאפטימינים
- ליתיום

אם אתה חווה תופות יוצא דופן כלשהו בעת לקחת תרופה לעליה מבין התרופות האלה יחד עם

דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי, עלוך לגשת לרופא.

תרופות המשפיעות על קרישת הדם והיווצרות קרישים כגון:
וארפרין (קומדין) – אם אתה נוטל וארפרין, ייתכן שהרופא יעקוב אחרי במצב בתחילתו ובסיסו של הטיפול בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי.

תרופות נגודות דלקת שאינן סטרואידליות (NSAIDs) כגון איבופרופן, נפרוקסן או אספירין.

תרופות אלו עלולות להגביר את הסיכון לדמם.

- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית
- תרופות שמורידות את רמת החומציות בקיבה (עלולות לגרום לשחרור מוקדם של התרופה)
- תרופות אמידיות לחץ דם

דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי משפיעה על ריכוז תרופות אחרות בדם:

- תנאופילין (לטיפול באסתמה)
- נוגדי דיכאון טריציקליים כגון דספראמין (desipramine), נוטריפטילין (nortriptyline), אמטריפטילין (amitriptyline) ואימפראמין (imipramine)
- פנותיאזינים (phenothiazines)

- תרופות לטיפול בהפרעות קצב: פלקאיניד (flecainide), פרופפנון (propafenone), תירואידזין (thioridazine). הטיילוב עלול לגרום לבעיות קשות בקצב הלב או מוות פתאומי.

התרופות הבאות המשפיעות על הריכוז של דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי בדם:
כינידין (quinidine) לטיפול בהפרעות קצב
פלווקסאטין (fluvoxamine), פלוובוקסמין (fluvoxamine), פרוקסטין (paroxetine)

- סימטידין (cimetidine)
- תרופות אנטימיקרוביאליות ממשפת הקווינולונים כגון ציפרופלוקסאצין (ciprofloxacin) והאוקסאצין (enoxacin)

הרופא צריך להחליט האם ניתן ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי יחד עם תרופות אחרות. אל תתחיל

אלו לנטות או לקחת את תוספי ליטול אף תרופה, כולל תרופות שנקטו ללא מרשם רופא וזמני מרפא, לפני שאתה מתייעץ עם הרופא.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

ניתן ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי יחד עם צריכת אלכוהול גדולה עלולה לגרום לנזק תמזל לכבד.
התייעץ עם הרופא או עם הרוקח לפני שאת נוטלת תרופה כלשהי.

הודיע מיד לרופא אם הרדת או אתה שוכבת שאת במדין בזמן שאת נוטלת דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי.
דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי עלולה לפגוע בעובר. עליך להשתמש בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי אך ורק לאחר שדנת עם הרופא בתועלות האפשריות ובנזקים שעלולים להיגרם לעובר.

רדאי שממילדת ו/או הרופא יודעים שאת מטופלת בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי. כאשר נטלים תרופות מסוג SSRI ו-SNRI, כולל דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי, במהלך סוף השליש השלישי של ההיריון, עלול לגרול סיכונים לילדים אשפוז לתקופה ממושכת של הילוד, תמיכה נשמיתית והזנה על ידי צימיות הזנה. הסיכונים הנ"ל יכולים להתפתח מיד לאחר הלידה ויכולים לכלול מצוקה נשמיתית, חילון, הפסקת נשימה, עיונות, חוסר יציבות של מעטרתורת הגוף, קשיי איגהלה, סיכונים, היפגלטיקמיה, רפיון שרירים, נקשות שרירים, רפקטיים מוגברים, רעד, עצבנות, אי שקט וככי לאל הפסקה. לם לאחר הלידה מופיע אצל התינוק תסמין כלשהו מבין אלה, או אם את מודאגת באשר לבריאותו של התינוק, התייעצי עם הממילדת או עם הרופא.

ידעי את הרופא אם את מייקיה את ממוכנת להניק. דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי עוברת לחלב אם ועלולה להזיק לתינוק. שימוש בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי בתקופת ההנקה אינו מומלץ. התייעצי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך בזמן נטילת דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי.

נהיגה ושימוש במכוונת

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לישנוניות או להשפיע על יכולתך להחליט החלטות, לחשוב

בבהירות או להגיב במהירות. ועל כן השימוש בתרופה זו מחייב זהירות במהיגה ברכב,

בהפעלת מכוונת מסוכנת ו/או בעילות החייבית בתרופה זו. אל תנהג ללא תשומת במשירים או

במכוונת לפני שאתה יודע כיצד דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי משפיעה עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי מכילה לקטוז, (E 129) Allura Red AC, נתרן Sunset Yellow FCF (E 110) ו-Sunset Yellow FCF.

התרופה אינה לוקטוז. שימוש בלקטוז אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוגים מסוימים של סוכר,

התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל תרופה זו.

התרופה זו מכילה (E 129) Allura Red AC, אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

התרופה זו מכילה פחות מ-1 מ"ג לימזל נתרן (E 23) בכל כמוסה, ולכן ניתן לומר שהינה למעשה

"נטולת נתרן".

נופסין, דולוקסטין סנדוז 60 מ"ג ג'י.א.ר.סי מכילה גם את Sunset Yellow FCF (E 110), אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר ממיד בהתאם להוראות החול. עליך להיבן עם הרופא או הרוקח אם

אינך בטוח בהחלט כיצד לנטול התרופה. לדג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בלבד. אל

למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המינון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

לדיכאון:

רוב המטופלים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום. אצל חלק מהמטופלים יש צורך במינון התחלתי של דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ג'י.א.ר.סי פעם ביום

למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המינון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

לדיכאון:

רוב המטופלים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום. אצל חלק מהמטופלים יש צורך במינון התחתתי

של דולוקסטין סנדוז 30 מ"ג ג'י.א.ר.סי פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המינון

הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

לקשי-אם יש להתחיל את הטיפול המינון של התחלתי של 30 מ"ג פעם ביום במשך שבועיים

ופיברומיאלגיה;

המינון התחתלתי של דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי הינו 30 מ"ג פעם ביום למשך שבוע ולאחר

מכן נטילת המינון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

לרוב נטילת המינון התרופתי בדולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי ניכרת לאחר 2-4 שבועות של טיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי נועדה לנטילה דרך הפה. עליך בלבוש את כל הכמוסה בשלמותה

עם מים. אין ללעוס או לקחת את תכולת הכמוסה ואין לפתוח את הכמוסה לפרז את תוכנה

באכול או שתייה.

דבר עם הרופא לגבי משך הזמן שאתה צריך להמשיך ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי. אל

תפסיק ליטול דולוקסטין סנדוז ג'י.א.ר.סי בלי לדבר תחילה עם הרופא.

יש נטלת בטעות גבוהה יותר, עמונת סרטונוין (תרופה שיכולה לגרום לתסמינים של מינון

יתר יכולים לכלול ישנוניות, תדמיה, שחמנת סרטונוין (מחלה שיכולה להתרחש לזמנים, עצבנות,

קצב לב מהיר, לחץ דם לא יציב, סחרחורת, זעה, סבלול, חום, רעד, תדמנת, שרירים, כיווץ שרירים, רפלקטים מוגברים, חוסר קואורדינציה, בחילה, הקאה ושלושל),

פרכוסים, התעלפות, לחץ דם נמוך, לחץ דם גבוה, הקאות ודופק לב מהיר.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית

חולים, והבא את אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה, אםנ טול את המנה ששכחת ברגע שאתה מזכר. אם זה מועד

הקרוב למועד נטילת המנה הבאה, לדג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בלבד. אל

לשטח המנה כטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מסייג, הוא נוטל התרופה: אם הרופא חושב שאינך לוקח עוד דולוקסטין

סנדוז ג'י.א.ר.סי, הוא יורה לך להקטין את המינון שאתה נוטל בהדרגה לפי הפסקת הטיפול

חלופיני. אל להפסיק ליטול תרופה זו בצורה פתאומית בלי היוועץ ברופא. כאשר אתה

מפסיק את נטילת התרופה מהר מדי, או עובר מתרופה נגודת דיכאון מהר מדי, ייתכן שתחשוש

בתסמינים החמורים הבאים: סחרחורת, כאב ראש, בחילה, שלשול, תחושת נימול (קעקעויות ודקירות), אי-שקט ועצבנות, הקאות, נדודי שינה, חרדה, בלבול, תחושת חוסר יציבות רגשית, תופעה של היפו-מאניה, טנטון (שמעתה צלצול באוזן בעת שאין שום צליל חיצוני), עיוניות, הזעת יתר ותשישות.

אין ליטול תרופות בחושיך! בדוק תהויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.
הרכב משקפיים אם אתה חונך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי