




בדיקה שהכמוסה ריקה



שאף عمוק



נקב ווחרור



הכנס

בדיקות

3

2

1

**בדיקה שהכמוסה ריקה**

פתח את המשאף כדי לראות אם נשarraה אבקה בתוך הכמוסה.

אם נשarraה אבקה בתוך הכמוסה:

- סגור את המשאף
- חוזר על שלבים 3 עד 3.

ריקה נותרת אבקה

**הוציא את הכמוסה הריקה**

השליך את הכמוסה הריקה באשפה הביתית.

סגור את המשאף והחזיר את המכוסה למקום.



שלב 3ב:

שאף עמוק את התרופה

החזק את המשאף כמווגם באוויר.

שים את הפיה בתוך הפה וסגור היטב את השפתיים סביבה.

אין ללחוץ על הקפתורים הצדדים.

נשומ פנימה במהירות, עמוק ככל האפשר. במהלך השאייפה אתה תشم ציל של רשרוש. אתה עלול לחוש בטעם של התרופה במהלך השאייפה.



שלב 2א:

נקב את המכוסה פעמיים אחת

החזק את המשאף במצב אנכי.

נקב את המכוסה עליידי לחיצה בחזקה על שני הפתוחים הצדדים בו זמנית. אתה אמר לשמעו רעש כשהכמוסה מנוקבת.



שלב 2ב:

וחרור את הקפתורים הצדדים

שלב 1ב:

פתח את המשאף

שלב 1ג:

הוציא את המכוסה

הפרד חלק מהמגשית המכיל מכוסה אחת מהמגשית השלהמה.

קלף את הרדייד מרצעת המגש כדי להוציא את המכוסה.

אין ללחוץ החוצה את המכוסה דרך הרדייד. אין לבלוע את המכוסה.

שלב 1ד:

הכנס את המכוסהעלול אין להכנס את המכוסה ישירות לתוך הפיה.

שלב 1ה:

סגור את המשאף

שלב 3ג:

עצירת נשימה


עצור את נשימתך למשך 5 שניות.



שלב 3ד:

שטוף את הפיה


לאחר שאיפת המנה, עליך לשטוף את הפיה עם מים ולירוק אותם החוצה.



משאף

ביסי המשאף


מגשיות



אריזה אחת של engenzaier בריזהלר מכילה:

- משאף engenzaier בריזהלר אחד

• 30 כמוסות engenzaier בריזהלר לשימוש בתוך המשאף



מגשיות

תיקי המשאף
יש לנגב את הפיה מבפנים ולבוחץ עם בד נקי ויבש
לא מזוקן, כדי להסור שרירות אבקה. יש לשמר את המשאף יבש. לעולם אל תשטוף את המשאף עם מים.

השלכת המשאף לאחר שימוש
יש להשליך את המשאף לאחר שימוש המשאות בכל
המוסות. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות ומשאות
שאינם נחוצים עוד.

**שאלות נפוצות
למה המשאף לא השמייע רעש בזמן שני שואף
את התרופה?**

יתכן שהמכוסה נתקעה בתא המכוסה. אם הדבר קורה, שחרר בהירה את המכוסה עליידי טפיחה על בסיס המשאף. שי לשאוף את התרופה שוב עליידי חזרה על שלבים 3 עד 3.

אם נותרה אבקה בתוך המכוסה, מה עלי לעשות?
לא קיבלת מספיק תרופה. סגור את המשאף וחזור על שלבים 3 עד 3.

**השתעלתי לאחר שאיפת התרופה. האם זה
משמעותי?**
זה עלול לקרות. כל עוד המכוסה ריקה, קיבלת מספיק מהתרופה.

**הרגשתי פיסות קטנות של המכוסה על הלשון שלי.
האם זה משמעותי?**

זה עלול לקרות. זה לא מזיק. הסיכויים שהמכוסה תישבר לפיסות קטנות עולים אם המכוסה מנוקבת יותר מפעם אחת.



אנרגזאייר בריזהילר 114 מק"ג/46 מק"ג/136 מק"ג

כמוסות קשות של אבקה לשאיפה

- אין להשתמש במשאף?
- קרא בעיון את הוראות השימוש המלאות בסוף העלון לפני השימוש בתוֹרָפָה.
- אנטצאייר בריזהילר מיועדת לשאיפה בלבד.
- האיזזה מחלת משאף (בריזהילר) וכמוסות (בריצועות מגש) המכילות את התוֹרָפָה כאבקה לשאיפה.
- המשאף מאפשר לך לשאוף (לשומן אל הוראות) את התוֹרָפָה שבתוֹרָפָה המכוסה.
- יש להשתמש בכמוסות רק עם המשאף המצויר לאיזזה. יש להשאיר את הכמוסות בתוֹרָפָה רצעת המגש עד שאתה ארך להשתמש בהן.
- קלף את הרדייד מוצעתה המגש כדי לפתח אותה – אין לדוחף את הכמוסה דרך הרדייד.
- שטוף את פיר עם מים לאחר כל שימוש.
- אסור לפתח ולפזר את תוכן המכוסה. האבקה בתוֹרָפָה מיועדת לשאיפה באמצעות המשאף בלבד.
- וודא שאתה מבין כיצד להשתמש במשאף הבריזהילר כנדרש. קרא את הוראות בסוף עליון זה מיד!
- ווסף לגבי אונן השימוש בשאיפה. אם אין בטוח, הייעוץ ברוקט או ברוקט.

מתי להשתמש בתוֹרָפָה?

יש להשתמש באנרגזאייר בריזהילר באוטה שעבה כל יום. שימוש באוון זה יסייע להקטין את הופעת התסמים במהלך היום והלילה. זה גם יעזור לך להשתמש בתוֹרָפָה.

משך הטיפול

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. המשך להשתמש באנרגזאייר בריזהילר כל עוד הרופא שלך הנחה אותך להמשך בטיפול. עליך לשאוף את תכולת המכוסה בכל יום ולהמשך להשתמש בתוֹרָפָה גם כשאין לך טמנים של אסתמה. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתוֹרָפָה ללא התיעצות עם הרופא, גם אם אתה מרים טוב יותר, מארח והתסמים שלך עלולים להחמיר. תוֹרָפָה זו עוזרת לשЛОט במהלך אף אינה מרפאאת אותה. תסמיין האסתמה עלולים לחזור אם תפסיק להשתמש בתוֹרָפָה.

אם יש לך שאלות לגבי משך הטיפול באנרגזאייר בריזהילר הייעוץ ברוקט או ברוקט.

אם שכחת ליטול את התוֹרָפָה?

אם שכחת לשאוף את המגה בזמן המיעוד, יש לשאוף מנה בהקדם האפשרי באותו יום. לאחר מכן יש לשאוף את המגה הבאה כרגע ביום הבא. אין לשאוף שתי מנות באותו יום. זה עלול להעלות את הסיכון לשבול מתופעות לוואי לא רצויות.

אם אתה לא בטוח מה לעשות, שאל את הרופא או הרוקט.

אם אתה מתקשה לדוכר ליקחת את התוֹרָפָה, הייעוץ ברוקט כדי לקבל עזרה.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר

אם נטלה מנתה יתר או אם בטעות בעליל מין התוֹרָפָה, פנה מיד לרופא או לחדר מין בבית החולים או בית חולים והבא את איזחת התוֹרָפָה איתך.

אין ליטול תרופה בחושרי! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנן זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בונגגע לשימוש בתוֹרָפָה, הייעוץ ברוקט או ברוקט.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תוֹרָפָה, השימוש באנרגזאייר בריזהילר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תibal להזכיר ראשית תופעות הלואז. יתכן ולא תסבול מכך אתה מושך!

הפסק שימוש באנרגזאייר בריזהילר פונה לרופא אם אתה סובל מהתופעות הבאות:

- אכזבanza, שיעול, צפוצים או קוצר נשימה מיד לאחר שאיפת אנטזאייר בריזהילר (טסמים של עזות את השירים של דרכי הנשימה הקטנים בראיות וכן מסיעים בפתיחה דרכי האזיר ומחלים על כנסה ויציאה של אויר מהריאות). כאשר וטומים אוטם באוון נרחב על דרכי האזיר הקטנים להישאר פתוחים.
- סימפונות פרודוקסלייט (סימפונות נפיחות וגורי בדרכי הנשימה הקטנים בריאותך וכן באוון הדרגות מחלים על בעיות נשימה).
- קושי לנשומים או בלבול, נפיחות של הלשון, השפטים או הפנים, פריחה בעור, גרד ורולת (טסמים של טרואדים). מחלת נפיחות וגורי בדרכי הנשימה הקטנים בריאותך וכן באוון הדרגות מחלים על בעיות נשימה).
- אכזב או אי נוחות בעין, טשטוש ראייה זמני, צורות מוארות (הילות) או צבעוניות בשילוב עם עיניים אדומות – אלה עשויים להיות סימנים של גלאוקומה צרת-צווית

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- ייחום טרייתי בפה (סימן לזמן קנדידה)
- דחף תקוף להטלת שתן או תחושת שריפה במהלך מתן שתן (סימנים לזמן בדרכי השתן)
- קצב לב מהיר
- כאב ראש
- כאב גרון
- שיעול
- שניי בקוק (צידירות)
- שלשול, התכווצויות בטן, בחילה והקאה (דלקת קיבת ומעי)
- פירחה
- עווית בשירים, עצמות או מפרקים
- כאב בפה
- כאב בעור
- כאב בעלון, עלייר להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי שכיחות (uncommon) תופעות שימושיות ב-1-10 משתמשים מתוך 1000:

- רמה גבוהה של סוכר בدم
- גרד בעור
- קושי ואב במתן שתן (סימנים לדלקת בשלפוחית השתן)
- אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואז מחרירה, או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייר להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות ליהיא מחרירה, או ע"י כניסה ליקבון הדקון טיפול תרופה" שנמצא בדף הבית של אמר משר הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המזון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ליקבון הדקון https://sideeffects.health.gov.il.

5. איך לאחסן את התוֹרָפָה?

- מנע הרעליה התוֹרָפָה זו וכל תוֹרָפָה אחרת יש לשמר במוקם סגור מחוץ להישג ידים וטועה ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי קר מנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתוֹרָפָה אחרת תאריך התגובה (date. exp) המופיע על גביה הארץ. תאריך התגובה מתייחס ליום המכוסה בלבד.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 30°. יש לאחסן באיזזה המקורית כדי להגן מפני מאור ולחות.
- אין להוציא את המכוסה מהמגש אלא מיד לפני השימוש.
- ע��וב אחר ההנחיות לנקיוי וטיפול במשאף הבריזהילר.

6. מידע נוסף

נכסף על החומרים הפעילים התוֹרָפָה מכילה גם:

תוכלות המכוסה:

Lactose monohydrate, Magnesium stearate.

מרכיבי מעטהת המכוסה:

Hypromellose, Purified water, Carrageenan, Potassium chloride.

חומר צבע:

Iron oxide yellow, Indigotine.

מרכיבי הדי השחור המוטבע על מכסה המכוסה:

Purified water, Iron oxide black, Isopropyl alcohol, Propylene Glycol, Hypromellose.

כיצד לנארט את התוֹרָפָה ומה תוכן הארץ:

האריזה מכילה משאף יחד עם כמוסות בריצועות מגש. לכמוסות יש מכסה שקוף יירוק וגוף שקוף טבוי. הן מכילות אבקה לבנה, עם קוד המוצר "IGM150-50-50-160" מודפס בשחור מעל לשני קווים שחורים על גוף המכוסה ולוגו החברה (על) מודפס בשחור על המכוסה. גודל אריזה: 30 כמוסות + משאף אחד.

בעל הרישום והיבואן וכותבונו: נוברטייס ישראל בע"מ, ת"ד 7126, תל אביב.

נערך ביולי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי בישראל: 168 70 36695

לשם הפשטות ולהקלת הקריה, עלון זה נכתב בלשון ذכר. על אף זאת, התוֹרָפָה מיועדת לבני שני המינים.

נקוט בדיהיות בנהיגה או הפעלת מכונות עד שתדע כיצד הנארט בריזהילר משפיע עלך.

3. כיצד תשמש בתוֹרָפָה?

יש לשמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקט אם אין בטוח בונגגע למין ואופט טיפול בתכשיר.

אם אתה עומד לנטודת תרופה חדשה, הזכיר לרופא ולרוקט שאתה משתמש באנרגזאייר בריזהילר.

ספר ליל אחד מהרופאים, רופאי שנאים ורוקטים שמתפלים ברק שמתmesh בתוֹרָפָה זו.

אם אתה עומד לעבר ניתוח, ספר לרופא המנתה או המדרדים שאתה משתמש בתוֹרָפָה.

הΚפְּדָה לְגַעַגְעָה לְכָל הַפְּגִישָׁה עַמְּדָה רַופָּא שְׁלֵר כִּי שְׁהַרְפָּא וְיָכַל לְעַקְבָּה אַחֲרֵי מִצְבָּחָן.

אל תשמש באנרגזאייר בריזהילר לטפל בתלונות אחרות שיש לך אלא אם קיבלה הנחיה לכך מהרופא.

בכמה תרופה להשתמש?

התחלת טיפול ובקביעת תרופה על-ידי רופא מומחה לטיפול באסתמה.

המנון המקורי בדרך כלל הוא שאיפת תוכן של מכוסה אחת בכל יום.

יש צורך לשאוף רק פעם ביום אחר והשפעת תרופה זו נשכחת 24 שעות.

אין לעבור על המונה המומלצת.