

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ליטורבה® 10, 20, 40, 80 מ"ג, טבליות

כל טבלייה מכילה אטורבסטטין כמלה סידן (Atorvastatin (as calcium)) במינון 10, 20, 40 או 80 מ"ג בהתאמה.

חומרים בלתי פעילים ואולרגיים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרק בעיניו אל העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- להורדת רמת השומנים בדם (כולסטרול וטריגליצרידים) ולהעלאת HDL.
- למניעת מחלות ולכלי דם (גנן): אוטם שריר הלב או (שבץ) למטופלים בעלי סיכון גבוה לאירוע ראשוני.
- בחולים עם מחלת לב כלילית, ליטורבה מורידה את הסיכון להופעת אוטם שריר הלב, שבץ מוחי, אשפוז עקב אי ספיקת לב, תעוקת לב ו/או צורך בצנתור.

קבוצה תרופוטי: סטטינים - מעכבי האנזים HMG-CoA דרוקטאז

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אטורבסטטין) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה סובל ממחלת כבד פעילה או כאשר ישנה עלייה מתמשכת ברמת הטרנסאמינזות בדם.
- אתה בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון.
- אתה מיניקה.
- אתה נוטל ציקלוספורין, טלפרברי (לטיפול בהפטיטיס C) או שילוב של התרופות טיפראנאביר וריטונאביר (לטיפול בגיף האיידס), אתה סובל ממחלה של שריר השלד.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בליטורבה, ספר לרופא אם:

- אתה סובל מכאבי שרירים או מחולשה.
- אתה שותה יותר משתי כוסות אלכוהול ביום.
- אתה סובל מסוכרת.
- אתה סובל מבעיות בבלוטת המגן (היתרויד).
- אתה סובל מבעיות בכליות.
- סבלת בעבר מבעיות בכבד.

שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול
מבהלך הטיפול בתרופה אין לשנות יותר משתי כוסות אלכוהול ביום (ראה בסעיף 2 - תת סעיף "לפני הטיפול בליטורבה, ספר לרופא אם")

היריון, הנקה ופוריות
אין להשתמש בתרופה אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון או אם את מיניקה.
אם נכנסת להיריון במהלך השימוש בתרופה, הפסיקי לטול אותה ופני מאי אל הרופא.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי רופא שאתה סובל מאי סבילות לזוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא אם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול ייקבע על ידי הרופא בלבד.
אין לנבוע על המנה המומלצת.
יש לבלוע את הטבלייה במלחמה עם מעט מים. ניתן לטול את הטבלייה בכל שעה ביום, עדיף בשעה קבועה.

תגובות בין תרופתיות
אתה לוקח, או את לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כל לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות שבשילוב עם ליטורבה מעלות את ריכוזה בדם ועלולות להגביר את הסיכון להופעת כאבי שרירים/קלריתרמיציין (אנטיביוטיקה), חומצה פוספית, מעכבי פרנאטאז לטיפול באיידס: טיפונאביר, ריטונאביר, לופינאביר, סאקווינאביר, דרונאביר, פוסאפמורנאביר, לופינאביר; מעכבי פרנאטאז לטיפול בהפטיטיס C: לסופראביר, פיברנסאביר, סימפראביר, אלבאסביר, לדיפאסאור וסופוסבוור, רופורביר; איטרקונאזול (אנטי פטרייה); ציקלוספורין; לטרמובר, גמפיבוביל, פיבראטיס; הורדת כולסטרול, ניאצין, קוליצ'יץ (לישגדון).

תרופות שבשילוב עם ליטורבה מורידות את ריכוזה בדם: אפרינז, ריפמבין (אנטיביוטיקה)

תרופות שבשילוב עם אטורבסטטין עלה ריכוז בדם: דיגוקסין (לב), גלולות למניעת היריון המכילות נוראתינדרון ואתנילאסטרויל

- תרופות שבשילוב עם אטורבסטטין משפיעות על פעולת הרעמונים מסוימים גנן: קטוקואזול, ספירולקטון וסימטידין
- אין לטול ליטורבה יחד עם התרופות הבאות: ציקלוספורין, טלפרברי (לטיפול בהפטיטיס C) או שילוב של התרופות טיפראנאביר וריטונאביר (לטיפול בגיף האיידס).

שימוש בתרופה ומזון

- ניתן לטול את התרופה עם או ללא ארוחה.
- בזמן הטיפול בתרופה אין לשנות כמויות גדולות של מין אשכוליות (מעל ליטר ביום).
- יש להיפדע על תזונה דלת כולסטרול במהלך השימוש בתרופה.

ליטורבה ללקחת בשילוב עם תרופות אחרות (ראה סעיף "תרופות שבשילוב עם ליטורבה מעלות את ריכוזה בדם ועלולות להגביר את הסיכון להופעת כאבי שרירים").

- בעיות בכבד - פנה מייד לרופא,** אם אתה מפתח תסמינים של בעיות בכבד גנן: תחושת עייפות או חולשה, אובדן תיאבון, כאבים בחוט העליונה, צבע השתן הופך כהה יותר (צבע ענברי), הצהבת העור ולבן העיניים.

יש לטול מייד לרופא אם:

- אתה סובל מבעיות בשרירים כמו חולשה, רגישות או כאב שהחלו ללא סיבה ברורה, במיוחד אם מלווים בחום או אם אתה חש עייף מהרגיל. ייתכן שמדובר בסימון של בעיית שרירים נדירה.
- אתה סובל מבעיות שרירים אשר אינן נעלמות לגמרי כששורפא הנחה אותך לבדוק ליטול את התרופה. ייתכן שהרופא יפנה אותך לבידוק נוספות בכדי לברר ממה נובעות הבעיות בשרירים.
- אתה מפתח תגובה אלרגית הגורמת להתנפחות הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון שעלולה לגרום לשיקשוק ושיממה או בליעה. ייתכן שיש צורך בטיפול רפואי מיידי.
- אתה סובל מבחילות או הקאות.
- צבע השתן הופך כהה או חום.
- אתה מרגיש עייף מהרגיל.
- צבע העור ולבן העיניים הופך לצהוב.
- אתה סובל מכאבי בטן.
- מופיעה תגובה אלרגית בעור.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב 1-10 משתמשים מתוך 100): דלקת של האף והגרון, נוקשות במפרקים, שלשול, כאבים בגפיים, דלקת בדרכי השתן, קשיי עיכול, בחילות, כאבי שרירים ומפרקים, התכווצויות שרירים, אדבת (מיאלוגיה), כאב ברקמת החיבור ובשרירים), נדודי שינה וכאבים בלוע ובגרון.

תופעות לוואי נוספות:
תופעות כלליות: עייפות, חום.
תופעות במערכת העיכול: אי נוחות בבטן, נפיחות, גזים, דלקת כבד (הפטיטיס), עימרון מרה (כולסטיזיס), מצב בו יש סימיה של זרימת המרה בתוך הכבד יכול לגרום לצהבת ונקל לכבד).

תופעות במערכת השלד והשרירים: כאבי שרירים, שלד, חולשת שרירים, כאב בצוואר, נפיחות במפרקים, תסמינים של מחלה דמוית אדבת (כול) פריחה, הפרעות במפרקים והשפעות על תאי דם). שינויים בבדיקות דם - עלייה ברמת טרנסאמינזות, שינויים ברמת אנזימי כבד, עלייה ברמת אלקליין פוספטאז, עלייה ברמת קריאטין קינאז, עלייה ברמת הסוכר בדם (היפרגליקמיה).

תופעות במערכת העצבים: סינוי לילה.
תופעות במערכת הנשימה: דימום מהאף.
תופעות בעור: סרפדת (אורטיקריה).
תופעות במערכת הראייה: השמעת טשטוש ראייה, טיטנון.

תופעות במערכת השתן: הופעת תאי דם לבנים בשתן.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לרווח על תופעות לוואי במשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "רווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המכנה לפסוף המקוון לרווח על תופעות לוואי, או על ידי ניכסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. יאלחצו את התרופה?

- מעג הערלה: תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- חתיא אטנסון:** יש יאלחצו באריזה המקורית, לא מעל 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Starch pregelatinized, lactose monohydrate, crospovidone, hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, hypromellose, silica colloidal anhydrous, titanium dioxide (E-171), macrogol, carnauba wax.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ליטורבה 10, 20, 40: טבליות לבנות, עגולות ומצופות עם הטבעה 10, 20 ו-40 בהתאמה.
ליטורבה 80: טבליות לבנות, אובוליות ומצופות. גודלי אריזות מאושרים: 2, 10, 30 טבליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משוקקים.
ישו הציגו נתונות: דקסל בע"מ, רח' רקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל

נערך באפריל 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה והתרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
ליטורבה 10: 145-31-33305
ליטורבה 20: 145-32-33307
ליטורבה 40: 145-30-33287
ליטורבה 80: 148-02-33632

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

בעל רישום:

דקסל פארמה טכנולוגיות בע"מ
רח' רקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל