

## كيسكي 200 ملг

### أقراص مطبلية

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص على: ريبوسيلكاب 200 ملغ (على شكل ريبوسيلكاب سوكبينات 254.40 mg (as ribociclib succinate 254.40 mg)

• الأدوية غير الفعالة وملوّنات الحساسية: أنظر الفصل 2، بند "معلومات هامة عن بعض منتجات الدواء" وأيضاً البند 6 "معلومات إضافية".

إفرا الشرة يتمتع حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلنة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مضرك. لا تتعطه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

• الأدوية التي تستعمل لمعالجة مشاكل في القلب (مضادات الالانثروجين)، مثل أميدارون أو كيندين.

• الأدوية لمعالجة المشاكل الذهنية، مثل بيموريد أو كوتبيبين.

• الأدوية التي تستعمل لتحسين نسب الشحوم في الدم، مثل سيماستين، لوفاستين، بيتافاستين، بيرافاستين أو روزوفاستين.

• الأدوية التي تستعمل لمعالجة ارتفاع نسبة السكر في الدم (متلا السكري)، مثل ديجوكسين.

• الأدوية التي تستعمل لمعالجة ضغط الدم الشرياني الرئوي ومشاكل انصباب الصبيب (الجع الخشبي)، مثل سيلدينيفلوك.

• الأدوية التي تستعمل لمعالجة إنخفاض ضغط الدم أو الشقيقة، مثل إرغوتامين أو ديهيدرورغوتامين.

• بعض الأدوية التي تستعمل لمعالجة نوبات الصرع أو التي تستعمل للتهنئة أو التخدير، مثل ميدازولام.

• الأدوية التي تستعمل لمعالجة اضطرابات النوم، مثل تريازولام.

• الأدوية التي تستعمل لمعالجة مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل سيسپاريد.

• الأدوية التي تستعمل لمنع زراعة الأعضاء، مثل تاكروليموس، سيروليموس وسيكسيبورين (التي تستعمل أيضاً لمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي وداء الصدفيه). يبريفوليموس، الذي يستعمل لمعالجة إنخفاض ضغط الدم أو الشقيقة أو الجلد (هذه قد لمنع زراعة الأعضاء).

احرص على إبلاغ الطبيب عن كافة الأدوية والإضافات الغذائية، بما في ذلك الأدوية التي ذكرت سابقاً. التي تتناولها وذلك قبل بدء العلاج بـ كيسكي، وإنما إذا تم وصف دواء جديد لك بعد أن بدأت العلاج بـ كيسكي.

أسأل الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان دواوك هو أحد الأدوية التي ذكرت سابقاً.

استعمال الدواء والطعام لا يجوز أكل الجريب فروت أو شرب عصير الجريب فروت خلال فترة العلاج بـ كيسكي. فهي قد تغير طريقة تناول كيسكي في جسمك وإن ترفع من كمية كيسكي في جسمك.

بالإمكان تناول كيسكي مع أو بدون طعام.

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقدين بذلك من الممكن أن تكوني حاماً أو خططين للحمل، استشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

سيناقشك الطبيب حول المخاطر المحتملة لتناول كيسكي خلال فترة الحمل.

الحمل والنساء الواتي لديهن الاحتمال بأن يصبحن حوامل لا يجوز استعمال كيسكي خلال فترة الحمل لأنه قد يلحق الضرر بجنينك. إذا كنت امرأة في سن الخصوبة فعليك اختيار حصن حمل سليبي قبل بدء العلاج بواسطة كيسكي. عليك استعمال وسيلة من حمل ناجحة (مثلاً: وسيلة من حمل متوجدة مثل كوندون وديفاراغم) خلال فترة تناول كيسكي وعلى الأقل بعد 21 يوماً من الجرعة الدوائية الأخيرة. إسأل الطبيب حول الخيارات لوسيلة من حمل ناجحة.

الرضاعة لا يجوز الإرضا خلال فترة تناول كيسكي وعلى الأقل 21 يوماً بعد الجرعة الدوائية الأخيرة.

السيادة واستعمال الماكينات العلاج بـ كيسكي قد يؤدي إلى حدوث إرهاق، دور أو الشعور بدوران. لذا، عليك توخيحذر.

أثناء السيادة أو استعمال الماكينات خلال فترة العلاج بـ كيسكي.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء يحتوي كيسكي على ليسيتين صويا 0.344 ملغم في القرص).

لا تستعمل هذا الدواء إذا كنت حساساً للقول السوداني أو اللصوص.

**3. كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب دائماً استعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب.

علىك الاستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء. لا يجوز تغيير المقدار الدوائي أو جدول أوقات كيسكي من دون التحدث مع الطبيب.

• المقدار الدوائي الإبتدائي الموصى به من كيسكي هو 600 ملغم (3 أقراص من 200 ملغم) مرة في اليوم. يبلغ الطبيب كم قرصاً بالضبط يجب أن تتناول من كيسكي؛ في حالات معينة (مثل، في حالات مشاكل في الكلى أو في الكبد)، من شأن الطبيب أن يرشدك لتناول مقدار دوائي أقل من كيسكي، مثلًا 400 ملغم (أقراصين ذوي 200 ملغم) مرة في اليوم أو 200 ملغم (أقراص واحد ذو 200 ملغم) مرة في اليوم.

• تستمر الدورة العلاجية 28 يوماً. يجب تناول كيسكي مرة في اليوم فقط في الأيام 1 حتى 21 من الدورة ذات 28 يوم.

يمنع تناول كيسكي خلال الأيام 22-28 من الدورة العلاجية.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

من المهم جداً متابعة تعليمات الطبيب. إذا وجدت لديك أعراض جانبية معينة، فمن الجائز أن يصف لك الطبيب مقداراً دوائياً آخر، بوقف العلاج بـ كيسكي، أو يوقفه إلى الأبد.

**طريقة التناول** يجب تناول كيسكي مرة في اليوم بنفس الساعة من كل يوم، يفضل في الصباح. الأمر الذي يساعدك على تذكر متى يجب تناول الدواء. يجب بلع أقراص كيسكي بشكلها الكامل (لا يتطرق الدوائي إلى كيسكي أو يوقف العلاج بشكل مؤقت، إذا دعت الحاجة، لإراحة الإنعاش الكلب، للكلى، عند الحاجة، من الجائز أن يصف لك الطبيب مقداراً دوائياً أكثر إنخفاضاً، بوقف العلاج بـ كيسكي، أو يوقفه للأبد).

كيسكي غير مخصوص للعلاج لدى الأطفال ومرادفين دون عمر 18 سنة.

كيسكي غير مخصوص للعلاج لدى الأطفال ومرادفين دون عمر 18 سنة.

سيرشدك الطبيب لإجراء فحوص دم منتظمة قبل وخلال العلاج بـ كيسكي لمراقبة ومتابعة الأداء الوليفي للقلب، نسب خلايا الدم (خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية) والكيرليات (الألاسرن في الدم، يشمل البوتاسيوم، الكالسيوم، المنزنيزيوم والفسفات) في جسمك.

يتم أيضاً فحص نشاط قلبك قبل وخلال العلاج بـ كيسكي عن طريق فحص بسيمي التخطيط الكهربائي للقلب (ECG – electrocardiogram). إذا دعت الحاجة، يتم إجراء فحص بسيمي التخطيط إضافياً لتقييم وظائف الكلى لديك خلال العلاج بـ كيسكي، كذلك، من شأن الطبيب أن يقلل المقدار الذي يتناوله كيسكي أو يوقف العلاج بشكل مؤقت، إذا دعت الحاجة، لإراحة الإنعاش الكلب، للكلى، لخلايا الدم، نسبة الكيرليات أو نشاط القلب. من شأن الطبيب أيضاً أن يتخذ قراراً بإيقاف العلاج بـ كيسكي بشكل دائم.

**التدخلات والمواهقون** يجب تناول كيسكي مرة في اليوم في الأيام 1 حتى 21 من الدورة العلاجية ذات 28 يوم.

قبل أن تبدأ بتناول كيسكي، أبلغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، وذلك لأنها يمكن أن تؤثر على طريقة تناول كيسكي. خاصة إذا كنت تتناول:

• تاموكسيفين، دواء أضافي لعلاج تلوثات الدم الشريانية، مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول أو بوساكونازول.

• بعض الأدوية التي تستعمل لمعالجة التلوثات النظرية، مثل كيتوكونازول، إيتراكونازول، ساكونازول، إيندينافير، لوبينافير، نيفافير، تيلابيرير ويفافيرين.

• بعض الأدوية التي تستعمل لمعالجة فيروس فشل المناعة (HIV/الإبز)، مثل رينتونافير، وفيتنون.

• عشبة سانت جونس (المعروف أيضاً بـ هيبوراتوم)، دواء نباتي يستعمل لمعالجة الإلخالات (مضادات الصرع)، مثل كاربامازيبين.

• بعض الأدوية التي تستعمل لعلاج الملاريا، مثل خلوروكوبين.

• بعض الأدوية التي تستعمل لمعالجة إضطرابات نظم القلب أو إرتفاع ضغط الدم، مثل أميدارون، ديروبيريميد، بيكيندين، سوتالول وفيراميل.

• أدوية لعلاج الملاريا، مثل خلوروكوبين.

• مضادات حيوية، مثل كلاريتوكاسين، تيليتروميسين، موكسيفلوكساسين، ريفامبيسين، سيرفولوكاسين، ليفولوكاسين وأزيتروروميسين.

• بعض الأدوية التي تستعمل للتهدئة أو للتخدير، مثل ميدازولام، أو نفسية، مثل نيفازودون.

كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

**4. الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال كيسكي أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدشن من قائمة الأعراض الجانبية، إلا في الحالات الأثقلية.

بعض الأعراض الجانبية قد تكون خطيرة بحسب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهر أحد الأعراض التالية خلال فترة العلاج بواسطة كيسكي.

يجب أخذ أقصى انتشار الماء، 2ليل (استعمال الدواء)، قبل استعمال كيسكي.

بعض الأعراض الجانبية، ضعف عام وتلوّنات متكررة مع أعراض مثل الم في الحنجرة أو تقرحات في الفم، غالباً ما تحدث في الفم (علامات إنخفاض نسبة من أنواع مختلفة من خلايا الدم). أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة).

• أعراض جانبية غير صحية في فحوص الدم، التي تعطي معلومات حول صحة الكبد (نتائج غير صحية لوظائف الكبد). أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة).

أعراض جانبية معاً ضمن معاً من بعض مركبات كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائلة، بلون بنفسجي مائل لـ lecithin soya (E322)، xanthan gum؛ أو لـ iron oxide black (E172)، iron oxide red (E172).

يحتوي كل قرص على 0.344 ملغم لـ lecithin soya.

أنظر التحذير في الفصل 2، قبل استعمال الدواء، تحت بند: "معلومات هامة عن بعض مركبات كيسكي".

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أعراض كيسكي هي أعراض مطبلية، مستمرة، مؤكدة ذات جوانب مائل