

עלון לצרכן **ל תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

איקסיפי TM

אבקה להכנת תמיסה מרוכזת להכנת תמיסה לעירוי תוך ורידי (I.V.) הכלת בקבוקון איקסיפי מכיל 100 מ"ג אינפליקסימאב (infliximab). לאחר הכנת התמיסה כל מ"ל מכיל 10 מ"ג אינפליקסימאב.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה טופף 2 תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וטופף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע מצטיי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו רשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

איקסיפי הינו תכשיר בינו-מימילרי. בנוסף לעלון, לתכשיר איקסיפי קיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל.
כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעליו לדעת לפני התחלת הטיפול במהלך הטיפול באוסטו גנון. אנצל מטופלים הנושאים גנון זף, ועלול להיות מסכן לשימה או התנפחות של הרגליים.
סרטן ולימפומה
ספר לרופא לפני שניתן לך איקסיפי, אם אתה חולה או אי פעם חלית בלימפומה (סוג של סרטן דם) או בבל סוג אחר של סרטן.
מטופלים החולים בדלקת מפרקים שיגרנית חמורה עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח לימפומה.
אירוסניה (orencia) (שמכילה אבטסופט – abatacept). אין להשתמש באירוסניה ובאורנסניה באינפסיפי.
בזמן הטיפול באיקסיפי, אסור לך לקבל חיסונים "חיים"
אם את מתקנה או בהריון, חשוב ליידיע את רופא הילדים הצעות הרפואי שאת נוסלת איקסיפי לפני שיתונקן מקבל חיסון כלשהו.
היריון, הנקה ופוריות
עליך להתייעץ עם רופא לפני השימוש בתרופה זו אם את בהריון או מיניקה.
חושבת שאת טופלו בינוסימאב-6מרקפטופורין) , בנוסף חוסמי TNF (אתזופורין) או 6-mercaptopurine (מרקפטופורין), בנוסף חוסמי TNF מספר חולים שאת טופלו באינפליקסימאב פיתחו גומים מסימים של סרטן העור. אם ישנם שישוים לבלשה בעור או בגידולים על העור במהלך הטיפול או לאחר חיסונו. דווח לרוכא.
מספר נשים שטופלו באינפליקסימאב לדלקת מפרקים שיגרנית, פיתחו סרטן צוואר הרחם. נשים הנוטלות איקסיפי, כולל נשים מעל גיל 60, ייתכן שהרופא ממליץ להיבדק בקביעות לסרטן צוואר הרחם.

לתשומת לבך

חשוב שבכל פעם שאתה מקבל את התרופה בבית המרקחת, תוודא שאתה מקבל את אותה התרופה שרשם לך הרופא המומחה למטפל בך. אם התרופה שקיבלת נראית שונה מזו שאתה מקבל בדרך כלל לא בהחיות השימוש השתנו, אגא פנה מיד לרוקח לוודא שקיבלת את התרופה הנכונה.

כל החליפה או שישו מינון של תרופה המכילה אינפליקסימאב (infliximab) חייבים להתבצע אך ועל רקע לזי הרופא המומחה המטפל. אגא בדוק כי שמו המסחרי של התכשיר שרשם לך הרופא המומחה בומרש, הינו זהה לשם התרופה שקיבלת מהרוקח.

1. למה מיועדת התרופה?

- איקסיפי משמשת לטיפול במבוגרים הלוקים במחלות הדלקתיות הבאות:
 - דלקת מפרקים שיגרנית (Rheumatoid arthritis)
 - דלקת חוליות ממקשת (Ankylosing spondylitis)
 - דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis)
 - ספחת (Psoriasis)
- מחלת קרוהן
- דלקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative colitis)

קבוצה תרפויטית: חוסמי TNFα

איקסיפי מכילה חומר פעיל הנקרא אינפליקסימאב.
אינפליקסימאב הינו גופדן חד-שבטי - סוג של חלבון אשר מתחבר למטרה מוגדרת בנוף, על־חלבון אשר נקרא TNF alpha (tumor necrosis factor) איקסיפי פועלת על־התחברות סלקטיבית לחלבונים TNF alpha וחסמת את פעולתו.
TNF alpha מעורב בתהליכי הגוף ולפיכך חסימתו יכולה להפחית את הדלקת בגוף.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאינפליקסימאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסופף 6).
- אתה אלרגי לחלבונים ממקור עזבוי.
- אתה סובל משחפת (TB) או מזיהום חמור אחר כגון אבצס (זיהום חידיקי) או אלזח דם (sepsis) (זיהום חידיקי שמור של הדם), זיהום אופורטוניסטי. אתה סובל מאי־ספיקת לב אינה סובלת עד תמורה.
- אין להשתמש באיקסיפי אם אתה סובל מאחד מהמצבים המפורטים מעלה. אם אינך בטוח, פנה לרופא לפני שאתה מקבל איקסיפי.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול באיקסיפי, ספר לרופא אם:
ספחת
קוקסידיומיקוזיס (coccidioidomycosis) או בלוסטומיקוזיס (blastomycosis) זיהומים חדים גורמים על ידי סוגים מספיינים של פטריות שעלולות להשפיע על הראות זיהומים על חלקים אחרים בגוף.
קיימת כפיחות שתקבל ביתר קלות זיהומים בתקופת הטיפול באיקסיפי. אם אתה בן 65 שנים או יותר, אתה נמצא בסיכון גבוה יותר.
זיהומים הבאים, שכיולים להיות חמורים, כוללים שחפת, זיהום שנגרמים על ידי נגיפים, פטריות, חיידקים ו אורגניזמים אחרים שבסיבה ואלזח דם (sepsis), יוכלים להיות מסכני חיים.
דווח מיד לרופא אם אתה גומם מינוני זיהום במהלך הטיפול באיקסיפי. הסימנים כוללים חום, שיעול, סימנים דמויי־שפעת, הרגשה כללית רעה, עור חם או אדום, פצעים או בעיות שיניים. ייתכן שהרופא ממליץ על הפסקה זמנית של הטיפול באיקסיפי.

זיהומים

טרם התחלת הטיפול באיקסיפי, ספר לרופא אם אתה סובל מזיהום כלשהו, גם אם זהו זיהום לך.

טרם התחלת הטיפול באיקסיפי ספר לרופא אם אי פעם גרת או טיילת באזור שבו נפוצים זיהומים הבאים: היסטופלזמוזיס (histoplasmosis), קוקסידיומיקוזיס (coccidioidomycosis) או בלוסטומיקוזיס (blastomycosis) זיהומים חדים גורמים על ידי סוגים מספיינים של פטריות שעלולות להשפיע על הראות זיהומים על חלקים אחרים בגוף. קיימת כפיחות שתקבל ביתר קלות זיהומים בתקופת הטיפול באיקסיפי. אם אתה בן 65 שנים או יותר, אתה נמצא בסיכון גבוה יותר.

זיהומים הבאים, שכיולים להיות חמורים, כוללים שחפת, זיהום שנגרמים על ידי נגיפים, פטריות, חיידקים ו אורגניזמים אחרים שבסיבה ואלזח דם (sepsis), יוכלים להיות מסכני חיים.

דווח מיד לרופא אם אתה גומם מינוני זיהום במהלך הטיפול באיקסיפי. הסימנים כוללים חום, שיעול, סימנים דמויי־שפעת, הרגשה כללית רעה, עור חם או אדום, פצעים או בעיות שיניים. ייתכן שהרופא ממליץ על הפסקה זמנית של הטיפול באיקסיפי.

שחפת

- חשוב מאוד שתספר לרופא אם אי פעם חלית בשחפת, או אם היית במגע קרוב עם מישהו שחוליה שחשפת או שחלה בשחפת בעבר.
- הרופא יבדוק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת. מקרי שחפת דוחו במטופלים שטופלו באינפליקסימאב, אפילו בחולים שטופלו בכב רחפתית נגד שחפת. הרופא יתעד את תוצאות הבדיקה ב"כרטיס מידע בטיחותי למטופל" שברשותך.

אם הרופא חושש שאתה נמצא בסיכון לחלות בשחפת, ייתכן שתטופל בתרופות נגד שחפת לפני שתחיל להשתמש באיקסיפי.
דווח מיד לרופא אם מופיעים סימנים של שחפת במהלך הטיפול באיקסיפי. הסימנים האלה כוללים שיעול מתמשך, ירידה במשקל, הרגשת עייפות, חום, הזעות לילה.

נציף צהבת מסוג B (הפטטיס B)

לפני שאתה מקבל את הטיפול באיקסיפי, ספר לרופא אם אתה נשא של הפטיטיס B או אם אי פעם סבלת מהפטיטיס B.

ספר לרופא אם אתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון להידבק צהבת נגיפית מסוג B.

הרופא אמר לבדוק אותך לאחר המציאות של צהבת נגיפית מסוג B.

- הטיפול בחוסמי TNF, כולל לגרום להתפרצות מחדשת של צהבת נגיפית מסוג B. אנצל מטופלים הנושאים גנון זף, ועלול להיות מסכן חיים במקרים מסוימים.

- בעיות לב**
- ספר לרופא אם אתה סובל מבעיות לב כלשהן. כגון אי ספיקת לב קלה.**
- הרופא ינהל מעקב קפדני אחר הלב.**

דווח מיד לרופא אם אתה חולה או סובל חוזה הסמינים חדשים או החמרה בתסמינים קיימים אם אי ספיקת לב במהלך הטיפול באיקסיפי. התסמינים כוללים קוצר נשימה או התנפחות של הרגליים.

סרטן ולימפומה

- ספר לרופא לפני שניתן לך איקסיפי, אם אתה חולה או אי פעם חלית בלימפומה (סוג של סרטן דם) או בבל סוג אחר של סרטן.
- מטופלים החולים בדלקת מפרקים שיגרנית חמורה עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח לימפומה.
- אירוסניה (orencia) (שמכילה אבטסופט – abatacept). אין להשתמש באירוסניה ובאורנסניה באינפסיפי.
- בזמן הטיפול באיקסיפי, אסור לך לקבל חיסונים "חיים"

ספר לרופא שטופלו בחוסמי TNF, כולל אינפליקסימאב, פיתחו סוג נדיר של מספר חולים הנקרא Hepatosly T-cell lymphoma.
מבין חולמי אלו, רוב החולים היו בני בגיל העשרה או גברים עעירים לרובם הייתה מחלת קרוהן או דלקת כיבית של המעי הגס.
סרטן מסוג זה בדרך כלל המתיים במוות.
מנעט כל החולים האלה נטלו גם תרופות המכילות azathioprine (אתזופורין) או 6-mercaptopurine (מרקפטופורין), בנוסף חוסמי TNF מספר חולים שאת טופלו באינפליקסימאב פיתחו גומים מסימים של סרטן העור. אם ישנם שישוים לבלשה בעור או בגידולים על העור במהלך הטיפול או לאחר חיסונו. דווח לרוכא.

מספר נשים שטופלו באינפליקסימאב לדלקת מפרקים שיגרנית, פיתחו סרטן צוואר הרחם. נשים הנוטלות איקסיפי, כולל נשים מעל גיל 60, ייתכן שהרופא ממליץ להיבדק בקביעות לסרטן צוואר הרחם.

מחלת ריאה או עישון כבד

ספר לרופא לפני שניתן לך איקסיפי, אם אתה סובל ממחלת ריאות שנקראת מחלת הריינון או מתנבנת לזכיסנ הריוני.
יש להשתמש באיקסיפי בלודים נשנולד לנשים שטופלו באינפליקסימאב במהלך הריונון, דווח על זיהומים מסוגים מסוימים של סרטן העור. אם ישנם שישוים לבלשה בעור או בגידולים על העור במהלך הטיפול או לאחר חיסונו. דווח לרוכא.

מחלות של מערכת העצבים

ספר לרופא לפני שניתן לך איקסיפי, אם אתה סובל או אם סבלת בעבר מבעיות משפיעות על מערכת העצבים. הבעיות כוללות טרשת נפוצה, תסמונת גיליאן־בר, אם אתה סובל מהתקפי פרסוכים או אם אובחנה אצלך דלקת עצב הראייה. דווח מיד לרופא אם מופיעים אצלך תסמינים של מחלת עצבים במהלך הטיפול באיקסיפי. הסימנים כוללים שישוים בראייה, חולשה בזרועות או בגרגליים, נימול או עקצוץ בכל אחד מחלקי הגוף.

פחחים חריגים בעור (פיסטולות)

דווח לרופא אם יש לך פחחים חריגים בעור (פיסטולות fistulae) לפני שניתן לך איקסיפי.

חיסונים

ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או שעליך לקבל חיסון.
עליך לקבל חיסונים מומלצים לפני התחלת הטיפול באיקסיפי. אתה יכול לקבל חלק מהחיסונים במהלך הטיפול באיקסיפי, אבל אינך יכול לקבל חיסונים "חיים" (חיסון חיים גורם מחזה מ'י אבל מוחלש) במהלך הטיפול באיקסיפי, מאחר שזה עלול לגרום לזיהומים.

אם קיבלת איקסיפי במהלך הריונון, גם תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בתרופה כתוצאה מחיסון חי
במהלך שנת החיים הראשונה. חשוב שתספר לרופא של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים שהשתמשת באיקסיפי במהלך הריונון כדי שיוכלו להחליט מתי לתת לתינוקך חיסון כלשהו, כולל חיסונים "חיים" כגון חיסון BCG (למניעת שחפת).

אם את מיניקה, חשוב ליידיע את רופא הילדים והצוות הרפואי שאת נוסלת איקסיפי לפני שיתונקן מקבל חיסון כלשהו.

למידע נוסף ראי טופף "היריון, הנקה ופוריות".

רפיו באמצעות גורמי הדלקת

ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או אם נקבע לך טיפול באמצעות גורמי דלקת מרפאים (כגון חיסון BCG המשמש לטיפול בסרטן).

ניתוחים או הליכים דנטליים

ספר לרופא אם אתה עומד לעבור ניתוח או הליך דנטלי כלשהו.
ספר למנתח או לרופא השיניים שאתה מקבל טיפול באיקסיפי, והראה להם את "כרטיס מידע בטיחותי למטופל" שלך.

בעיות כבד

חלק מהמטופלים המקבלים אינפליקסימאב פיתחו בעיות כבד חמורות.
ספר לרופא מייד אם חווית תסמינים של בעיות כבד במהלך הטיפול באיקסיפי.

הסימנים כוללים הצהבת העור והעיניים, שתן בצבע חום כהה, כאב או התנפחות בצד ימין של הבטן הימניה, כאב במפרקי, פריחה בעור או חום באיקסיפי.

ספירת דם נמוכה

בחלק מהמטופלים המקבלים אינפליקסימאב, הגוף עלול לא לייצר מספיק תאי דם שעוזרים להילחם בזיהומים או שעוזרים לעצור זיהומם.

ספר לרופא מייד אם יש לך תסמנים של ספירת דם נמוכה במהלך הטיפול באיקסיפי. הסימנים כוללים חום שיעול, זיהום או צהבת שקורית ביתר קלות, כתמים קטנים אדומים או גמולים הנגרמים מדימום מתחת לעור או מקצוץ.

רוב תופעות הלוואי קלות יחסית ועד בינוניות. עם זאת, מטופלים מסוימים עלולים לסבול מתופעות לוואי חמורות, וייתכן שהם יזדקקו לקבל טיפול. תופעות

הפרעה במערכת החיסון

בתרופות נגד שחפת לפני שתחיל להשתמש באיקסיפי.

דווח מיד לרופא אם מופיעים סימנים של שחפת במהלך הטיפול באיקסיפי.

הסימנים האלה כוללים שיעול מתמשך, ירידה במשקל, הרגשת עייפות, חום, הזעות לילה.

לפני שאתה מקבל את הטיפול באיקסיפי, ספר לרופא אם אתה נשא של הפטיטיס B או אם אי פעם סבלת מהפטיטיס B.

ספר לרופא אם אתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון להידבק צהבת נגיפית מסוג B.

התרופה אינה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים.

תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במידוח יש ליידיע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח או אם לקחת בעבר.

תרופות אחרות במחלות דלקתיות. התרופות האלה יכולות לגרום לתופעות לוואי. הרופא ייעץ לך באילו תרופות אחרות עליך להמשיך להשתמש בעת שאתה מקבל טיפול באיקסיפי.

תרופות לטיפול במחלת קרוהן, דלקת כיבית של המעי הגס (ulcerative colitis), דלקת מפרקים שיגרנית (rheumatoid arthritis), דלקת חוליות מקשתת (ankylosing spondylitis), דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis), ספחת (psoriasis).

במידוח ספר לרופא אם אתה משתמש באחת מהתרופות הבאות:

תרופות משמפיעות על המערכת החיסונית.

קינרט (kineret) (שמכילה אנקירנה – anakinra). אין להשתמש באיקסיפי וקינרט בו-זמנית.

אורנסיה (orencia) (שמכילה אבטסופט – abatacept). אין להשתמש באורנסיה ובאורנסניה באינפסיפי.

בזמן הטיפול באיקסיפי, אסור לך לקבל חיסונים "חיים".

אם את מתקנה או בהריון, חשוב ליידיע את רופא הילדים הצעות הרפואי שאת נוסלת איקסיפי לפני שיתונקן מקבל חיסון כלשהו.

היריון, הנקה ופוריות

עליך להתייעץ עם רופא לפני השימוש בתרופה זו אם את בהריון או מיניקה.

חושבת שאת טופלו בינוסימאב-6מרקפטופורין) , בנוסף חוסמי TNF (אתזופורין) או 6-mercaptopurine (מרקפטופורין), בנוסף חוסמי TNF מספר חולים שאת טופלו באינפליקסימאב פיתחו גומים מסימים של סרטן המהלך הריונון או במהלך ההנקה רק אם הרופא חושב שהדבר הכרחי עבורך.

יש להימנע מלהיכנס הריונון במהלך השימוש באיקסיפי ובמהלך 6 חודשים לאחר הפסקת הטיפול. היועוצי ברופא בנוגע לשימוש באמצעי מניעה במהלך תקופה זו.

אם קיבלת איקסיפי במהלך הריונון, תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות בזיהום.

חשוב לידע את הרופא של תינוקך ואנשי צוות רפואי אחרים בנוגע לשימוש שנקראת מחלת הריינון או מתנבנת למינע הקבול חיסון.
אם קיבלת איקסיפי במהלך חולים מטופלים הנוטלים BCG (המשמש למנע שחפת) לתינוקך תוך 12 חודשים מהלידה עלול לגרום לזיהום עם סיבוכים חמורים, כולל מוות. אין לתת חיסונים "חיים", כדוגמת חיסון BCG. לתינוקך במשך 12 חודשים אחרי הלידה אלא אם הרופא של תינוקך ממליץ אחרת. למידע נוסף ראי טופף "חיסונים".

אם את מיניקה, חשוב ליידיע את רופא הילדים והצוות הרפואי שאת נוסלת איקסיפי לפני שיתונקן מקבל חיסון כלשהו.
אין לתת חיסונים חיים לתינוקך בזמן שאת מיניקה, אלא אם הרופא של תינוקך ממליץ אחרת.
בילודים שנולדו לנשים שטופלו באינפליקסימאב במהלך הריונון, דווח על זיהומים מסוגים מסוימים של סרטן העור. אם ישנם שישוים לבלשה בעור או בגידולים על העור במהלך הטיפול או לאחר חיסונו. דווח לרוכא.

הגייה ושימוש במכונות

לא סביר שאיקסיפי תשפיע על היכולת שלך לנהוג, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות. אם אתה חושש עייפות, סחרחורת או חש לא טוב לאחר קבלת הטיפול באיקסיפי, אל תנהג ואל שתשתמש בכלים או במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה פחות מ– 23 מ"ג נתרן למנה, כלומר, למעשה היא "נטולת נתרן".

אלום, לפני שאיקסיפי ינותנן לך היא מעורבתת עם תמיסה המכילה נתרן. ספר לרופא אם אתה בדיאטה דלת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

איקסיפי ניתנן לך על ידי רופא או אחות, בבית חולים או במרפאה.

הרופא או אחות יכינז את תמיסת התכשיר לעירוי.

תמיסת איקסיפי ניתנת לך בעירוי (טפטוף) (במשך שעתיים) לתוך אחד הוורידים, בדרך כלל בבוער.
לאחר הטיפול שלילשי ייתכן שהרופא יחליט לתת לך את מנת התכשיר במשך שעה אחת בלבד.

אתה תהיה תחת מעקב רפואי בעת שאתה מקבל איקסיפי וכן למשך שעה עד שעתיים לאחר מכן.

ספר לרופא אם קיבצת לאחרונה (ב"ג"ג) ובאיזו תדירות תקבל איקסיפי בהתאם לדלקת מרפאים (כגון חיסון BCG המשמש לטיפול בסרטן).

ניתוחים או הליכים דנטליים

ספר לרופא אם אתה עומד לעבור ניתוח או הליך דנטלי כלשהו.
ספר למנתח או לרופא השיניים שאתה מקבל טיפול באיקסיפי, והראה להם את "כרטיס מידע בטיחותי למטופל" שלך.

בעיות כבד

חלק מהמטופלים המקבלים אינפליקסימאב פיתחו בעיות כבד חמורות.
ספר לרופא מייד אם חווית תסמינים של בעיות כבד במהלך הטיפול באיקסיפי.

הסימנים כוללים הצהבת העור והעיניים, שתן בצבע חום כהה, כאב או התנפחות בצד ימין של הבטן הימניה, כאב במפרקי, פריחה בעור או חום באיקסיפי.

ספירת דם נמוכה

בחלק מהמטופלים המקבלים אינפליקסימאב, הגוף עלול לא לייצר מספיק תאי דם שעוזרים להילחם בזיהומים או שעוזרים לעצור זיהומם.

ספר לרופא מייד אם יש לך תסמינים של ספירת דם נמוכה במהלך הטיפול באיקסיפי. הסימנים כוללים חום שיעול, זיהום או צהבת שקורית ביתר קלות, כתמים קטנים אדומים או גמולים הנגרמים מדימום מתחת לעור או מקצוץ.

רוב תופעות הלוואי קלות יחסית ועד בינוניות. עם זאת, מטופלים מסוימים עלולים לסבול מתופעות לוואי חמורות, וייתכן שהם יזדקקו לקבל טיפול. תופעות

לוואי שישות להופיע עם הז לאחר הפסקת הטיפול באיקסיפי.

פנה מיד לרופא אם הבנת באחד מהסימנים הבאים:

סימנים של תגובה אלרגית, כגון התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה או הגרון שעלולה לגרום לקושי בליעיה או בנשימה, פריחה בעור, סרפדת, התנפחות של הידיים, הרגליים או הקרסוליים.
חלק מהתגובות הללו עלולות להיות חמורות או מסכנות חיים. תגובה אלרגית יכולה להתרחש תוך שעתיים מקבלת הזריקה או מאוחר יותר.
סימנים נוספים לתופעות לוואי של אלרגיה עלולות להתרחש עד 12 ימים לאחר קבלת הזריקה כוללות כאב שרירים, חום, כאב בולסת או במפרקים, כאב גרון או כאב ראש.

סימנים של בעיות לב, כגון אי נוחות או כאב בחזה, כאב בזרוע, כאב בטן, קוצר נשימה, חרדה, סחרחורת קלה, סחרחורת, עילפון, הזעה, בחילה (הרגשת חולי), הקאה, הרגשת פרפורים או דפיקות לב בחזה, קצב לב מהיר או איטי והתנפחות של הרגליים.

סימנים של זיהום (כולל שחפת), כגון חום, תחושת עייפות, שיעול שעלול להתמשך, קוצר נשימה, תסמינים דמויי־שפעת, ירידה במשקל, הזעות לילה, שלשול, פצעים, הצטברות של מוגלה בתמיים או מסכבי לפי הטבעת לוואי.
הרופא ייעץ לך באילו תרופות אחרות עליך להמשיך להשתמש בעת שאתה מקבל טיפול באיקסיפי.

תרופות לטיפול במחלת קרוהן, דלקת כיבית של המעי הגס (ulcerative colitis), דלקת מפרקים שיגרנית (rheumatoid arthritis), דלקת חוליות מקשתת (ankylosing spondylitis), דלקת מפרקים ספחתית (psoriatic arthritis), ספחת (psoriasis).

סימנים של בעיות במערכת העצבים (כולל בעיות בעיניים), כגון סימנים נכבד (חוסר תחושה פתאומי או חולשה בפנים, בזרוע או ברגל, במיוחד בצד אחד של הגוף); ירידה בתאומ, בעיות דיבור או בנהג; בעיות ראייה או אחת או בשתי העיניים, בעיות הליכה, סחרחורת, אובדן שיויו משקל או תיאום (קואורדינציה) או כאב ראש חמור), פרסוכים, עקצוץ/חוסר תחושה בחלקי גוף שונים או חולשה בזרועות או ברגליים, שישוים בראייה, נון הרישה בחלקי גוף שונים או חולשה בזרועות או ברגליים, שישוים בראייה, נחזור באיסיפי כפולה או בעיות עיניים אחרות.

סימנים של בעיות במערכת הע