

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## **דפראסירוקס טבע 125 מ"ג**

### **טבליות מסיסות**

כל טבליה מסיסה מכילה:

דפראסירוקס 125 מ"ג Deferasirox 125 mg

## **דפראסירוקס טבע 250 מ"ג**

### **טבליות מסיסות**

כל טבליה מסיסה מכילה:

דפראסירוקס 250 מ"ג Deferasirox 250 mg

## **דפראסירוקס טבע 500 מ"ג**

### **טבליות מסיסות**

כל טבליה מסיסה מכילה:

דפראסירוקס 500 מ"ג Deferasirox 500 mg

**למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".**

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. או לטיפול במחלה של הילד/ה שלך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

## **1. למה מיועדת התרופה?**

- לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל (Iron Overload) הנגרם מעירווי דם, במבוגרים ובילדים (מגיל שנתיים ומעלה).
- לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל שאינו תלוי בעירווי דם בחולי תלסמיה מגיל 10 שנים ומעלה.

### **קבוצת תרפויטית: קושרי ברזל (Iron chelating agent)**

עירווי דם חוזרים נדרשים לעיתים בחולים הסובלים מסוגים מסוימים של אנמיה כגון תלסמיה, אנמיה חרמשית ותסמונות מיאלודיספלסטיות (myelodysplastic syndrome [MDS]). אולם, עירווי דם חוזרים עלולים לגרום להצטברות של עודף ברזל. זאת מאחר ודם מכיל ברזל ולגוף אין דרך טבעית לסלק את עודף הברזל המתקבל עם עירווי הדם.

בחולי תלסמיה שאינם תלויים בעירווי דם, עומס ברזל עלול להתפתח במשך הזמן בעיקר עקב ספיגה מוגברת של ברזל ממזון כתגובה לספירות נמוכות של תאי דם. במשך הזמן, הברזל העודף יכול לגרום נזק לאיברים חיוניים כגון הכבד והלב. תרופות מסוג iron chelators (קושרי ברזל) משמשות לסילוק הברזל העודף ומפחיתות את הסיכון לגרימת נזק לאיברי הגוף. דפראסירוקס טבע לוכדת ומסלקת עודף ברזל אשר לאחר מכן מופרש בעיקר בצואה.

## **2. לפני השימוש בתרופה**

### **אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) ל-דפראסירוקס (Deferasirox) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המופיעים בסעיף 6 "מידע נוסף". אם הדבר רלוונטי לגביך, **ספר לרופא שלך לפני נטילת דפראסירוקס טבע**. אם אתה חושב שאתה אלרגי, התייעץ עם הרופא.
- יש לך מחלת כליות בינונית או חמורה.
- אתה נוטל כעת תרופה אחרת מסוג Iron chelator (קושרי ברזל).

### **דפראסירוקס טבע אינה מומלצת אם**

- יש לך תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS:ירידה בייצור תאי הדם על ידי מח העצם) בשלב מתקדם או סרטן מתקדם

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

#### **לפני הטיפול בדפראסירוקס טבע, ספר לרופא אם:**

- יש לך בעיה בכבד או בכליות.
  - אתה סובל מבעיה בלב שנגרמה מעומס ברזל.
  - אתה מבחין בירידה משמעותית במתן שתן (סימן לבעיה בכליות).
  - יש לך פריחה חמורה, או קשיי נשימה וסחרחורת או נפיחות בעיקר של הפנים והגרונ (סימנים של תגובה אלרגית חמורה, ראה גם בסעיף 4 "תופעות לוואי").
  - יש לך שילוב של כל אחד מהתסמינים הבאים: פריחה, עור אדום, שלפוחיות על השפתיים, העיניים או הפה, קילוף של העור, חום גבוה, תסמינים דמויי שפעת, קשרי לימפה מוגדלים (סימנים של תגובת עור חמורה, ראה גם בסעיף 4 "תופעות לוואי").
  - אתה חש שילוב של נמנום, כאב בצד העליון הימני של הבטן, הצהבה או עלייה בהצהבת העור או העיניים ושתן כהה (סימנים של בעיות בכבד).
  - אתה חווה קשיים בחשיבה, בזיכרון של מידע או בפתרון בעיות, מרגיש פחות ערני או מודע לסביבה, או מרגיש ישנוני מאוד עם אנרגיות ירודות (סימנים של רמה גבוהה של אמוניה בדם, אשר עשויה להיות קשורה לבעיות בכבד או בכליות, ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").
  - אתה מקיא דם ו/או יש לך צואה שחורה.
  - יש לך כאב בטן תדיר, בייחוד לאחר אכילה או נטילת דפראסירוקס טבע.
  - יש לך צרבות תדירות.
  - יש לך ספירת טסיות או תאי דם לבנים נמוכה בבדיקות דם.
  - יש לך טשטוש ראייה.
  - יש לך שלשול או הקאות.
- אם אחד מהמצבים האלה רלוונטי לגביך, ספר לרופא מיד.

### **אוכלוסיה מבוגרת (בגיל 65 שנים ומעלה)**

- אנשים מבוגרים בגיל 65 ומעלה יכולים להשתמש באותה מנת דפראסירוקס טבע כמו שאר המבוגרים. מטופלים קשישים עלולים לחוות יותר תופעות לוואי (בעיקר שלשול) ממטופלים צעירים יותר. הם צריכים להיות במעקב צמוד על-ידי הרופא שלהם לאיתור של תופעות לוואי אשר עשויות לדרוש התאמת מינון.

## ילדים ומתבגרים

ניתן להשתמש בדפראסירוקס טבע בילדים ובמתבגרים מגיל שנתיים ומעלה לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל (Iron Overload) הנגרם מעירווי דם ומגיל 10 שנים ומעלה לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל שאינו תלוי בעירווי דם בחולי תלסמיה. הרופא יתאים את המינון בהתאם לגדילת הילד. דפראסירוקס טבע אינה מיועדת לשימוש מתחת לגיל שנתיים.

## בדיקות ומעקב

- במהלך הטיפול עליך לעבור בדיקות דם ושתן באופן סדיר. בדיקות אלו ינטרו את כמות הברזל בגופך (רמות פריטין בדם) כדי לבחון האם דפראסירוקס טבע משפיעה כנדרש.
- הבדיקות גם יעקבו אחר תפקודי הכליות (רמות קראטינין בדם, נוכחות חלבון בשתן) ותפקודי הכבד (רמות טרנסאמינאזות בדם, בילירובין ואלקליין פוספטאז), הרופא עשוי לבקש ממך לבצע ביופסיה של הכליה, במקרה בו הוא חושד בפגיעה כלייתית משמעותית.
- ייתכן שתעבור גם בדיקות MRI (הדמיה בתהודה מגנטית) על מנת לקבוע את כמות הברזל בכבד שלך. הרופא יתחשב בבדיקות אלו כאשר יחליט על המינון של דפראסירוקס טבע המתאים ביותר עבורך וכן ישתמש בבדיקות אלו כדי להחליט מתי עליך להפסיק ליטול דפראסירוקס טבע.
- עליך לעבור בדיקות שמיעה וראייה לפני תחילת הטיפול ופעם בשנה במהלך הטיפול כאמצעי זהירות.

## אינטראקציות / תגובות בין תרופתיות:

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

אין לשלב לקיחת דפראסירוקס טבע עם תכשירים קושרי ברזל נוספים. אין ליטול תרופות נוגדות חומצה (תרופות המשמשות לטיפול בצרבת) המכילות אלומיניום, באותו הזמן ביום עם דפראסירוקס טבע.

## במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (משמש למניעת דחיית איבר מושתל או במצבים אחרים, לדוגמה דלקת מפרקים שגרונתית או אסתמה של העור)
  - סימבסטטין (משמש להורדת כולסטרול)
  - משככי כאבים מסוימים או תרופות נוגדות דלקת (לדוגמה, אספירין, איבופרופן, קורטיקוסטרואידים)
  - ביספוספונטים במתן דרך הפה (משמשים לטיפול באוסטיאופורוזיס)
  - תרופות נוגדות קרישה (משמשות למניעה או לטיפול בהיווצרות קרישי דם)
  - אמצעי מניעה הורמונליים (תכשירים למניעת הריון)
  - בפרידיל, ארגוטאמין (משמשות לטיפול בבעיות בלב ובמיגרנות)
  - רפאגליניד (משמש לטיפול בסוכרת)
  - ריפאמפיצין (משמש לטיפול בשחפת)
  - פניטואין, פנוברביטל, קרבמזפין (משמשים לטיפול באפילפסיה)
  - ריטונאויר (משמש לטיפול בזיהום HIV)
  - פאקליטקסל (משמש לטיפול בסרטן)
  - תיאופילין (משמש לטיפול במחלות נשימה כגון אסתמה)
  - קלזופין (משמש לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות כגון סכיזופרניה)
  - טיזנידין (משמש כמרפה שרירים)
  - כולסטיראמין (משמש להורדת רמות כולסטרול בדם)
  - בוסולפן (משמש כטיפול לפני ההשתלה על מנת להרוס את מוח העצם המקורי לפני ההשתלה)
  - מידאזולאם (משמש להקל על חרדה ו/או קושי לישון)
- יתכן שידרשו בדיקות נוספות על מנת לנטר את רמתן של חלק מהתרופות בדמך.

### שימוש בתרופה ומזון

- יש ליטול דפראסירוקס טבע על קיבה ריקה ולחכות לפחות 30 דקות לפני אכילת מזון כלשהו, עדיף בזמן קבוע בכל יום.
- יש למוסס את הטבליות בכוס מים, מיץ תפוחים או מיץ תפוזים.
- אין למוסס את הטבליות במשקאות תוססים או בחלב (ראה גם להלן "כיצד ליטול דפראסירוקס טבע").

### היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שייכתן שאת בהיריון או מתכננת להרות יש להיוועץ ברופא, לפני השימוש בתרופה. דפראסירוקס טבע אינה מומלצת בזמן היריון אלא אם הינה הכרחית בבירור. אם את משתמשת באמצעי הורמונלי למניעת היריון עלייך להשתמש באמצעי מניעה נוסף או אחר (כגון קונדום), כיוון שדפראסירוקס טבע עלולה לפגום ביעילות של אמצעי המניעה ההורמונליים. הנקה אינה מומלצת במהלך הטיפול בדפראסירוקס טבע

### נהיגה ושימוש במכונות

אם אתה מרגיש סחרחורת לאחר נטילת דפראסירוקס טבע, אין לנהוג ברכב או להפעיל כלים או מכונות עד שהרגשתך תהיה שוב תקינה. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

#### לקטוז:

- טבליות דפראסירוקס טבע מכילות לקטוז (סוכר חלב). אם יש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, ידע את הרופא לפני נטילת דפראסירוקס טבע.
- כל טבליה מסיסה של דפראסירוקס טבע 125 מ"ג: מכילה כ- 85 מ"ג לקטוז מונוהידרט.
  - כל טבליה מסיסה של דפראסירוקס טבע 250 מ"ג: מכילה כ- 170 מ"ג לקטוז מונוהידרט.
  - כל טבליה מסיסה של דפראסירוקס טבע 500 מ"ג: מכילה כ- 341 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

#### נתרן:

התרופה מכילה פחות מ 1 מילימול ( 23 מ"ג) נתרן בכל טבליה מסיסה ולכן נחשבת למעשה נטולת נתרן.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. הטיפול בדפראסירוקס טבע יבוצע בפיקוח של רופא המנוסה בטיפול בעודף ברזל.

#### המינון המקובל:

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון של דפראסירוקס טבע קשור למשקל הגוף בכל המטופלים. הרופא יחשב את המינון שאתה צריך ויאמר לך כמה טבליות ליטול בכל יום. המינון היומי המקובל בדרך כלל בתחילת הטיפול הינו:
- למטופלים המקבלים עירוויי דם באופן סדיר - 20 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף. יתכן שהרופא שלך ימליץ על מינון התחלתי גבוה יותר או נמוך יותר בהתבסס על צרכי הטיפול האישיים שלך.
  - למטופלים שאינם מקבלים עירוויי דם באופן סדיר - 10 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף.
- בהתאם לתגובתך לטיפול, הרופא יכול מאוחר יותר להתאים לך את הטיפול עם מנה גבוהה או נמוכה יותר.

המינון היומי המרבי הינו:

- 40 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף למטופלים המקבלים עירויי דם באופן סדיר.
- 20 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף למטופלים מבוגרים שאינם מקבלים עירויי דם באופן סדיר.
- 10 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף לילדים עד גיל 18 שנים שאינם מקבלים עירויי דם באופן סדיר.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**משך הטיפול:**

**יש להמשיך ליטול דפראסירוקס טבע כל יום, כל זמן שהרופא מורה לך לעשות זאת.** טיפול זה הוא טיפול ממושך, ויתכן כי יימשך חודשים או שנים. הרופא יעקוב אחר מצבך באופן קבוע כדי לוודא שהטיפול משפיע עליך באופן הרצוי (ראה גם סעיף 2: "בדיקות ומעקב"). אם יש לך שאלות לגבי משך הטיפול, פנה לרופא.

**צורת נטילה:**

**מתי ליטול דפראסירוקס טבע?**

. יש ליטול דפראסירוקס טבע פעם ביום, כל יום, בערך באותו הזמן.  
. יש ליטול את הטבליות על קיבה ריקה ולהמתין לפחות 30 דקות לפני אכילת מזון כלשהו.  
נטילת דפראסירוקס טבע באותו זמן בכל יום תעזור לך לזכור מתי ליטול את הטבליות.

**כיצד ליטול דפראסירוקס טבע?**


יש להכניס את הטבליה/ות לתוך כוס מים, מיץ תפוחים או מיץ תפוזים (100-200 מ"ל).



יש לערבב עד שהטבליה/ות מתמוססות/ות לחלוטין. הנוזל בכוס יראה עכור.



יש לשתות את כל תוכן הכוס, ואז להוסיף מעט מים או מיץ למה שנותר בכוס, לערבב ולשתות גם את זה.



אין למוסס את הטבליות במשקאות תוססים או בחלב.  
אין ללעוס, לשבור או לכתוש את הטבליות, אין לבלוע את הטבליות בשלמותן.  
בכל שאלה לגבי כיצד דפראסירוקס טבע פועלת או מדוע נרשמה עבורך, יש לפנות לרופא או לרוקח.

**אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד או אדם אחר מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך. ייתכן כי יהיה צורך בטיפול רפואי דחוף.  
אתה עלול לחוות תופעות כגון כאב בטן, שלשול, בחילה והקאה ובעיות בכליות או בכבד היכולות להיות רציניות.

#### **אם שכחת ליטול את התרופה:**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, קח את המנה ברגע שנזכרת באותו היום. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה ביום הבא על מנת לפצות על הטבליה/ות שנשכחה/ו.  
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

#### **אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:**

אין להפסיק את הטיפול בדפראסירוקס טבע ללא הוראה מפורשת מהרופא. אם תפסיק לקחת דפראסירוקס טבע, הברזל העודף לא יסולק עוד מגופך (ראה גם לעיל "משך הטיפול").

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

## **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בדפראסירוקס טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.  
רוב תופעות הלוואי הינן קלות עד מתונות ובדרך כלל יחלפו לאחר מספר ימים עד מספר שבועות של טיפול.

#### **תופעות לוואי מסוימות עשויות להיות רציניות ודורשות טיפול רפואי מיידי.**

תופעות לוואי אלה הינן לא שכיחות (עלולות להשפיע על עד מטופל 1 בכל 100 מטופלים) או נדירות (עלולות להשפיע על עד מטופל 1 מתוך 1000 מטופלים).

## **יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות לרופא מיד אם אחד המקרים הבאים חל עליך או על ילדך:**

- פריחה חמורה או קשיי נשימה וסחרחורת או נפיחות בעיקר של הפנים והגרונ (סימנים של תגובה אלרגית חמורה)
- שילוב של כמה מהתסמינים הבאים: פריחה, עור אדום, שלפוחיות בשפתיים, בעיניים או הפה, קילוף של העור, חום גבוה, תסמינים דמויי שפעת, קשירי לימפה מוגדלים (סימנים של תגובה עורית חמורה)
- ירידה משמעותית במתן שתן (סימן לבעיה בכליות)
- שילוב של נמנום, כאב בצד העליון הימני של הבטן, הצהבה או עלייה בהצהבת העור או העיניים ושתן כהה (סימנים של בעיות בכבד)
- קושי לחשוב, לזכור מידע או לפתור בעיות, ערנות או מודעות מופחתת, או ישנוניות עם אנרגיות ירודות (סימנים של רמה גבוהה של אמוניה בדם, אשר עשויה להיות קשורה לבעיות בכבד או בכליות ולהביא לשינוי בתפקוד המוח)
- הקאה דמית ו/או צואה שחורה
- כאבי בטן תדירים, בייחוד לאחר אכילה או נטילה של דפראסירוקס טבע
- צרבות תדירות
- אובדן ראייה חלקי
- כאב חמור בבטן עליונה (דלקת לבלב).

## **תופעות לוואי מסוימות עשויות להפוך לרציניות. תופעות לוואי אלה הן לא שכיחות.**

- ### **יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:**
- אתה סובל מראייה מטושטשת או מעורפלת
  - אתה סובל מירידה בשמיעה

### **תופעות לוואי נוספות:**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר ממטופל 1 בכל 10 מטופלים):**

- בדיקות הקשורות לתפקוד הכליה שאינן תקינות

**תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד מטופל 1 בכל 10 מטופלים):**

- הפרעות במערכת העיכול כגון בחילה, הקאה, שלשול, כאב בטן, נפיחות, עצירות, קשיי עיכול
  - פריחה
  - כאב ראש
  - בדיקות הקשורות לתפקוד הכבד שאינן תקינות
  - גרד
  - בדיקות שתן שאינן תקינות (חלבון בשתן)
- אם אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות משפיעות עליך באופן חמור, פנה לרופא.

## תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על עד מטופל 1 בכל 100 מטופלים):

- סחרחורת
- חום
- כאב בגרון
- נפיחות בזרועות או ברגליים
- שינוי בצבע של העור
- חרדה
- הפרעות בשינה
- עייפות

אם אחת מהתופעות הנזכרות למעלה הבאות משפיעה עליך באופן חמור, פנה לרופא.

## תופעות לוואי עם שכיחות שאינה ידועה (לא ניתן להעריך את השכיחות מהנתונים הקיימים):

- ירידה במספר תאי הדם המעורבים בקרישת דם (טרומבוציטופניה), במספר תאי הדם האדומים (אנמיה חמורה), במספר תאי הדם הלבנים (נויטרופניה) או במספר כל סוגי תאי הדם (פאנציטופניה)
- נשירת שיער
- אבנים בכליות
- תפוקת שתן נמוכה
- קרע בקיבה או בדופן המעי העלולים לגרום לכאבים ולבחילה
- כאב חמור בבטן עליונה (דלקת בלב).  
• רמה חריגה של חומצה בדם

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

### דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- אין להשתמש באריזה פגומה, או בעלת סימנים של חבלה. אין להשליך תרופות דרך שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. פעולות אלה יסייעו להגן על הסביבה.



## **6. מידע נוסף**

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, crospovidone, microcrystalline cellulose (avicel PH 113), microcrystalline cellulose (avicel PH 112), povidone, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, colloidal silicon dioxide.

### **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

דפראסירוקס טבע משווקת בצורת טבליות מסיסות בגודל אריזה של 30 טבליות.

- דפראסירוקס טבע 125 מ"ג : טבליה עגולה ושטוחה בצבע לבן – בז' בצידה האחד מוטבע המספר "77" ובצידה השני מוטבע המספר "438"
- דפראסירוקס טבע 250 מ"ג : טבליה עגולה ושטוחה בצבע לבן – בז' בצידה האחד מוטבע המספר "77" ובצידה השני מוטבע המספר "439"
- דפראסירוקס טבע 500 מ"ג : טבליה עגולה ושטוחה בצבע לבן – בז' בצידה האחד מוטבע המספר "77" ובצידה השני מוטבע המספר "440"

### **שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:**

טבע ישראל בע"מ

רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

### **העלון נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות**

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

דפראסירוקס טבע 125 מ"ג : 161-12-34651

דפראסירוקס טבע 250 מ"ג : 161-13-34650

דפראסירוקס טבע 500 מ"ג : 161-14-34653

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.