

## فينتورا 600 ميكروغرام

أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد)  
للإعطاء عن طريق الأنسجة المخاطية لجوف الفم

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

فنتانيل (كسيترات) 600 ميكروغرام

Fentanyl (as citrate) 600 microgram

## فينتورا 100 ميكروغرام

أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد)  
للإعطاء عن طريق الأنسجة المخاطية لجوف الفم

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

فنتانيل (كسيترات) 100 ميكروغرام

Fentanyl (as citrate) 100 microgram

## فينتورا 800 ميكروغرام

أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد)  
للإعطاء عن طريق الأنسجة المخاطية لجوف الفم

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

فنتانيل (كسيترات) 800 ميكروغرام

Fentanyl (as citrate) 800 microgram

## فينتورا 200 ميكروغرام

أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد)  
للإعطاء عن طريق الأنسجة المخاطية لجوف الفم

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

فنتانيل (كسيترات) 200 ميكروغرام

Fentanyl (as citrate) 200 microgram

## فينتورا 400 ميكروغرام

أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد)  
للإعطاء عن طريق الأنسجة المخاطية لجوف الفم

التركيب:

يحتوي كل قرص على:

فنتانيل (كسيترات) 400 ميكروغرام

Fentanyl (as citrate) 400 microgram

المعلومات عن المركبات غير الفعالة ومواد الحساسية أنظر الفقرة 2 - «معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء» والفرقة 6 - «معلومات إضافية».

إن النشرة بتعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للإستخدام لدى أطفال ومرأهقين دون عمر 18 سنة.

إن تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة البنزوديازيبينات، أدوية أخرى مثبتة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول قد يؤدي إلى الشعور بميول شديد للنوم، صعوبات في التنفس (تشبيث تنفسى)، سبات وموت.

قد تؤدي الأدوية من فصيلة أفيونيات المفعول إلى الإدمان، خاصة بالإستعمال المطول، ومن المحتمل إساءة إستعمالها وأن تسبب فرط الجرعة الدوائية. إن رد الفعل لفرط الجرعة الدوائية يمكن أن يتمثل بتنفس بطيء لا بل حدوث وفاة. تأكيد من معرفتك لاسم الدواء، العيار الدوائي الذي تتناوله، وتيرة الإعطاء، فترة العلاج، الأعراض الجانبية والمخاطر المحتملة. معلومات إضافية عن خطورة التعلق والإدمان بالإمكان إيجادها في الرابط:

[https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids\\_ar.pdf](https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf)

### (1) لأى غرض مخصوص الدواء

لعلاج الألم الإختراقى لدى كبار مرضى بالسرطان، الذين يتعالجون حالياً بشكل دائم بأدوية أخرى أفيونية المفعول لألم السرطان المستمر (الآن). إن الألم الإختراقى هو ألم إضافي ومجاوى الذى يظهر بالرغم من إستعمالك الدائم لدواء أفيونى المفعول لتسكين الألم.

الفصيلة العلاجية: مسكنات آلام أفيونية المفعول.

### (2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت لا تستعمل بشكل يومي، لمدة أسبوع على الأقل، مسكنات الآلام أفيونية المفعول للسيطرة على الألم المستمر (مثل كوديين، فنتانيل، هيدروموفون، مورفين، أوكسيكونون، بيتدين). إذا كنت لا تستعمل بشكل دائم مسكنات الآلام أفيونية المفعول فيمنع عليك إستعمال فنتانيل لأن ذلك قد يزيد من الخطورة بأن يصبح التنفس بطيناً أو سطحياً بشكل خطير أو حتى لتوقيف التنفس.
- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة فنتانيل أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 - «معلومات إضافية»).

• كنت تعاني من صعوبات خطيرة في التنفس أو من أمراض رئوية إنسدادية خطيرة.

• كنت تعاني من ألم قصير الأمد الذي هو ليس ألم إختراقى.

• كنت تتناول دواء يحتوي على صوديوم أوكسبيات (sodium oxybate).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

عليك الإستمرار في تناول الدواء المخصص لتسكين ألم السرطان المستمر أثناء إستعمال فينتورا. أثناء فترة العلاج بـ فينتورا لا يجوز إستعمال أدوية أخرى حاوية على كيافية التخلص من أدوية لم تتد بجاجتها. بمحوزتك أدوية بهذه فعليك إستشارة الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تتد بجاجتها. معاودة إستعمال الدواء قد تؤدي لنجاعة أقل للدواء (ستعادت عليه) أو قد تصبح متعلق به.

قبل العلاج بـ فينتورا إحك للطبيب إذا:

- لم تحدد بعد الجرعة الدوائية المثلثى للدواء أفيوني المفعول المخصص لتسكين ألم السرطان المستمر.
- كنت تعاني من أي حالة قد تؤثر على الجهاز التنفسى الخاص بك (مثل الربو، صفير، أو ضيق التنفس).
- وجدت لديك نبض بطيء بشكل شاذ أو مشاكل أخرى في القلب.

• وجدت لديك مشكلة في الكبد أو في الكلى، نظراً لأن هذه الأعضاء تؤثر على مسيرة تفكك الدواء في جسمك.

• وجدت لديك قلة في السواط في الدورة الدموية أو إنخفاض في ضغط الدم.

• تجاوزت عمر 65 سنة - من الجائز أن تحتاج الجرعة الدوائية متخصصة أكثر وكل زيادة للجرعة الدوائية تفحص بحذر من قبل طبيب.

• كنت تعاني من مشاكل في القلب، خاصة من نبض بطيء.

• كنت تتناول البنزوديازيبينات (أنظر الفقرة 2 تحت «التداخلات/التفاعلات بين الأدوية»). إن إستعمال البنزوديازيبينات يمكن أن يزيد من احتمالية ظهور أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك الوفاة.

• كنت تستعمل أدوية مضادة للإكتين أو أدوية مضادة للدنهان [مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين [SSRIs]، مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والتورابينغرين [SNRIs]، مثبطات موتوامين أو كسيديان [MAO inhibitors]- أنظر الفقرة 2 تحت «التداخلات/التفاعلات بين الأدوية»]. إن إستعمال هذه الأدوية سوية مع فينتورا يمكن أن يؤدي إلى متلازمة السيروتونين، حالة التي قد تشكل خطراً على الحياة (أنظر الفقرة 2 تحت «التداخلات/التفاعلات بين الأدوية»).

• عانيت في الماضي من قصور الغددتين الكظرتيتين، حالة لا تنتج فيها الغددتين الكظرتيتين هورمونات كافية، أو من نقص في الهرمونات الجنسية (نقص الأندروجينيات) عند إستعمال مستحضرات أفيونية المفعول (أنظر الفقرة 4 تحت «أعراض جانبية خطيرة»).

• بالغت باستخدام أو كنت متعلقاً بالأدوية أو بكل دواء آخر، بالكحول أو بالمخدرات غير القانونية.

• كنت تشرب الكحول (أنظر الفقرة 2 تحت «استعمال الدواء وإستهلاك الكحول»).

يحتاج طبيك إلى فحصك في أولقات متقاربة أكثر إذا:

• كنت أنت أو شخصاً من العائلة قد أسانتما إستعمال أو أدمتما على الكحول، على أدوية توصف بوصفة طبيب أو على المخدرات غير القانونية («إدمان»).

• كنت من المدخنين.

• وجدت لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل في الحالة النفسية لديك (اكتئاب، قلق أو إضطراب في الشخصية) أو عولجت في الماضي لدى طبيب نفسى لوجود أمراض نفسية أخرى.

استشر طببك خلال فترة إستعمال الدواء إذا:

• كنت تقاسي من ألم أو من حساسية زائدة للألم (فرط الحس بالألم) الذي لا يستجيب لمقدار دوائي أكبر من الدواء بحسب ما حدد من قبل طبيب.

• كنت تقاسي مزجاً من الأعراض التالية: غثيان، تقيؤ، إنخفاض حاد في الشهية للطعام، إرهاق، ضعف، دوران وضغط دم منخفض، إن مزدوج هذه الأعراض من شأنه أن يدل على حالة التي قد تشكل خطراً على الحياة المسممة قصور الغدة الكظرية، حالة لا تنتج فيها الغددتين الكظرتيتين ما يكفي من الهرمونات.

• إضطرابات في النوم تتعلق بالتنفس - قد يؤدي فينتورا إلى إضطرابات في النوم تتعلق بالتنفس مثل صعوبة التنفس أثناء النوم (إنقطاع التنفس - apnea) وإلى إنخفاض نسب الأكسجين في الدم (hypoxemia). الأعراض يمكن أن تشمل إنقطاع في التنفس أثناء النوم، الإستيقاظ ليلًا جراء ضيق في التنفس، صعوبة في المفاص على النوم أو ميل مفرط للنوم خلال النهار، إذا لاحظت أنت أو شخص آخر بهذه الأعراض، توجه إلى طبيب. من الجائز أن يدرس طبيك خفض المقدار الدوائي من الدواء.

• إن إستعمال فينتورا مراراً وتكراراً قد يؤدي إلى التعلق وإإساءة الإستعمال، الأمر الذي قد يؤدي إلى إستعمال مقدار دوائي مفرط يشكل خطراً على الحياة، إذا كنت تشك بأنه تطور لديك تعلق بـ فينتورا، فمن المهم جداً استشارة طبيك.

توجه لتلقي مساعدة طبية بشكل فوري إذا:

• كنت تقاسي من أعراض مثل صعوبة في التنفس أو دوار، إنفاسخ اللسان، الشفتين أو الحنجرة خلال إستعمال فينتورا، قد تكون تلك أعراض مبكرة لحدوث ردود فعل تحسسية خطيرة (صدمة إستهدافية، فرط حساسية، أنظر الفقرة 4 تحت «الأعراض الجانبية الخطيرة»).

كيفية التصرف في حال تناول شخص بالخطأ فينتورا

إذا كنت تعتقد بأن شخصاً ما قد تناول بالخطأ فينتورا، فيجب التوجه لتلقي مساعدة طبية بشكل فوري. حاول المحافظة على الشخص يقطنه حتى وصول المساعدة الطبية.

إذا تناول شخص ما بالخطأ فينتورا، فإن الأعراض الجانبية التي من شأنها أن تظهر تكون مشابهة لما هو موصوف في الفقرة 3 تحت «إذا تناول بالخطأ دوائياً أكبر».

الأطفال والمرأهقون

هذا الدواء غير مخصص للإستخدام لدى الأطفال والمرأهقين ما دون عمر 18 سنة.

**4) الأعراض الجانبية**  
كما بكل دواء، إن إستعمال فينتورا قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز أن تتعارى أي منها.

#### أعراض جانبية خطيرة

- الأعراض الجانبية الأكثر خطورة تشمل تنفس سطحي، ضغط دم منخفض، وصدمة (shock). بالمشابه للأدوية الأخرى التي تتحוו على فنتورا قد يسبب مشاكل تنفسية خطيرة التي قد تؤدي للوفاة، إذا كنت تشعر بارهاق شديد أو تعانى من تنفس بطيء / أو سطحي، يتوجب عليك أو على الذي يعنى بك التوجه حالاً إلى الطبيب وإستدعاء علاج طبي طارئ.
- يجب التوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تشعر بمزاج من الأعراض التالية:

غثيان، تقيؤ، تناقص شديد في الشهية للطعام، إرهاق، ضف، دوار وضغط دم منخفض، عندما تظهر هذه الأعراض سوية، فهي يمكن أن تدل على حالة قد تشكل خطراً على الحياة تسمى قصور الغدة الكظرية، حالة لا تنتن فيها الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات.

#### أعراض جانبية اضافية

- أعراض شائعة جداً (تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مالجين)
- دوار، صداع.
- الشعور بغثيان، تقيؤ.
- أعراض تتعلق بمكان الفرض في الفم: ألم، تقرح، تهيج، نزف، قلة شعور، إحمرار، إنفصال أو بقع.

**أعراض جانبية شائعة (تؤثر على حتى 1 من بين 10 مالجين)**

- الشعور بقلق أو إرتباك، إكتئاب، أرق.
- مذاق مختلف، تناقص الوزن.
- غتس، تشوش، إرهاق زائد، ضغط، شقيقة، قلة شعور، إنفصال اليدين أو الرجلين، أعراض الفطام عن الدواء (يمكن أن تجلب بالأعراض الجانبية التالية: غثيان، تقيؤ، إسهال، قلق، قشريرية، رجفة، وترعرق، رجفان، سقوط، قشريرية).
- إمساك، إلتهاب الفم، جفاف الفم، إسهال، حرقان، قلة الشهية للطعام، ألم في البطن، إنزعاج في المعدة، صعوبات في الهضم، ألم في الأسنان، فطر في الفم.
- حكة، تعرق زائد، طفح.
- ضيق التنفس، ألم في الحنجرة.
- إنفصال خلايا الدم البيضاء، إنفصال خلايا الدم الحمراء، إنخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، نبض سريع وشاذ.
- آلام عضلية، ألم في الظهر.
- إرهاق.

**أعراض جانبية غير شائعة (تؤثر على حتى 1 من بين 100 مالجين)**

- ألم في الحنجرة.
- إنفصال خلايا الدم التي تُساهم في مسيرة تخرُّ الداء.
- الشعور بمرار مرهف، عصبية، شعور غريب، الشعور بيقطه الحركة أو حركة عصبية، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هذيان)، تناقص الإدراك، تغير في الحالة النفسية، التعلق (الإدمان على الدواء)، توهان، قلة التركيز، مشاكل في التوازن، الشعور بدوخة، مشاكل في النطق، طفلين في الآذنين، إنزعاج في الآذن.
- إضطرابات أو شووش الرؤية، إحمرار العينين.
- تبخر طي، شاش، هبات الحر.
- صعوبات شديدة في التنفس، إضطرابات في التنفس أثناء النوم.
- واحدة أو أكثر من المشاكل التالية في الفم: تقرح، قلة شعور، إنزعاج، تغير في اللون، إضطراب في أداء النسج الروخ، إضطراب في وظيفة اللسان، ألم أو حويصلات أو تقرحات في اللسان، ألم في اللثة، تشقق الشفتين، مشاكل في الأسنان.
- إلتهاب المري، إنفصال الأعاء، إضطراب في الأداء الوظيفي للممارسة.
- تعرق بارد، إنفصال الوجه، تهيج عام، تساعد شعر، شنج العضل، ضغط العضل، شعور غير جيد، إنزعاج في الصدر، عطش، الشعور ببرودة، الشعور بسخونة، صعوبة في التبول.
- الشعور بوعكة عامة.
- تورٌ.

**أعراض جانبية نادرة (تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 مالجين)**

- إضطرابات في القلب، بقاف الشفتين، تراكم القيح من تحت الجلد في الفم.
- حويصلات في القلب، بقاف الشفتين، شعور غريب في اللسان، رؤية ومضات من الضوء، هشاشة الأظافر.
- ردود فعل تحسسية مثل طفح، إحمرار، إنفصال الشفتين والوجه، تحسس جلدي (شرى).

#### أعراض جانبية بشيوع غير معروفة:

- فقدان الوعي، إنقطاع التنفس، تشنجات.
- قلة الهرمونات الجنسية (قلة الأندروجين).
- التعلق بالأدوية (الإدمان).
- الإستعمال الزائد للأدوية.
- هذيان (الأعراض يمكن أن تشمل مزيج لعدم هدوء، قلة راحة، توهان، إرهاق، خوف، رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، إضطراب في النوم، كوابيس).

• إن الاستعمال المطول لـ فنتانيل خلا فترة العمل قد يسبب أعراض الفطام لدى المولود التي قد تشكل خطراً على الحياة (أنظر الفقرة 2 تحت «الحمل والإرضا»).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة طبيب.

**التلخين عن أعراض جانبية**  
بالإمكان التلخين عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتلخين عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روأة الأطفال و/ أو الرضع، وذلك لتقادري إصابتهم بالتسوس.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى اليوم الآخر من نفس الشهر.

• يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية. يجب حفظه في العلبة الأصلية، وذلك للحماية من الرطوبة.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المحراري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضًا: mannitol, sodium hydrogen carbonate, citric acid, sodium carbonate, sodium starch glycolate (type A), magnesium stearate.

#### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

فينتورا 100 مكг: قرص مستدير، أبيض، مسطوح، ذو أطراف مائلة، مطبوع عليه من جانب واحد «C»، ومن الجانب الثاني مطبوع العدد «1».

فينتورا 200 مكغ: قرص مستدير، أبيض، مسطوح، ذو أطراف مائلة، مطبوع عليه من جانب واحد «C»، ومن الجانب الثاني مطبوع العدد «2».

فينتورا 400 مكغ: قرص مستدير، أبيض، مسطوح، ذو أطراف مائلة، مطبوع عليه من جانب واحد «C»، ومن الجانب الثاني مطبوع العدد «4».

فينتورا 600 مكغ: قرص مستدير، أبيض، مسطوح، ذو أطراف مائلة، مطبوع عليه من جانب واحد «C»، ومن الجانب الثاني مطبوع العدد «6».

الأعراض مبنية ضمن لوبيات، تحوّل كل عبوة على 4 أو 28 قرصاً.

#### من الجائز لا تستوّق كافة أنواع العلبة:

اسم صاحب الإمتحان وعنوانه:

نيفع إسرائيل م. بن،

شارع نتورا هنفيه 124، تل أبيب.

اسم المنتج وعنوانه:

سيفالون إيت، ويست تيشستر، بنسيلفانيا، الولايات المتحدة.

تم إعدادها في تشرين الثاني 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

فينتورا 100 ميكروغرام - أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد): 152.90.34050

فينتورا 200 ميكروغرام - أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد): 152.91.34051

فينتورا 400 ميكروغرام - أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد): 152.92.34052

فينتورا 600 ميكروغرام - أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد): 152.93.34053

فينتورا 800 ميكروغرام - أقراص للإعطاء الشدقي (تحت الخد): 152.94.34054

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

إذا كنت تستعمل أو إذا إستعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدى للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخص إذا كنت تستعمل:

• إن إستعمال فينتورا بشكل متزامن مع الأدوية المهدئة مثل البنزوديازيبينات أو أدوية مشابهة يزيد من خطورة حدوث نعاس، صعوبات في التنفس (تشنج نفسي)، سبات وقد يشكل خطراً على الحياة. لهذا السبب، يجبأخذ الإستعمال المتزامن بالحسبان فقط إذا كانت مع ذلك، إذا وصف لك طبيب فينتورا سوية مع أدوية مهدئة، فيجب أن يكون المقدار الدوائي وفترة العلاج المشتركة محدودين من قبل طبيب.

• بل الطبيب عن كافة الأدوية المهدئة التي تتناولها (مثل الأقراص المنومة، أدوية لعلاج القلق، بعض الأدوية المعالجة لردد الفعل التحسسي [مضادات الـH1 أو الأدوية المهدئة الأخرى]) وقم بمتاعبة توصيات طبيب بشكل حثيث. يوصى بأن تشرح لأصدقائك وأقربائك كيفية تشخيص العلامات والأعراض التي وصفت سابقاً. إنفصل طبيبك عندما تناول فينتورا.

• أدوية مبنية لإرخاء العضلات مثلاً باليوكوفين، بيازابام [أنظر أيضاً الفقرة 2 تحت «تدابير خاصة تتعلق بإستعمال الدواء»].

• أدوية تؤثر على مسيرة تفكك فينتورا على الجسم، مثل رينوفان، تلوفيناثير، أمبريناثير، فوساميرينافير، وفلوكوكنازول، أو فلوتكوكنازول (المعالجة للتلوثات الفطرية)، تروليندوميسين، كلاريتروميسين، أو إريتروميسين [مضادات حيوية لمعالجة التلوثات الجرثومية، أمبيريناثير، ديليزام وقيرابيميل (أدوية لمعالجة إنزيم إنزيماتيكي)].

• أدوية من نوع مثبطات CYP3A4 مثل كيتكوكنازول، إينتراكونازول، أو فلوتكوكنازول (المعالجة للتلوثات الفطرية)، تروليندوميسين، كلاريتروميسين، أو إريتروميسين.

• أدوية من نوع مثبطات إنزيم MAO (المعالجة الإنزيمية) أو مثبطات إنزيم MAO inhibitors (الـMAOIs).

• يبغى الدواء والطعام

• يجب تناول فينتورا قبل أو بعد، لكن ليس خلال، وجبات الطعام، قبل تناول فينتورا بالإمكان شرب القليل من الماء وذلك لترطيب فمك.

• يجب الإيمان عن شرب قصصي الضرر خلال فترة إستعمال فينتورا وذلك لأنه قد يؤثر على مسيرة تفكك فينتورا في الجسم.

• لا يجوز شرب الكحول خلال فترة إستعمال فينتورا، وذلك لأن هذا الأمر قد يزيد من إحتمال حدوث أعراض جانبية خطيرة، بما في ذلك

الحمل والإرضا

• إذا كنت في فترة الحمل، مرضعة، تعتقدين بأنك حامل، أو تفكرين بالحمل، فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.

• لا تستعمل فينتورا خلال فترة طولية خلال الحمل، فهناك خطورة أن تحدث أعراض جانبية لدى المولود التي قد تؤدي إلى الوفاة.

• لا يجوز تناول فينتورا أثناء الولادة وذلك لأن فنتانيل (المادة الفعالة) قد تؤدي لتثبيط جهاز التنفس لدى الرضيع المولود.

• قد يطرب فنتانيل عبر حليب الأم ولذلك فهو قد يسبب أعراضًا جانبية لدى الطفل الرضيع. لا تستعمل فينتورا إذا كنت مرضعة.

• لا يجوز البدء بالإرضا بعد 5 أيام على الأقل من تناول المقدار الدوائي الأخير من فينتورا.

• السياقة وإستعمال الماكينات

• على إستشارة طبيب وذلك لتحديد فيما إذا كان بمقدورك السياقة أو تشغيل الماكينات بعد تناول فينتورا.

• لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات إذا كنت تشعر بالناس أو لديك دوار، تشوش أو إزدواج في الرؤية، أو إذا كنت تستصعب التركيز. من

الهمم أن تعرف كيف تستجيب لإستعمال فينتورا قبل السياقة أو تشغيل الماكينات.

• معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء

• فينتورا 100 مكغ: يحتوي هذا الدواء على 10 ملغم سوديوم (مركب أساسى لملح الطعام/الطاولة) في كل قرص.

• هذه الكمية تساوى 0.5% من الإستهلاك اليومي الأقصى الموصى به من الصوديوم للكبار.

• فينتورا 200 مكغ، 400 مكغ، 600 مكغ، 800 مكغ: يحتوي هذا الدواء على 20 ملغم سوديوم (مركب أساسى لملح الطعام/الطاولة) في كل قرص.

• هذه الكمية تساوى 1% من الإستهلاك اليومي الأقصى الموصى به من الصوديوم للكبار.

• يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغم سوديوم في القرص وبالتالي يعتبر خال من الصوديوم.

• **3) كيفية إستعمال الدواء؟**

• يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار

ال��دار الدوائي ووقتية تناول الدواء.

• مع بدء العلاج بـ فينتورا، كما ينصح الطبيب مساعدتك في تناول الدواء على تناول فينتورا مرة إضافية لمعالجة الألم الإختراقي.

• إن كنت تستعمل فينتورا كـ مكمل لـ فينتورا، وذلك لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر تغيير قدرها أكثر من 4 مرات في اليوم، وذلك لأنه من الجائز أن تحدث تخفيف الألم الإختراقي.

• يجب إلقاء طبب في الحال إذا كنت تستعمل فينتورا أكثر من 4 مرات في اليوم، وذلك لأنه من الجائز أن تحدث تخفيف الألم الإختراقي.

• نظام المقارن الدوائي الخاص بك، من شأن الطبيب أن يقوم بتغيير المقدار الدوائي المتواصل من فينتورا. إذا لم تشعر بتطورات فينتورا خلال فترة ملاعبة المقدار الدوائي.

• يجب إستعمال قرص إضافياً واحداً فقط من فينتورا خلال فترة ملاعبة المقدار الدوائي.

• إنما يجب تغيير المقدار الدوائي من فينتورا وذلك لأن حادث لألم إختراقي، إن تناولت قرصاً واحداً لكل حادث لألم إختراقي.

• يرجى تغيير المقدار الدوائي من فينتورا أو الأدوية المسكتة للألم الأخرى الخاصة بك من تلقاء نفسك. كل تغيير في المقدار الدوائي

يجب أن يكون موثقاً ومرقباً من قبل طبيب.

• لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

• إذا لم تكن واثقاً من المقدار الدوائي المناسب، أو إذا توفرت لديك أسلطة تتعلق بتناول الدواء، عليك مراجعة طبيب.

• آلية الإعطاء

• أقراص فينتورا هي أقراص للإعطاء عن طريق الأنفحة المخاطية لجوف الفم. بعد وضع القرص داخل جوف الفم، يذوب القرص وينتشر على المخاطة.

• الدواء غير مخاطي ينبع من المقدار الدوائي الإختراقي، وذلك لأن المقدار الدوائي يساعد على التخفيف من الألم الإختراقي.

• طريقة التناول

• يجب فتح عبوة البليستير فقط إذا كنت جاهزاً للتناول القرص. يجب إ