

ريتالين 10 ملг أقراص

يحتوي كل قرص على: ميتيل فينيدات هيدروكلورايد 10 ملг
Methylphenidate Hydrochloride 10 mg

- إذا حدث لديك خلال فترة العلاج بـ ريتالين أو بعد التوقف عن العلاج حالات لإنصباب مؤلم للفضوب الذكري والتي تستمر أو تكرر بشكل شاذ، فمن الجائز أن توجه العلاج طبيًا على مشارف من شأن هذا الأمر يبحث بأي فئة من العرض. في حال حدوث ذلك، توجه حالًا إلى الطبيب.
 - إذا كنت تتناول ريتالين مع الأدوية التي ترفع من نسبة السيروتونين في الجسم (أدوية ذات تأثير سيرسيروتونيني، مثلاً سيفترالين وفينيلاكسيفين)، فمن الجائز إعطاء مفاجحة، سخونة متقطعة بشكل غير منتظم، ألم في الصدر (angina)، قصور القلب، مرض قلبي أو مشكلة قلبية خلقية.
 - إذا كنت تتناول ريتالين مع مزج من الأمراض التالية: قلة راحة، جفاف، تقلصات الإنفلونزا، وكانت تعاني من تناول الدواء خلال فترة الحمل.
 - إذا أصبحت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ريتالين، استشيري الطبيب. ينصح معك الطبيب إذا حصلت على الدواء على الجنين وذلك إذا قمت بتناوله خلال فترة الحمل.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين خلال فترة العلاج بـ ريتالين، ينصح معك الطبيب إذا حجزت استعمال ريتالين معهدة الأدوية وتوجه حالًا إلى الطبيب.
 - إذا حجزت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ريتالين، ينصح معك الطبيب إذا حجزت استعمال ريتالين، توجه حالًا إلى الطبيب.
 - إذا حجزت حاملًا خلال فترة العلاج بـ ريتالين، يمكن للمادة الفعالة في ريتالين أن تنتقل إلى حليب الأم.
 - السيادة واستعمال الماكينات**
 - يجب إعلام الطبيب إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة إسقاط الماكينات أو تنفيذ المهام الفيزيائية، توجه حالًا إلى الطبيب.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين، يجب الحصول على تأثير الدواء على الجنين، دوار، تعب، ضبابية الرؤية أو أمراض جانبية أخرى في المخدر وذلك لأن هناك إمكان لحدوث إرتفاع مفاجئ بضغط الدم خلال العملية الجراحية.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين، إذا كنت تتناول ريتالين بجرعه جراحية، فيجب إعلام الطبيب بذلك لأن يكون بالإمكان تناوله.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين، يجب إعلام الطبيب على حضور زيارات المتابعة لدى الطبيب وذلك لأن يكون بالإمكان تناوله.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين، يجب إعلام الطبيب بخصوص ضغط الدم، الطول، الوزن، ويقوم أيضًا بإجراء فحوص المختبرات الأخرى.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين، يجب إعلام الطبيب بخصوص ظهور أمراض جانبية.
 - إذا حجزت استعمال ريتالين، يجب إعلام الطبيب بخصوص دفع فعل سرعة أو الذي قد يشكل خطراً بالنسبة للأطفال، يجب تحديده من ركوب الدراجات أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.
 - معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
 - يحتوي الدواء على الكافتون، إذا أقبل لك من قبل طببك بأن لديك عدم تحمل لسكرات معينة توجه طببك قبل تناول هذا الدواء.
 - يحتوي الدواء على نشاش الحنطة، يحتوي هذا الدواء على نسب منخفضة جدًا من الالبيتونين (من نشاص الحنطة) من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى مشكوك إما وجد لديك مرض السيلياك، إذاً وجدت لديك حساسية للقمح (يشكل مثلك عن مرض السيلياك) فلا يجوز تناول الدواء.
- (3) كيفية إستعمال الدواء؟**
- يجب دائمًا استعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب. عليك الاستبصار من طبيب أو صيدلي إما أن تكون واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
 - **المقدار الدوائي:** المقطرات الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط بحسب احتياجات المُتعالج واستجابته للعلاج.
 - إذا كنت تعتقد بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، يجب استشارة الطبيب لا يجوز تغيير المقدار الدوائي بدون استشارة الطبيب.
 - إذا كنت تعتقد بأن تأثير الدواء أقوى أو أضعف من اللازم، يجب استشارة الطبيب لا يتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
 - **فترحة العلاج:** يجب موافقة تناول ريتالين لفترحة الزمنية التي أوصى بها الطبيب.
 - يساعد هذه الدواء على تنظيم الأعراض لكنه لا يشفى، يقوم الطبيب بفحص تحسنوضع وذلك للتأكد من أن الدواء يعمل كما ينبغي وهو ينافق معك حول السؤال إلى متى يجب الإستمار بالعلاج.
 - إذا كنت غير قادرًا تحدث مع الطبيب.
- فترحة علاج ADHD** تختلف بين معالجة وأخر، خلال فترة علاج ADHD من الجائز أن يوصي الطبيب بالتوقف عن تناول ريتالين بفواصل زمنية معينة (مثلًا في نهاية الأسبوع أو أثناء العطل المدرسية أو العطل الطويل)، وذلك لرؤية فيما إذا كانت هناك حاجة بتناوله حتى الآن. تلك الفواصل في العلاج تساعد أيضًا على منع تباطؤ النمو الذي يحدث أحيانًا عندما يتناول الأطفال هذا الدواء لفترحة من الزمن.
- إذا حدث تناول ريتالين في فترة العلاج بـ ريتالين، توجه حالًا إلى الطبيب.
 - إذا حدث تناول ريتالين أو بديل حساسية زائدة (دوكسياسيز زائدة) لل المادة الفعالة في ميتيل فينيدات أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفضلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية». بعض أمراض رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل ضيق تنفس، صفراء أو صفراء في النفس، إرتفاع الوجه الشفتي، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم، طفح حكة أو طفح حكة (شرى).
 - إذا حجزت استعمال الدواء والطعام، فإن شتان ريتالين أن يؤدي إلى إزعاج في البطن. فقدان الشهية للطعام وصعوبات في النوم، خاصة في بداية العلاج. يمكن أن يساعد الطبيب في تقليل تلك الأعراض وذلك بتحفيض المقدار الدوائي من ريتالين أو بغيره أوقات تناول الأقراص.

قبل إستعمال الدواء

- يجوز إستعمال الدواء:
- إذا كنت حساسًا (دوكسياسيز زائدة) لل المادة الفعالة في ميتيل فينيدات أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفضلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية». بعض أمراض رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل ضيق تنفس، صفراء أو صفراء في النفس، إرتفاع الوجه الشفتي، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم، طفح حكة أو طفح حكة (شرى).
- إذا حجزت استعمال الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.
- فترات من القلق، التوتر أو قلة الهدوء.

٢ قبل إستعمال الدواء

- إذا حجزت حساسًا (دوكسياسيز زائدة) لل المادة الفعالة في ميتيل فينيدات أو كل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفضلة في الفقرة 6 «معلومات إضافية». بعض أمراض رد الفعل التحسسي يمكن أن تشمل ضيق تنفس، صفراء أو صفراء في النفس، إرتفاع الوجه الشفتي، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم، طفح حكة أو طفح حكة (شرى).
- إذا حجزت استعمال الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.
- فترات من القلق، التوتر أو قلة الهدوء.

- ملائمة توقيت (حالات من حركات جسم ونطاق غير مسيطر عليها أو حملات) أو إذا كانت لديك مشكلة متعلقة بهدا الإضطراب.
- إنقطاع الضغط داخل العين (چلوكوما) أو مشاكل أخرى في الغدة الدرقية (thyroid) أو مشاكل في القلب مثل نوبة قلبية، تضخم غير منتظم، ألم في الصدر (angina)، قصور القلب، مرض قلبي أو مشكلة قلبية خلقية.
- إرتفاع ضغط الدم (arterial hypertension) أو تضيق الأوعية الدموية الشريانية (arteriosclerosis) الذي قد يسبب آلام في الذراعين والرجلين (adrenal gland) الذي يعاني باسمه وحملًا الكروماتين القاتمة.
- إذا كنت تتناول ريتالين إذا كنت تعاني من أحد الحالات الطبية التي فصلت أعلاه، لا يجوز تناول ريتالين إذا كنت تتناول دواء من فصيلة مثبطات مونوآمين أو كسيباراز (MAO) أو إذا تناولت مثبطات MAO خلال 14 يومًا قبيل بدء العلاج بـ ريتالين، إن تناول مثبطات سوية مع أدوية من فصيلة مثبطات MAO قد يؤدي إلى حدوث رد فعل خطير الذي يشمل إنقطاع ضغط الدم بحرارة الجسم، إنقطاع ضغط الدم بشكل حاد وتشنجات خطيرة.
- إسال الطبيب إذا كنت غير قادرًا فيما إذا تناولت واحدًا من تلك الأدوية، لمعالجة إضطرابات الإصمام والتراكير (ADHD) ولمعالجة مرض التوم الإنتربي.
- **الفصيلة العلاجية:** من منهاج الجهاز العصبي المركزي.
- تحتوي أقراص ريتالين على المادة الفعالة ميتيل فينيدات هيدروكلورايد ميتيل فينيدات هيدروكلورايد هو عبارة عن مثبط مفعوله (مثته) لجهاز العصبي المركزي، إضطرابات الإصمام والتراكير (ADHD) أو إضطراب فرط الحركة هو عبارة عن إضطراب سلوكي لدى الأطفال، العصاميون والكبار، يزيد على 3% من جميع الأطفال.
- يحتوي أقراص ريتالين على المادة الفعالة ميتيل فينيدات هيدروكلورايد ميتيل فينيدات هيدروكلورايد هو عبارة عن إضطراب سلوكي لدى الأطفال، العصاميون والكبار، يزيد على 3% من جميع الأطفال.
- يرجى إرشاد ريتالين بمعونة فيما إذا لديك ميل في أن تتطور لديك حساسية.
- يرجى إرشاد ريتالين بمعونة فيما إذا كنت تتحمل لكتور أو لجلوتين (Antralatin®)، مهابة عن بعض مركبات الدواء.
- يرجى إرشاد ريتالين بمعونة فيما إذا كنت تعاني من أحد السلوكيات أو الحالات الطبية المقصولة.
- قبل العلاج بـ ريتالين بـ ٣ شهور في بنية القلب (structural cardiac abnormality) [abnormality] (abnormality) [structural cardiac abnormality]
- ساقطة عائلية لموت مفاجئ أو نبض قلب غير منتظم.
- تصلب الشرايين
- آية مشكلة أخرى في القلب، حالياً أو في السابق.
- عدم سلام الأوعية الدموية في الدماغ، مثلاً ضغط الأوعية الدموية (am الدم).
- سكتة مغامية أو إنهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)
- إكتمان شديد، إضطراب ثانوي القلب أو أمراض نفسية أخرى
- الصرع (إختلالات، تشنجات أو نوبات)
- إنقطاع ضغط الدم
- ساقطة من الإدمان على الكحول، المخدرات أو التعلق بالأدوية.
- حالات (تضليلات عضلية، عادة في الوجه أو في الكتفين) أو إذا كان أخوتك أو أخواتك لديهم حالات
- إضطرابات نفسية شديدة التي تؤدي لتفكير وإدراك شاذين (هان)، أو شعور غير عادي من المثارة، فرط نشاط وقلة الصبر (acute mania) – ببلغ الطبيب فيما إذا كنت تعاني من تلك الحالات
- أمراض ذهانية مثل رؤية أو الشعور باشياء غير موجودة حقيقة (ذهيان)
- تصرف عشوائي
- تصرف أو أفكار انتشارية
- إذا كنت تعاني من أحد الحالات التي ذكرت سابقًا، فمن الجائز أن يرجح الطبيب بوسائل خارجية.
- تحذيرات اضافية
- من شأن ريتالين أن يعطي نتيجة إيجابية خاصة في فحوص إستعمال الأدوية، بما في ذلك الفحوص التي تجري في مجال الرياضة.
- قد يحصل لدى بعض الأطفال الذين يتلقون لقاحات طولية بطيئة في النمو، لكنهم يعوضون ذلك عادة عند إيقاف العلاج (أنظر أيضًا فقرات: «فترحة العلاج»، «الفحوص والنتائج»).
- لدى بعض المتعالجين، من شأن ريتالين أن يؤدي إلى إزعاج في البطن، فقدان الشهية للطعام وصعوبات في النوم، خاصة في بداية العلاج. يمكن أن يساعد الطبيب في تقليل تلك الأعراض وذلك بتحفيض المقدار الدوائي من ريتالين أو بغيره أوقات تناول الأقراص.

طريقة التناول:

بالممكان تناول الأغراض مع أو بدون طعام . يجب تناول الدواء ماءً أو منيي في اليوم (ملاً أنثاء وجة الفطور وأوجة الغداء، أي نفس المقدار الدوائي اليومي بين اعطاءه في الصباح وإعطاءه في الظهر). يجب بلع الفرنس مع كأس ملئية من الماء.

بالإمكان شطر الأغراض:

إذا كان المقدار الدوائي عبارة عن نصف قرص، فيجب الاستعانت بخط الشطر الذي على القرص شطره. بالإمكان استخدام آداة شطر الأغراض أضممان دقة المقدار الدوائي.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق الأغراض أو مضغها.

إذا كانت الأغراض تتطلب إدخالها في المطبخ، بالإمكان تناولها مع الطعام، لكن يجب الحرص على تناولها دائمًا بنفس الطريقة (أي: دائمًا مع الطعام أو دائمًا دون طعام).

وهكذا سيكون تناول الدواء متماثلاً على الدوام.

لدي بعض المرضى من شأن ريتالين أن يسبّ إفراطه للنوم. يستشر الطبيب حول التوقيت الصحيح خلال النهار لتناول المقدار الدوائي الآخر من ريتالين.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائياً أكبر:

بعض أغراض فرض الجعة هي: تقق، فلة هدوء، صداع، رجفان، تشنجات عضلية، تبض

غير منتظمة، تور، سخونة، تعرق، توسيع العروق الدموية، تشنجات عضلية، تبض

أفاكر أو محاولات لقلن نفسك (تفكير إنتحاري أو محاولة الإنتحار بما في ذلك

الاقدام فعلاً على الإنتحار).

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ مقدارًا دوائياً إلى الطبيب

أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عمدة الدواء.

إذا تناولت تناول الدواء في الوقت المخصص، يجب تناول جرعة حال تذكره ويجب

الاحتفاظ على قواصل زجاجية ثابتة بين الجرعات الدوائية لنفس اليوم. مثلاً إذا كنت

تحافظ عادة على قواصل زجاجية ثابتة بين الجرعات الدوائية 4 ساعات بين الجرعات الدوائية. فيجب الإنظر

ال التالي. يجب العودة لأوقات التناول الإعتيادية.

لا يجوز تناول سوية لآفات التناول الإعتيادية.

إذا قمت بفعل ذلك فأنت

إذا كنت تستصعب التذكر من يجب تناول دوائك. استشر الصيدلي.

يجب الموافقة على العلاج كما أوصي من قبل الطبيب:

بالمشاركة الكافية المستحضرات المنتهية. هذا الدواء قد يسبب الإدمان وسوء الاستعمال

من قبل الشخص، حتى وإن تناوله بالشكل الصحيح.

في حال تناوله بالشكل الصحيح، فمن الجائز أن تعود حالتك الطبية

كما كانت قبل العلاج أو أن تظهر أعراض جانبية مثل الاكتئاب.

لتتجنب ذلك، من الجائز أن يوصي الطبيب بتخفيف الجرعة الدوائية اليومية بشكل تدريجي

قبل إيقاف العلاج تمامًا.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة.

يجب تشخيص طبي مراقبة العلاج.

في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لم الأمر ذلك.

إذا توقفت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال ريتالين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين.

لا تندفع من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز لا تعاني أبداً منها.

يجب إبلاغ الطبيب حالاً أو التوجه إلى غرفة الطوارئ في الحالات التالية:

• علامات لحساسية مثل انفاس الوجه الشفتيين أو اللسان. ضيق التنفس، صفير أو

صعوبة التنفس، هذه علامات لرد فعل تحسسي خطير.

• صعف أو شلل الأطراف، هذه علامات لرد فعل تحسسي خطير.

• طفح جلدي، حكة، بقع حمراء على الجلد، حبوبات أو نقش في الجلد.

- ارتفاع مفاجئ بحرارة الجسم، تعرق، نبض سريع، ألم في الصدر، تصلب عضلات وتقليلات ضاغط الدم التي قد تؤدي لحوث سبات (coma).
- حالة دائمة لوجود أغراض "تشبه الإنفلوانزا" مثل فمتشيرة، سخونة، آلام في الخدود، ورشح، انتفاخ العقد، الألم في العضلات أو في المفاصل.
- نزف أو كدمات غير عادي في الجلد.
- إرهاق شديد، ضيق نفس أثناء القيام بنشاطات بدنية، دوار، شحوب في الجلد.
- إهتزاز لا إرادي للجسم (علامات لرجحان) مثل تشنجات، إهتزاز أو حركات متotide خارجة عن السيطرة.
- اختلالات (نوبات) أو إغماء مجهول السبب
- ألم أو احتقان في الصدر
- نبض سريع أو غير منتظم
- اضطرابات في القلب أو إضطرابات في عديم الضوابط
- صداع شديد أو دائم
- كلام وحركات جسم خارجة عن السيطرة (متلازمة تورت)
- اضطراب متواصل للقضيب التناسلي الذي يسبب إزعاجًا في القضيب التناسلي (علامة لحدث موتسترم)
- أفكار أو محاولات لقتل نفسك (تفكير إنتحاري أو محاولة الإنتحار بما في ذلك الاقدام فعلاً على الإنتحار).
- خدر في أصابع اليدين وأصابع القدمين، الشعور بأنها باردة، وآخرة ويتغير لونها (من الأبيض إلى الأزرق، ومن ثم إلى الأحمر) في حالة البرد (ظاهرة رينو، برد في الأطراف).
- تناول
- التبول الالي لد الماء لدى الأطفال
- أعراض جانبية إضافية التي حدثت مع دويبة أخرى تحتوى على نفس المادة الفعالة
- مثل ريتالين:
- انخفاض مزامن في عدد خلايا الدم (خلايا الدم الحمراء، البيضاء والصفائح الدموية)
- الإنتهاك الطرقي شائعة والحدجة
- إنفاس الأنفين (علامة لرد فعل تحسس)
- سخط، عوائية، تغيرات في المراجز سلوك أو تفكير غير سليمين، غضب، إدراك زائد لما يجري من حولك، الشعور بتأثیر غير عادي، فرط نشاط وإنعدام الضوابط (هوس، توهان)، تغير في الرغبة الجنسية، قلة الإحساس ورشح
- معاودة الأفعال مراراً وتكراراً، حاجس لأنم واحد، ارتباك، إيمان، ضعف عضلي مؤقت، فقدان الحس في الجلد أو وفالق آخر في الجسم جراء نقص مفوت في تزويد الدم للدماغ (reversible ischemic neurological deficit) شقيقة
- إزدواج الرؤية، توسيع الحدودتين صعوبة في الرؤية
- توقف النبض، نوبة قلبية
- ألم في الخدود، ضيق تنفس
- اسهال، امساك
- إنتفاخ الوجه والخدود، إحمرار الجلد، ظهور بقع حمراء وكبيرة على الجلد خال
- عدم ساعات بعد تناول الدواء
- ألم عصبية، تشنجات عضلية
- دم في البول
- تضخم الثديين لدى الرجال
- ألم في الصدر، إرهاق، موت مفاجئ
- أصوات غير عادية من القلب
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليل عن أعراض جانبية:

بالمكان التبليل عن أمراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أمراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجو على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليل عن أمراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال، زينة الأطفال /أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس، لا تنسى التأمين بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة، يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية. يجب تخزين في العلبة الأصلية أو إضطرابات في تركيز الرؤبة.
- لا يجوز الإستعمال إذا كانت العلبة معطوبة أو عليها علامات تضر.

(6) معلومات إضافية:

- يحتوي الدواء على مادة الفعالة (يحتوى على مادة الفعالة أيضًا).
- **ريتالين 10 ملغ أعراض:**

Wheat starch, lactose cryst., calcium phosphate tribasic, talc, gelatin, magnesium stearate

يحتوي كل قرص على 40 ملг لكتوز وكذلك على 48 ملг شفاء الحنطة (يحتوى على جلوتين).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

يسقوط الدواء على شكل أفراد. الأعراض يهدىء مسبيدية، مستبدية، مسطحة ذات أطراف مائلة، علىها العلبة "CG" من جانب واحد وـ "A/B" وخط للشطر من الجانب الثاني ومن الجانب وجود نقاط داكنة في القرص.

تحتوي العلبة على 30 قرصاً صاحب الإيمان والممستودع وعنوانه:

نوفارتيس إسرائيل מ. ض. ص. ب. 7126. تل أبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 113 76 22498

تم إعدادها في نيسان 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهorio القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين

- ضربات قلب
- ضائقة عاطفية مفقرطة أو إنغال
- تناقص الوزن
- الشعور بكتاب
- الشعور بعوائية
- كرحة الأسنان المفترضة
- ارتفاع مفاجئ بحرارة الجسم، تعرق، نبض سريع، ألم في الصدر، تصلب عضلات وتنقلات ضاغط الدم التي قد تؤدي لحوث سبات (coma).
- حالة دائمة لوجود أغراض "تشبه الإنفلوانزا" مثل فمتشيرة، سخونة، آلام في الخدود، ورشح، انتفاخ العقد، الألم في العضلات أو في المفاصل.
- نزف أو كدمات غير عادي في الجلد
- إرهاق شديد، ضيق نفس أثناء القيام بنشاطات بدنية، دوار، شحوب في الجلد
- إهتزاز لا إرادي للجسم (علامات لرجحان) مثل تشنجات، إهتزاز أو حركات متotide خارجة عن السيطرة.
- اختلالات (نوبات) أو إغماء مجهول السبب
- ألم أو احتقان في الصدر
- نبض سريع أو غير منتظم
- اضطرابات في القلب أو إضطرابات في عديم الضوابط
- صداع شديد أو دائم
- كلام وحركات جسم خارجة عن السيطرة (متلازمة تورت)
- اضطراب متواصل للقضيب التناسلي الذي يسبب إزعاجًا في القضيب التناسلي (علامة لحدث موتسترم)
- أفكار أو محاولات لقتل نفسك (تفكير إنتحاري أو محاولة الإنتحار بما في ذلك الاقدام فعلاً على الإنتحار).
- خدر في أصابع اليدين وأصابع القدمين، الشعور بأنها باردة، وآخرة ويتغير لونها (من الأبيض إلى الأزرق، ومن ثم إلى الأحمر) في حالة البرد (ظاهرة رينو، برد في الأطراف).
- تناول
- التبول الالي لدى الأطفال
- أعراض جانبية إضافية التي حدثت مع دويبة أخرى تحتوى على نفس المادة الفعالة
- مثل ريتالين:
- انخفاض مزامن في عدد خلايا الدم (خلايا الدم الحمراء، البيضاء والصفائح الدموية)
- الإنتهاك الطرقي شائعة والحدجة
- إنفاس الأنفين (علامة لرد فعل تحسس)
- سخط، عوائية، تغيرات في المراجز سلوك أو تفكير غير سليمين، غضب، إدراك زائد لما يجري من حولك، الشعور بتأثیر غير عادي، فرط نشاط وإنعدام الضوابط (هوس، توهان)، تغير في الرغبة الجنسية، قلة الإحساس ورشح
- معاودة الأفعال مراراً وتكراراً، حاجس لأنم واحد، ارتباك، إيمان، ضعف عضلي مؤقت، فقدان الحس في الجلد أو وفالق آخر في الجسم جراء نقص مفوت في تزويد الدم للدماغ (reversible ischemic neurological deficit) شقيقة
- إزدواج الرؤية، توسيع الحدودتين صعوبة في الرؤية
- توقف النبض، نوبة قلبية
- ألم في الخدود، ضيق تنفس
- اسهال، امساك
- إنتفاخ الوجه والخدود، إحمرار الجلد، ظهور بقع حمراء وكبيرة على الجلد خال
- عدم ساعات بعد تناول الدواء
- ألم عصبية، تشنجات عضلية
- دم في البول
- تضخم الثديين لدى الرجال
- ألم في الصدر، إرهاق، موت مفاجئ
- أصوات غير عادية من القلب
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.