

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (הכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ריטלין® 10 מ"ג טבליות

כל טבליה מכילה: מתילפנידאט הידרוכלוריד 10 מ"ג

Methylphenidate Hydrochloride 10 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' וסעיף 6 'מידע נוסף'.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עוברך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בהפרעות קשב וריכוז (ADHD) ולטיפול בנרקולפסיה.

קבוצה תרפויטית: מעורר מערכת העצבים המרכזית.

טבליות ריטלין מכילות את המרכיב הפעיל מתילפנידאט הידרוכלוריד. מתילפנידאט הידרוכלוריד הוא סטימולנט (מעורר) של מערכת העצבים המרכזית.

הפרעת קשב וריכוז (ADHD או הפרעה היפרקיוניטית) זו הפרעת התנהגות בילדים, מתבגרים ומבוגרים. קרוב ל- 3% מהילדים סובלים מהפרעה זו, אשר אינה מאפשרת להם לשבת רבוע או להתרכז במשימות למשך זמן כלשהו. לילדים עם הפרעה זו עלול להיות קושי בלימודים ובהכנת שיעורי בית. לעיתים קרובות עשוי להיות קשה לנהל אותם בבית הספר ובבית. מבוגרים עם ADHD מתקשים לעיתים קרובות להתרכז. לעיתים קרובות הם מרגישים חסרי מנוחה, חסרי סבלנות, עם רמת קשב נמוכה והם משתעממים בקלות. הם עשויים להתקשות בארגון חייהם הפרטיים ובעבודה.

משערים כי ריטלין פועלת על-ידי יוסות כימיקלים מסוימים במוח המשפיעים על ההתנהגות. היא מסייעת למקד את תשומת הלב, להתעלם מהסחות דעת ומאפשרת לאנשים אימפולסיביים לחשוב לפני מעשה. אם הטיפול מצליח, הוא משפר את יכולת הקשב הטבעית של האדם.

תרופה זו היא חלק מתוכנית טיפולית הכוללת בדרך כלל גם טיפול פסיכולוגי, חינוכי וחברתי.

נרקולפסיה זו הפרעה של התקפי-שינה. אין זה מצב נורמלי של עייפות. חולים בנרקולפסיה חווים התקפים חוזרים ובלתי נשלטים של שינה במהלך היום על אף שנת לילה מספקת. נרקולפסיה חייבת להיות מאובחנת על-ידי רופא באמצעות רישום של תבניות ערות-שינה.
נרקולפסיה היא חלק ממוחיות טיפולית הכוללת בדרך כלל גם טיפול מנרקולפסיה.

אין להשתמש בתרופה זו למניעה או לטיפול בעייפות רגילה.

אם יש לך כל שאלה על אופן הפעולה של ריטלין או מדוע תרופה זו נרשמה לך או לילדך, פנה לרופא שלך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה אלרגי (בעל רגישות יתר) למרכיב הפעיל מתילפנידאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המפורטים בסעיף 6 'מידע נוסף'. חלק מהתסמינים של תגובה אלרגית עשויים לכלול קוצר נשימה, צפצופים או קשיי נשימה; נפיחות של הפנים, הפצפופים, הלשון או של חלקים אחרים של הגוף; פריחה, גרד או תפרכת עורית (חרלת).

אין לטול ריטלין אם אתה סובל מהמצבים הרפואיים הבאים:

- תקופות של חרדה, מתח או אי-שקט
- תסמונת טורט (מצב של תנועות גוף ודיבור שאינם נשלטים או טיקים) או אם יש לך היסטוריה משפחתית של הפרעה זו
- לחץ תר עיני מוגבר (גלאוקומה)
- פעילות יתר של בלוטת התריס (היפרואיד) או בעיות אחרות בבלוטת התריס
- בעיות לב כגון התקף לב, דופק לא סדיר, כאבים בחזה (אנגינה), אי ספיקת לב, מחלת לב או בעיה מולדת בלב
- לחץ דם גבוה מאוד (יתר לחץ דם) או הצרות של כלי דם עורקיים (חסידם עורקים אשר עלולות לגרום לכאב בזרועות וברגליים)
- גידול נדיר של בלוטת האדרנל (יותרת הכליה) הידוע בשם פאכורומציטומה

אם אתה לא בטוח האם אתה סובל מאחד מהמצבים הרפואיים שפורטו מעלה, שאל את הרופא.

אין ליטול ריטלין אם אתה נוטל תרופה מקבוצת מעכבי מונואמינאוקסיידז (MAO) או נוטל מעכבי MAO במהלך 14 יום לפני התחלת הטיפול בריטלין. נטילת ריטלין יחד עם תרופות מקבוצת מעכבי MAO עלולה לגרום לתגובה חמורה הכוללת עלייה פתאומית בחום הגוף, לחץ דם גבוה בצורה קיצונית ועוויתות חמורות.

אלו הן תרופות מקבוצת מעכבי MAO עלולה לגרום לתגובה חמורה הכוללת עלייה פתאומית בחום הגוף, לחץ דם גבוה בצורה קיצונית ועוויתות חמורות.

שאל את הרופא אם אתה לא בטוח אם נוטלת אחת מתרופות אלה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

ספר לרופא אם אתה אלרגי לכל תרופה אחרת, מזון, חומרי צבע או משמרים.

הרופא ירצה לדעת האם אתה נוטה לפתח אלרגיות. ספר לרופא אם יש לך אי-סבילות ללקטוז או לגלוטן (ראה גם סעיף: 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה').

לפני הטיפול בריטלין ספר לרופא אם אתה סובל מאחד מהתנהגויות או המצבים הרפואיים המפורטים:

- פגמים בלב (כגון אי תקינות במבנה של הלב [structural cardiac abnormality])
- היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי או דופק לא סדיר
- התקשות של העורקים
- כל בעיית לב אחרת, כעשויית או קודמת
- אי תקינות של כלי הדם במוח, למשל החלשות כלי הדם (מפרצת), שבץ מוחי או דלקת כלי הדם (וסקוליטיס)
- דיכאון חמור, הפרעה דו קוטבית או מחלות נפש אחרות
- אפילפסיה (פרכוסים, עוויתות או התקפים)
- לחץ דם גבוה
- היסטוריה של ההמכרות לאלכוהול, סמים או תלות בתרופות
- טיקים (עווית שרירים, בדרך כלל בפנים או בכתפיים) או אם לאחץ או לאחיותך יש טיקים

הפרעות נפש חריפות הנוגמות לחשיבה ותפיסה חריגות (פסיכוזה) או לתחושה בלתי רגילה של ריגוש, פעלתנות יתר וחוסר איפוק (acute mania) - הרופא יאמר לך אם אתה סובל ממצבים אלה

- תסמינים פסיכויטיים כגון ראייה או הרגשת דברים שלא באמת קיימים (הזיות)
- התנהגות תוקפנית
- התנהגות או ממשבות אובדניות
- אם יש לך אחד מהמצבים המפורטים לעיל, ייתכן שהרופא ירצה לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים.

אזהרות נוספות

- ריטלין עשוייה לתת תוצאה חיובית שגויה בבדיקות לשימוש בתרופות, כולל בבדיקות הנערכות בספורט
- בחלק מהילדים המקבלים ריטלין לטווח ארוך עשויה להיות האטה בגדילה, אך בדרך כלל הם יפצו על כך כאשר הטיפול יופסק (ראה גם סעיפים: 'משך הטיפול' ו-'בדיקות מעקב')
- במטופלים מסוימים ריטלין עשוייה לגרום לאי נוחות בבטן, איבוד התיאבון וקשיי שינה, במיוחד בתחילת הטיפול. הרופא יכול לסייע להפחית תסמינים אלה על-ידי הקטנת המנה של ריטלין או שינוי זמני הטיפול לרפואי דחוף. חיג עשוי לקרות בכל קבוצת גיל. **אם זה לא קורה, פנה מיד לרופא**

- אם אתה נוטל ריטלין עם תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטונרגיות, למשל סרטרג'ין וונלאפקסין המשמשות לטיפול בדיכאון) ואתה חווה שלוב של התסמינים הבאים: חוסר מנוחה, רעידות, התכווצויות שרירים פתאומיות, חום גבוה לא רגיל, בחילות והקאות, הפסק את הטיפול בריטלין ובתרופות אלה ופנה מיד לרופא שלך
- אם אתה עומד לבעור ניתוח, יש לידע את הרופא כי אתה נוטל ריטלין. אין לקחת ריטלין ביום הניתוח במידה שמשתמשים בסוג מסוים של מאלחש מאחר וקיים סיכוי לעלייה פתאומית בלחץ הדם במהלך הניתוח

- אם אתה נוטל ריטלין עם תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטונרגיות, למשל סרטרג'ין וונלאפקסין המשמשות לטיפול בדיכאון) ואתה חווה שלוב של התסמינים הבאים: חוסר מנוחה, רעידות, התכווצויות שרירים פתאומיות, חום גבוה לא רגיל, בחילות והקאות, הפסק את הטיפול בריטלין ובתרופות אלה ופנה מיד לרופא שלך
- אם אתה עומד לבעור ניתוח, יש לידע את הרופא כי אתה נוטל ריטלין. אין לקחת ריטלין ביום הניתוח במידה שמשתמשים בסוג מסוים של מאלחש מאחר וקיים סיכוי לעלייה פתאומית בלחץ הדם במהלך הניתוח
- ילדים ומתבגרים**

התרופה אינה מועדת לילדים מתחת לגיל 6.

בדיקות ומעקב

יש להקפיד להגיע לפגישות מעקב אצל הרופא בכדי שניתן יהיה לעקוב אחר התקדמות הטיפול. הרופא יבדוק לחץ דם, גובה, משקל ויערוך בדיקות דם מדי פעם כדי למנוע הופעת תופעות לוואי.

אם ילדך אינו גדל לגובה או עולה במשקל כצפוי, ייתכן שידרשו הפסקות הטיפול בריטלין.

אינטראקציות,תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

תרופות מסוימות וריטלין הניטלות יחדיו, עלולות להפריע זו לזו. תרופות אלה כוללות:

- תרופות המעלות לחץ הדם
- אגוניסטים לרצפטור מסוג אלפא 2 כגון קלונידין (המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה)
- נוגדי קרישה פומיים או וורפרין (תרופות המשמשות למניעת קרישי דם)
- אגוניסטים לרצפטור מסוג אלפא 2 כגון קלונידין (המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה)
- נוגדי קרישה פומיים או וורפרין (תרופות המשמשות למניעת קרישי דם)

- תרופות מסוימות נגד פרכוסים (לטיפול באפילפסיה או התקפים)
- תרופות לטיפול בדיכאון כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי מונואמינאוקסיידז (MAO)
- פנילבוטאזון (לטיפול בכאבים או בחום)
- גואנתנידין
- מאלחשים
- תרופות המשפיעות על רמת הדופמין בגוף (תרופות דופמינרגיות המשמשות לטיפול במחלת הפרקינסון או בפסיכוזה)

- תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטונרגיות, למשל אלה המשמשות לטיפול בדיכאון כמו סרטרג'ין וונלאפקסין) ייתכן שיהיה צורך לשנות את המינון של התרופות שלך או שתצטרך לקחת תרופות אחרות. היוועץ ברופא.

אם אתה יודעת את הרופא על תרופות נוספות שאתה נוטל, היוועץ בו לפני נטילת ריטלין.

אם אתה עומד להתחיל טיפול בתרופה חדשה, הזכר לרופא ולרוקח שלך שאתה מטופל בריטלין.

ספר לכל רופא, מוזן פסינים או רוקח המטפל בך שאתה נוטל ריטלין.

שימוש בתרופה רופא

ניתן ליטול את הטבליות עם או בלי מזון (למשל בארוחת בוקר או בארוחת צהריים).

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשתות אלכוהול בתקופת הטיפול בריטלין. יש לזכור שמאכלים ותרופות מסוימים מזלים אלכוהול.
אלכוהול עלול לגרום להחמרה בחלק מתופעות הלוואי של ריטלין, כגון סחרחורת ונמנום.

הריון והנקה

יש לידע את הרופא אם את בהריון או מיניקה. שאלי את הרופא על הסיכונים והתועלת בנטילת ריטלין במקרה זה. אין להשתמש בריטלין במהלך הריון אלא אם הרופא רשם זאת במפורש. תרופה זו עלולה להשפיע על העובר אם את נוטלת אותה בעת ההריון.

אם הרית בתקופת הטיפול בריטלין, היוועצו ברופא. הרופא ידון איתך בסיכונים ובתועלת של נטילת התרופה במהלך הריון.

אין להיניק במהלך הטיפול בריטלין. החומר הפעיל בריטלין יכול לעבור לחלב אם.

נהיגה ושימוש במכונית

בתקופת הטיפול בריטלין יש להיזהר בנהיגה, הפעלת מכונית או ביצוע משימות בהן נדרשת עירנות עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך.

תרופה זו עלולה לגרום להזיות, סחרחורת, נמנום, ראייה מעורפלת או תופעות לוואי אחרות במערכת העצבים המרכזית אשר יכולות לפגום ביכולת הריכוז באנשים מסוימים. אם אתה חווה תסמינים אלו, אין לנהוג ברכב, להפעיל מכונית או לבצע כל פעילות המחייבת תגובות מהירות או אשר עלולה להיות מסוכנת.

אם נוטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת וש לשמור על מרווחי זמן קבועים בין המנות של אותו היום. לדוגמה, אם בדרך כלל אתה שומר על מרווח של 4 שעות בין מנות, יש לחכות 4 שעות לפני נטילת המנה הבאה וכך הלאה לגבי אותו היום. ביום למחרת, חזור לזמני הנטילה הרגילים.

אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על המנה שנשכחה. אם תעשה כך אתה עלול להגדיל את הסיכוי לתופעות לוואי.

אם קשה לך לזכור מתי לקחת את התרופה שלך, היוועץ ברוקח. יש להתמיד בטיפול כך שתומלץ לך על-ידי הרופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

מינון:

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד על פי צרכי המטופל ותגובתו לטיפול.

מבלי להיוועץ ברופא. אם אתה מפסיק פתאומיות את הטיפול, ייתכן

אין לשתות את המינון מבלי להתייעץ עם הרופא.

אם אתה כבזר השפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי, יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול:

יש להמשיך וליטול ריטלין למשך הזמן עליו הורה הרופא.

תרופה זו מסייעת בוויסות התסמינים אך אינה מרפאת. הרופא יבדוק את השיפור במצב בכדי לוודא שהתרופה פועלת כנדרש והוא ידון איתך בשאלה עד מתי יש להמשיך בטיפול.

אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא.

כמו בכל תרופה, השימוש בריטלין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא מסוימים (למשל בסופי שבוע או בחופשות בית הספר ובחופשות ארוכות) כדי לראות אם נטילתה עדיין נדרשת. הפסקות אלה בטיפול עוזרות גם להימנע מהאטה בגדילה אשר מתרחשת לעיתים כאשר ילדים נוטלים תרופה זו לאורך זמן.

צורת הנטילה:

ניתן ליטול את הטבליות עם או בלי מזון.

יש ליטול את התרופה פעם או פעמיים ביום (למשל בארוחת בוקר ו/או בארוחת צהריים, כלומר, לחלק את המינון היומי בין מתן בבוקר למתן בצהריים).

יש לבלוע את הטבליה עם כוס מלאה מים.

הטבליות ניתנות לחשיה.

אם המנה היא חצי טבליה, יש להעזר בקו החצייה שעל הטבליה כדי לחתוך אותה. ניתן להשתמש באביזר לחיתוך טבליות כדי להבטיח מנה מדויקת.

אין מידע לגבי כתישת הטבליות או לעיסתן.

אם הטבליות גרמוות לך אי נוחות בטנית, ניתן ליטול אותן עם מזון, אך יש להקפיד וליטול אותן תמיד באותו אופן (כלומר: תמיד עם מזון או תמיד ללא מזון). בדרך זו ההשפעה תמיד תהיה זהה.

בחולים מסוימים ריטלין עשוייה לגרום לחוסר שינה. היוועץ ברופא בנוגע לזמן הנכון במהלך היום לנטילת המנה האחרונה של ריטלין.

אם נוטלת בטעות מינון גבוה יותר

חלק מהתסמינים של מנת יתר הם: הקאה, אי-שקט, כאב ראש, רעידות, עוויתות שרירים, דופק לא סדיר, סומק, חום, הזעה, אישונים מורחבים, קשיי נשימה, בלבול, פרכוסים ועוויתות שרירים המלוות בחום ובשתן אדום-חום.

אם נוטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת וש לשמור על מרווחי זמן קבועים בין המנות של אותו היום. לדוגמה, אם בדרך כלל אתה שומר על מרווח של 4 שעות בין מנות, יש לחכות 4 שעות לפני נטילת המנה הבאה וכך הלאה לגבי אותו היום. ביום למחרת, חזור לזמני הנטילה הרגילים.

אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על המנה שנשכחה. אם תעשה כך אתה עלול להגדיל את הסיכוי לתופעות לוואי.

אם קשה לך לזכור מתי לקחת את התרופה שלך, היוועץ ברוקח. יש להתמיד בטיפול כך שתומלץ לך על-ידי הרופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

כמו כל התכשירים המעוררים, **תרופה זו עלולה להיות ממכרת ומונצלת לרעה על-ידי אנשים מסוימים**. אם טיטול אותה בצורה נכונה כפי שהורה הרופא, שימוש לרעה או תלות לא אמורים להוות בעיה, לא כעת ולא בעתיד.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה מבלי להיוועץ ברופא. אם אתה מפסיק פתאומיות את הטיפול, ייתכן שישחזר מצבך הרפואי טרם הטיפול או שתופענה תופעות לוואי כגון דיכאון. כדי להימנע מכך ייתכן שהרופא יורה על הקטנת המנה היומית באופן הדרגתי לפני הפסקת הטיפול לחלוטין. יש צורך בהשגחה רפואית לאחר הפסקת הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בריטלין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא מסוימים (למשל בסופי שבוע או בחופשות בית הספר ובחופשות ארוכות) כדי לראות אם נטילתה עדיין נדרשת. הפסקות אלה בטיפול עוזרות גם להימנע מהאטה בגדילה אשר מתרחשת לעיתים כאשר ילדים נוטלים תרופה זו לאורך זמן.

יש לדווח מיד לרופא או לפנות לחדר מיון במקרים הבאים:

- סימנים של אלרגיה כגון התנפחות של הפנים, השפתיים או הלשון, קוצר נשימה, צפצופים או קושי בנשימה. אלה סימנים של תגובה אלרגית חמורה
- חולשה או שיתוק של הגפיים או הפנים, קושי בדיבור או התעלפות בלתי מוסברת
- פריחה בעור, גירוד, כתמים אדומים על העור, שלפוחיות או קילופי עור

- עלייה פתאומית בחום הגוף, הזעה, דופק מהיר, כאב בחזה, קשיין שרירים ותנודות בלחץ הדם אשר עלולות להוביל לתרדמת (קומה) ומצב תמידי של נוכחות תסמינים "דמויי-שפעת" כגון צמרמורות, חום, כאב גרון ונזלת, בלוטות נפוחות, כאבי שרירים או מפרקים

דימום או חבורות עוריות לא רגילים

עייפות לא רגילה, קוצר נשימה במהלך פעילות גופנית, סחרחורת, עור חיוור

טלטול לא רצוני של הגוף (סימנים של רעד) כגון עוויתות, טלטול או תנועות התפתלות בלתי נשלטות

פרכוסים (התקפים) או התעלפות בלתי מוסברת

כאב או תעוקה בחזה

דופק מהיר או לא סדיר

הצטבה של העור או העיניים, גוון כהה לשתן או גוון בהיר לצואה

בלבול, אשליות או הזיות (ראייה או תחושה של דברים שלא באמת קיימים)

התרגשות, פעלתנות יתר והתנהגות נטולת עכבות

כאב ראש חמור או קבוע

דיבור ותנועות גוף בלתי נשלטים (תסמונת טורט)

זיקפה ממושכת הגורמת לאי נוחות של הפין (סימן לפריאפיזם)

מחשבות או ניסיונות להרוג את עצמך (חשיבה אובדנית או ניסיון התאבדות כולל התאבדות בפועל)

האצבעות והבהובות חסרות תחושה, מרגישות קרות, מעקצצות ומשנות צבע (מלבן לכהול, וזא לאדום) כשקר (תופעת ריינו, קור בהיקפים)

תופעות הלוואי שצוינו מעלה עלולות להיות חמורות. ייתכן שיהיה צורך בהשגחה רפואית דחופה.
תופעות לוואי נוספות:
דווח לרופא אם אתה מבחין באחת מהתופעות הבאות והיא מדאיגה אותך:
תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:

- בחילה
- איבוד התיאבון
- כאב גרון ונזלת
- עצבנות
- אי יכולת לישון
- יובש בפה

תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100:

- הקאה או כאב בטן
- בטן רגיזה או קשיי עיכול
- תחושת עצבנות, חרדה או דאגה
- תחושת מתח מוגבר
- אי-שקט
- הפרעות שינה
- כאב ראש
- שיעול
- נמנום
- סחרחורת
- רגזנות
- נשירת שיער
- בלתי מוסברת (חרלת)

- כאב מפרקים
- כאבי שיניים
- הזעת יתר
- קצב לב לא נורמלי
- דפיקות לב
- מזיקה רגשית מפורזת או התרגשות
- ירידה במשקל
- תחושת דיכאון
- תחושת תוקפנות
- חריקת שיניים מפורזת
- תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000:
- כאב או תעוקה בחזה
- דופק מהיר או לא סדיר
- הצטבה של העור או העיניים, גוון כהה לשתן או גוון בהיר לצואה
- בלבול, אשליות או הז