

أعراض جانبية خطيرة شبيوعها غير معروف (أعراض لا يمكن تقييم شبيوعها من المعلومات المتوفرة):

- تِلوثات إنتهازية (تلوث جراثيمي، فطري، فيروسي أو طفيلي): إسهال مستمر، سخونة وألم في الحنجرة.
- بُلغ عن حالات لأورام حميدة وخبيثة نتيجة تثبيط الجهاز المناعي.
- بُلغ عن حالات لعدم تنسج خلايا الدم الحمراء (pure red cell aplasia): إنخفاض خطير جداً في تعداد خلايا الدم الحمراء، فقر دم إحتلائي (إنخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء جراء تلف شاذ يتراكم بإرهاق) وحمي نقص العدلات (إنخفاض في خلايا الدم البيضاء من النوع الذي يحارب التلوث، يتراقم بسخونة). لا يعرف بالضبط بأي وتيرة تظهر هذه الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تشعر أبداً بأعراض، أو كأمر متعلق بشدة حالتك من الجائز أن تشعر بـ: إرهاق، عدم إكتراث، شعوب شاذ للجلد، ضيق تنفس، دوار، صداع، ألم في الصدر وشعور بيبودة في اليدين وراحتي القدمين.
- حالات لنقص الكريات المحببة (agranulocytosis) (إنخفاض خطير في عدد خلايا الدم البيضاء الذي يتراقم بتقرحات في الفم، سخونة وتلوثات). من الجائز ألا تكون لديك أعراض أبداً أو أن تشعر بسخونة مفاجئة، قشعريرة وألم في الحنجرة.
- ردود فعل متسسية وتأقية تتحمل بالأعراض التالية: طفح حاك ومفاجئ (شرى)، إنتفاخ في اليدين، في راحتي القدمين، الكاحلين، الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة (الذي من شأنه أن يسبب صعوبات في البلع أو التنفس) وأنت قد تشعر بأنك توشك على الإغماء.
- متلازمة الإعتلال الدماغي الخلفي العكوس (Posterior reversible encephalopathy syndrome [PRES]): تتجلى بصداع، إرتباك، تغيرات في المزاج، إختلاجات وإضطرابات في الرؤية.
- الإعتلال العصبي البصري (تضرر عصب الرؤية): مشاكل في الرؤية مثل: تشوش الرؤية، تغيرات في رؤية الألوان، صعوبة في رؤية التفاصيل أو إنحصار مجال رؤيتك.

الأعراض الجانبية المفصلة أذناه قد تحدث بعد تناول تاكروسول وقد تكون خطيرة:

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 متعالجين):

إرتفاع نسبة السكر في الدم، سكري، إرتفاع نسبة اليوتاسيوم في الدم، صعوبات في النوم، إرتجاج، صداع، إرتفاع ضغط الدم، نتائج غير سليمة في فحوص الأداء الوظيفي الكبدي، إسهال، غثيان، مشاكل في الكلية.

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- إنخفاض تعداد كريات الدم (الصفائح الدموية، كريات الدم الحمراء أو البيضاء)، كريات الدم البيضاء، تغيرات في تعداد كريات الدم الحمراء (التي تظهر في فحوص الدم).
- إنخفاض نسبة المغنيزيوم، الفوسفات، اليوتاسيوم، الكالسيوم أو الصوديوم في الدم، تراكم السوائل، إرتفاع نسبة حمض البول أو نسبة الشحوم في الدم، إنخفاض الشهية للطعام، إرتفاع في حموضة الدم، تغييرات أخرى في أملاح الدم.
- أعراض قلن، إرتباك، توهان، إكتئاب، وخز والشعور بالتمثيل (تتوافق أحياناً بألم) في اليدين وراحتي القدمين، دوار، تضرر القدرة على الكتابة، إضطرابات في الجهاز العصبي.
- حساسية زائدة للضوء، مشاكل في العينين.
- طنين (رنين في الأذنين).
- نقص جريان الدم في الأوعية الدموية في القلب، نبضات قلب سريعة.
- نزف، إسداد جزئي أو تام للأوعية الدموية، إنخفاض ضغط الدم.
- ضيق تنفس، تغيرات في نسيج الرئتين، تراكم سوائل حول الرئتين، إلتهاب البلعوم، سعال، أعراض مشابهة للإنفلونزا.

- إلتهايات أو تقرحات المسببة لآلام في البطن أو لإسهال، أنزفة في المعدة، إلتهايات أو تقرحات في الفم، تراكم سوائل في البطن، تقيؤات، آلام في البطن، عسر هضم، إمساك، غازات، نفخة، براز لين، مشاكل في المعدة.
- تغيرات في وظيفة الكبد وفي إنزيمات الكبد، إصفرار الجلد على خلفية مشاكل في الكبد، ضرر في نسيج الكبد، إلتهاب الكبد.

- حكة، طفح، تساقط شعر، حب شباب، تعرق زائد.
- آلام في المفاصل، في الأطراف، في الظهر وراحتي القدمين، تقلصات عضلية.
- قصور كلوي، إنخفاض في إنتاج البول، خلل أو ألم عند التبول.
- ضعف عام، سخونة، تراكم سوائل في الجسم، ألم وعدم إرتياح، إرتفاع نسبة الإنزيم فوسفاتاز القلوي (alkaline phosphatase) في الدم، زيادة في الوزن، الشعور بإختلال في درجة حرارة الجسم.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 متعالج):

- تغيرات في تخثر الدم، إنخفاض في كافة تعداد خلايا الدم.
- تجفاف، إنخفاض في نسب البروتين أو السكر في الدم، إرتفاع نسبة الفوسفات في الدم.
- سُبات، نزف في الدماغ، سكتة دماغية، شلل، إضطراب في الدماغ، خلل في النطق واللغة، مشاكل في الذاكرة.
- تشوش الرؤية بسبب خلل في عدستي العينين.
- خلل في السمع.
- نبض غير منتظم، سكتة قلبية، إنخفاض في وظيفة القلب، إضطراب في عضلة القلب، سماكة عضلة القلب، نبض قوي، شذوذ في التخطيط الكهربائي للقلب، نظم ونبض قلب شاذان.
- خثرة دموية في وريد الأطراف، صدمة (shock).
- صعوبات في التنفس، إضطرابات في الطرق التنفسية، ربو.
- إسداد الأمعاء، إرتفاع نسبة إنزيم الأميلاز في الدم، إرتداد محتوى المعدة إلى المريء (reflux) تأخير في إفراغ المعدة.
- إلتهاب في الجلد، الشعور بحرقة عند التعرض للشمس.
- إضطرابات في المفاصل.
- عدم القدرة على التبول، آلام الطمث ونزف طمئي شاذ.
- فشل في الأداء الوظيفي لأعضاء معينة، مرض شبيه بالإنفلونزا، حساسية مفرطة للحرارة والبرودة، الشعور بضغط في الصدر، عصبية أو شعور غير إعتيادي، إرتفاع في نسبة الإنزيم لإكتات ديهيدروجيناز في الدم، إنخفاض الوزن.

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1,000 متعالج):

- أنزفة طفيفة في الجلد نتيجة خثرات دموية، تصلب زائد للعضلات، صمم، تراكم سوائل حول القلب، ضيق تنفس حاد، تشكل كيسية في البنكرياس، مشاكل في جريان الدم في الكبد، نمو مفرط للشعر، عطش، ميل للسقوط، شعور بشد في الصدر، نقص في الحركة، قرحة (ulcer).
- أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 متعالج):
- ضعف العضلات، عدم سلامة نتائج فحص تخطيط صدى القلب، قصور الكبد، تضيق القناة الصفراوية، ألم عند التبول يتراقم بدم في البول، زيادة نسبة الشحوم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة باداجيس بواسطة العنوان التالي: padagis.co.il

5 كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة، كيس الألو منيوم والويحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تناول الكبسولات مباشرة بعد إخراجها من الويحة.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- بعد فتح كيس الألو منيوم الذي يغلف الويحات (بليستر)، بالإمكان إستعمال الكبسولات لمدة 3 أشهر، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنتقضاء الصلاحية.
- يوجد داخل كيس الألو منيوم كيس ماص للرطوبة. لا يجوز بلعه أو إخراجها من كيس الألو منيوم.

6 معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Lactose monohydrate, gelatin, titanium dioxide, magnesium stearate, croscarmellose sodium, hypromellose, yellow iron oxide (in Tacrocel 0.5 mg and Tacrocel 1 mg), sodium lauryl sulfate, sorbitan monolaurate, red iron oxide (in Tacrocel 1 mg and Tacrocel 5 mg), black iron oxide (in Tacrocel 1 mg).

كل كبسولة من تاكروسول 0.5 ملغ تحتوي على 48.489 ملغ لكتوز مونوهيدرات و- 0.021 ملغ صوديوم. كل كبسولة من تاكروسول 1 ملغ تحتوي على 47.378 ملغ لكتوز مونوهيدرات و- 0.040 ملغ صوديوم. كل كبسولة من تاكروسول 5 ملغ تحتوي على 236.890 ملغ لكتوز مونوهيدرات و- 0.193 ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

الكبسولات معبأة ضمن لويحات (بليسترات) الموجودة ضمن كيس ألو منيوم مسدود.

كل لويحة تحتوي على 10 كبسولات.

لون الكبسولات: 0.5 ملغ - أصفر وعاجي، 1 ملغ - أبيض وبني فاتح، 5 ملغ - أبيض ووردي.

صاحب الإمتياز: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض، شارع رايكفيت 1، شوهام.

المنتج: ليك فارماسوتيكالس d.d، ليوبليانا، سلوفينيا.

تم إعدادها في أيار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

تاكروسول 0.5 ملغ: 14854.33452

تاكروسول 1 ملغ: 14855.33453

تاكروسول 5 ملغ: 14856.33455

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.