

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אלוריל® טבליות 100 מ"ג, 300 מ"ג

אלוריל 100: כל טבלייה מכילה אלופורינול (Allopurinol) 100 מ"ג.
אלוריל 300: כל טבלייה מכילה אלופורינול (Allopurinol) 300 מ"ג.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה טעיף 6
"מידע נוסף" ובטעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות, נוספות, או אלה הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו גרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצעב הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בהתקפי שיגדון ומצבים אחרים שקשורים לעודף חומצה אורית בגוף, על-ידי הורדת ריכוז חומצה אורית בדם ובשתן.

קבוצה תרפויטית: מעכב אנזים קטנתני אוקסידז (xanthine oxidase) החרחאי לייצור חומצה אורית.

2. לפני שימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אלופורינול) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה טעיף 6).
אם אינך בטוח, היוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת **אלוריל**.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני תחילת אלוריל, ספר לרופא אם:**
- אתה מופיע האן סיני, תאילנדי או קוריאני.
- אתה סובל מבעיות כבד או בכליות. ייתכן כי הרופא ירשם לך מינון נמוך יותר או ינהה אותך לטיל את התרופה בתדירות נמוכה יותר מאשר כל יום. כמו כן, הרופא יבצע מעקב צמוד יותר על מצבך.
- אתה סובל מבעיות לב או לחץ דם גבוה, ואתה נוטל משתנים ו/או תרופות הנקראות מעכבי ACE (אנזים המפרק אנגיוטנסין).
- אתה סובל מהתקפי שיגדון פעיל.
- אתה סובל מבעיות בבלטות התריס.

יש לנטוק בזרהות יתרה בנטילת התרופה:

- פריחות עוריות חמורות (תסמונת גרשות יתר, תסמונת סינבס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל קרוליזיס) דוחות במטופלים הנוטלים אלופורינול. לעיתים קרובות, הפריחה יכולה להיות מלווה בכיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובדלקת של לחמית העור (ענינים אדמונית ונפוחות). לפני הופעת הפריחה מועות אלה, מופיעות לעיתים קרובות תסמינים דמויי שפעת: חום, כאב ראש, כאב גוף. הפריחה עלולה להתפתח לשלפוחיות קילוף על פני שטח נרחב של העור. תגובות עוריות חמורות

אלה יכולות להיות נפוצות יותר במטופלים ממוצא האן סיני, תאילנדי או קוריאני. מחלת כליות כרונית עלולה להגביר את הסיכון לסימנים אלה בנוסף. אם אתה פתח פריחה או תסמינים עוריים אלה, **הפסק את השימוש בתרופה ופנה מייד לרופא**. ארה, גם טעיף 4 "תופעות לואי".

- אם אתה סובל ממחלת הסרטן או מתסמונת ליש-ניהן, כמות החומצה האורית בשתן יכולה לעלות. על מנת למנוע מצב זה, עלִיך לוודא שאתה שותה בכמות מספקת כדי לדלל את השתן.
- אם יש לך אבנים בכליות, ייתכן כי הן יקטנו בגודלן ועלולות להיכנס לדרכי השתן.

י לדים:

התרופה ניתנת למיידים לעיתים נדירות, למעט סוגים מסוימים של סרטן (בלימוד לקימה), הפערות אדמוניות מסימות (כגון תסמונת ליש-ניהן).

תגובות בין תרופותיו:

אם אתה לוקח, או אם אי לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
זאת מאחר ש**אלוריל** עלול להשפיע על פעילות תרופות מסוימות. כמו כן, תרופות אחרות עלולות להשפיע על פעילות **אלוריל**.

ספר לרופא או לרוקח במיוחד אם אתה לוקח:

- אספירין, סליציליטיס.
- תרופולי, משמש לטיפול בבעיות נשימה.
- תרופות לטיפול בפרכוסים (אפילפסה), פניטואין.
- וידארבין, משמש לטיפול בהרפס או באבעבועות רוח.
- אנטיביוטיקות (אמפיצילין או אמוקסיצילין).
- דידאנוזין, משמש לטיפול בזיהום HIV.
- תרופות המשמשות לטיפול בסרטן (כגון 6-מרקטפורין).
- תרופות לדיכוי מערכת החיסון (כגון: אזאתיופרין, ציקלופורין).
- תרופות לטיפול בסוכרת (כלורפראמיד).
- תרופות לטיפול בבעיות לב או יתר לחץ דם כגון מעכבי ACE או משתנים (נגוני תאיזדים).
- תרופות לדיילול הדם (נוגדי קרישת דם) כגון וארפין.
- תרופות אחרות לטיפול בשיגדון (כגון פרובנציד).

אם אלומיניהם ההידרוקסיד נלקח במקביל, ייתכן כי האלופורינול תהיה השפעה מוחלשת. יש להתרמן לפחות 3 שעות בין נטילת שתי התרופות.

בנטילת של אלופורינול ותרופות ציטוסטטיות (כגון: ציקלופוספמיד, זוקסורוביצין, בילאומיצין, פרוקרבין, אלקיל הלידים) הפערות במערכת הדם מתרחשות בשיחות גבוהה יותר מאשר בנטילת כל אחד מהמרכיבים הפעילים בנפרד.

על כן, יש לבצע ניטור ספירת הדם מרומז יותר קבועים.

שימוש בתרופה מזון:

יש לטיל את התרופה לאחר הארוחה (ראה גם טעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?").

דלג על המנה שנשכחה. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם את בהיריון, עשייה להיות בהיריון או מניקה יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה.

אלופורינול מופרש בחלב אם. נטילת אלופורינול בהנקה אינה מומלצת.

נהיגה ושימוש במכוונת:

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לנמנום, סחרחורת או לבעיות בקואורדינציה. במקרים אלה, אין לנהוג או להשתמש במכוונת.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אלוריל מכיל לקטוז. אם נאמר לך בעבר על-ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא 100-800 מ"ג כל יום. בדרך כלל תלעיתם מדינות מאוד הסימנים יכולים לכלול צפאפים, הלמות לב או לחץ בחזה, הטיפול יקבעו באופן פתאומי, והתמוטטות.

תופעות לואוי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 מן משתמשים מתוך 10,000):
חום וצממורות, כאב ראש, כאבי שרירים (תסמינים דמויי שפעת) והרגשה כללית לא טובה.
• תגובות רגישות יתר חמורות, המלוות בסימנים: חום, פריחה בעור, כאבי פרקים, תוצאות לא תקינות של בדיקות דם ותפקודי כבד (אלה יכולים להיות סימנים של תגובת רגישות רב מערכתית).

• דימום בשפתיים, בעיניים, בפה, באף או באיברי המין.
• כל שינוי בעור, כגון: כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין, דלקת לחמית העין (ענינים אדמונית ונפוחות), שלפוחיות או קילוף על פני שטח נרחב של העור.

צורת הנטילה:

יש לטיל את התרופה לאחר הארוחה עם כוס מים.

אלוריל 100: אסור לחצות בשל היעדר קן חצייה. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה.

אלוריל 300: מותר לחצות. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. סימנים של מנת יתר יכולים לכלול: בחילה, הקאה, שלשול וסחרחורת.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מיד.
שכחת ליטול תרופה זו, אם זמן נטילת המנה הבאה קרוב,

דלג על המנה שנשכחה. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם את בהיריון, עשייה להיות בהיריון או מניקה יש להיוועץ בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושיך! בדוק הנווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרגע משקפיים אם אתה זקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לואוי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**אלוריל** עלול לגרום לתופעות לואוי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

רגישות יתר

תופעות לואוי שאינן שכחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 מן משתמשים מתוך 1,000):

אם אתה סובל מתגובת רגישות יתר (אלרגית), **הפסק את השימוש בתרופה ופנה מייד לרופא**.

התסמינים יכולים לכלול:

• קילוף עור, שלפוחיות או כאבים בשפתיים ובפה.
• לעיתים נדירות מאוד הסימנים יכולים לכלול צפאפים, הלמות לב או לחץ בחזה, הטיפול יקבעו באופן פתאומי, והתמוטטות.

תופעות לואוי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 מן משתמשים מתוך 10,000):

חום וצממורות, כאב ראש, כאבי שרירים (תסמינים דמויי שפעת) והרגשה כללית לא טובה.
• תגובות רגישות יתר חמורות, המלוות בסימנים: חום, פריחה בעור, כאבי פרקים, תוצאות לא תקינות של בדיקות דם ותפקודי כבד (אלה יכולים להיות סימנים של תגובת רגישות רב מערכתית).

• דימום בשפתיים, בעיניים, בפה, באף או באיברי המין.
• כל שינוי בעור, כגון: כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין, דלקת לחמית העין (ענינים אדמונית ונפוחות), שלפוחיות או קילוף על פני שטח נרחב של העור.

צורת הנטילה:

יש לטיל את התרופה לאחר הארוחה עם כוס מים.

אלוריל 100: אסור לחצות בשל היעדר קן חצייה. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה.

אלוריל 300: מותר לחצות. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. סימנים של מנת יתר יכולים לכלול: בחילה, הקאה, שלשול וסחרחורת.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מיד.
שכחת ליטול תרופה זו, אם זמן נטילת המנה הבאה קרוב,

תופעות לואוי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 מן משתמשים מתוך 10,000):

• בעיות כבד, למשל דלקת כבד.

תופעות לואוי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000):

לעיתים התרופה עלולה להשפיע על הדם, ההשפעה יכולה להתבטא כנטייה גבוהה מהרגיל לשטפי דם, או שאתה יכול לפתח כאב גרון או סימנים אחרים של זיהום.

תופעות אלה מתרחשות בדרך כלל באנשים עם בעיות כבד או בכליות. ספר לרופא ברוקח להפסיק האפשרי.

התרופה עלולה להשפיע על קשרי לימפה.

חום גבוה.

דם בשתן (המטוריה).

רמות גבוהות של סולסטרול בדם (היפרליפידמיה).

תחושה כללית של חולי או חולשה.

חולשה, חוסר תחושה, חוסר יציבות בעמידה, הרגשה

יש חוסר יכולת להניע את השרירים (שיתוק) או איבוד הכרה.

כאב ראש, סחרחורת. נמנום או הפערות ראייה.

כאב חזה (אנגינה פקטוריס), לחץ דם גבוה או דופק איטי.

בעיות פפוריות בגברים או אין אונות.

הדגלה של החזה בגברים ושינוים.

שינוי בפעילות המעיים הנורמלית, שינויים בטעם.

קטרקט.

נשירת שיער או שינוי בצבע השיער.

דיכאון.

היעדר קואורדינציה של תנועות שרירים רצוניות (אטקסיה).

תחושה של עקצוץ, דדגוז, דקירה או שריפה של העור (פרסתזיה).

אצירת מזלים הגורמת לפיחיות (בצקת) במיוחד בקרסוליים.

• חילוף חומרים (מטבוליזם) לא תקין של גלוקוז (סוכרת).
• ייתכן שהרופא ירצה לבדוק לאת רמת הסוכר בדמך על מנת לבדוק אם זה קורה.

תופעות לואוי ששכיחותן אינן ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נבדקה):

- דלקת קרום מוח לא זיהומית (דלקת של הקרומים המקיפים את המוח וחוט השדרה); התסמינים דולים, צוואר נוקשה, כאב ראש, בחילה, חום או הכרה מעורפלת.
- תגובה מייד לטיפול רפואי אם תופעות אלה מופיעות.

אם הופיעה תופעת לואוי, אם אחת מתופעות הלואוי מתחמרה או כאשר אתה סובל מתופעת לואוי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לואוי למשרד הבריאות באמצעות החיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואוי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לואוי, או על ידי כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או בתינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלות. אל תהגה להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך השפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-C°25.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. יש להחזיר טבליות שאינן בשימוש או שאינן רצויות לרוקח לצורך השלכתן. עלִיך לשמור את הטבליות רק אם הרופא שלך אומר לך. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, maize starch, sodium starch glycolate, hypromellose, glycerol, povidone, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol 400, camauba wax.

ליצור נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אלוריל 100: טבליות לבנות, עגולות, מצופות, קמורות משני הצדדים.

אלוריל 300: טבליות לבנות, עגולות, מצופות, קמורות משני הצדדים, בעלות חן חלוקה בצד אחד.

גדלי אריזה מאושרים:
אלוריל 100: 100, 1000, 100, 50, 10 טבליות.
אלוריל 300: 100, 1000, 100, 30, 50, 10, 20 טבליות.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

נערך באפריל 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפקנס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
אלוריל 100: 039-76-26038-00
אלוריל 300: 039-74-26039-00

לשם הפשטות ולהקלת מיקועת לביב, עלון זה נוסח בלשון זכר. על זאת, אף התרופה מיועדת לרבי מיניים.

יצרן ובעל רישום: דקסקס® בע"מ

רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל