

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

זוטקטרה IU 500, תמיסה להזרקה.

1 מ"ל מזרק מוכן להזרקה מכיל את החומר הפעיל: Human hepatitis B Immunoglobulin 500 IU/ml נוגדן הומני (אנושי) לצהבת B בריכוז של 500 IU/מ"ל.

זוטקטרה מכילה 150 מ"ג/m"ל של חלבון פלסמה הומני, מתוכו לפחות 96% אימונוגלובולין G (IgG). הכמות המירבית של אימונוגלובולין (IgA) היא 6 מיקרוגרם/מ"ל.

לרשימת החומרים הלהייתי פעילים, אנו ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקל להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה מיועדת למבוגרים בלבד.

- זוטקטרה מכילה נוגדנים כנגד וירוס הצהבת B, המשמשים כחומרי הגנה טבעיים של הגוף מפני צהבת B. צהבת B הינה דלקת כבד הנגרמת על ידי וירוס צהבת B.

- מידע לגבי חומר הגלם של זוטקטרה והסיכוי להעברת מחוללים זיהומיים:**

מאחר שמוצר זה מיוצר מפלסמה אנושית, יש סיכוי להעברת מחוללים זיהומיים, כגון נגיפים או זיהומים מסוגים אחרים.

חשוב לרשום את שם ומספר האצווה של זוטקטרה. כך שבכל פעם שאתה מקבל אריזה חדשה, **רשום את התאריך ומספר האצווה** (המופיע על האריזה אחרי "lot") ושמור את המספר הזה במקום בטוח, למשל יומן הטיפול שלך (ראה סעיף 3).

- חיסונים:**

זוטקטרה יכולה להפחית את יעילותם של חיסונים מסוימים (חצבת, אדמת, חזרת, אבעבועות רוח) לתקופה של עד 3 חודשים.

יתכן ותאלץ לחכות לפחות 3 חודשים לאחר ההזרקה האחרונה של זוטקטרה, לפני שתוכל לקבל חיסונים חיים מוחלשים.

יש לדווח לרופא על הטיפול שלך בזוטקטרה לפני קבלת חיסון כלשהו.

1. למה מיועדת התרופה?

זוטקטרה מיועדת למניעת הידבקות חוזרת בצהבת B במבוגרים אשר עברו השתלת כבד לפני שבוע לפחות, בשל אי ספיקת כבד שנגרמה על ידי מחלת הצהבת B.

קבוצה תרפויטית: אימונוגלובולין לצהבת B.

2. לפני השימוש בתרופה

<p>אין להשתמש בתרופה אם:</p> <ul style="list-style-type: none">אתה אלרגי לחומר הפעיל (אימונוגלובולינים הומניים) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים של התרופה הזאת (מפורט בסעיף 6). במיוחד, במקרים נדירים מאוד של כמות בלתי מספקת של אימונוגלובולין A (IgA), כאשר יש נוגדנים נגד IgA בדמך. דבר זה עלול להוביל לתגובה אלרגית חמורה (אנפילקסיס). <p>תגובה אלרגית עלולה לכלול צפצופים פתאומיים בנשימה, קשיי נשימה, דופק מהיר, נפיחות בעפעפיים, בפנים, בשפתיים, בגרון או בלשון, פריחה או גירוד.</p>
--

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני השימוש בתרופה זוטקטרה, ספר לרופא** על כל תרופה או מזון שאתה גריש אליהם.
- זוטקטרה מיועדת להזרקה תת-עורית בלבד.** הזרקה לוריד או לכלי דם עלולה להוביל לתגובת שוק אלרגית.
- ספר לרופא או לצוות הרפואי לפני הטיפול** אם נאמר לך כי קיימים אצלך נוגדנים כנגד אימונוגלובולינים מסוג IgA בדם. זוהי תופעה נדירה מאוד העלולה לגרום לתגובה אלרגית.
- אתה עלול להיות אלרגי לאימונוגלובולינים** (נוגדנים) ללא ידיעתך, גם אם עברת בשלום טיפולים קודמים באימונוגלובולינים הומניים. בעיקר אם אין לך מספיק אימונוגלובולינים מסוג IgA בדם, ותגובות אלרגיות כגון ירידה פתאומית בלחץ הדם או תגובת שוק עלולות להתרחש.
- אתה תהיה במעקב צמוד בזמן ההזרקה הראשונה של זוטקטרה זמן קצר לאחר מכן** על מנת לוודא כי אינך סובל מתגובה לתרופה. אם יש לך תגובה אלרגית לזוטקטרה, ההזרקה תיעצר מיד. יש לדווח מיידית לרופא או לצוות הרפואי אם אתה מבחין בתגובה כלשהי במהלך הזרקת זוטקטרה.
- אם אתה חיובי לאנטיגן HBs**, לא תקבל את התרופה זוטקטרה כיוון שאין תועלת במתן התרופה לך. הרופא יוכל להסביר זאת לך.
- לשם שמירה על ביטחונך**, תהיה במעקב קבוע של רמת הנוגדנים שלך.
- השפעות אפשריות על בדיקות דם:** זוטקטרה עלולה להשפיע על תוצאות של חלק מבדיקות הדם (בדיקות סרולוגיות). יש לדווח לרופא שלך על הטיפול בזוטקטרה לפני בדיקות דם כלשהן.

מידע לגבי חומר הגלם של זוטקטרה והסיכוי להעברת מחוללים זיהומיים:

זוטקטרה מיוצרת מפלסמה הומנית (אנושית). מאחר שמוצר זה מיוצר מפלסמה אנושית, יש סיכוי להעברת מחוללים זיהומיים, כגון נגיפים או זיהוומים מסוגים אחרים.

בתרופות המיוצרות מפלסמה אנושית, ננקטים אמצעים למניעת העברת זיהומים למטופלים. אמצעים אלה כוללים:

בחירת תורמים מתאימים לצורך שיללת תורמים שנמצאים בסיכון לנשיאת מחוללי מחלות ובדיקת כל תרומה ומאגרי פלסמה לנוכחות נגיפים/זיהומים.

בנוסף, יצרני תרופות מסוג זה כוללים בתהליך הייצור שלב שמטרתו להרחיק ולנטרל וירוסים. למרות כל האמצעים המפורטים לעיל, לא ניתן לשלול אפשרות להעברת זיהום בעת מתן תרופות המיוצרות מפלסמה אנושית. הדבר נכון גם לגבי וירוסים או זיהומים חדשים או לא ידועים.

האמצעים המפורטים נחשבים ליעילים לצורך מניעת זיהומים הנגרמים על ידי וירוס ה-HIV, הפטיטיס A, B ו-C.

אמצעים אלה אינם נחשבים ליעילים לצורך מניעת זיהומים הנגרמים על ידי וירוס parvovirus B19, אולם ככל הנראה לנוגדנים בתכשיר השפעה מגנה מפני זיהום בוירוס זה.

חשוב לרשום את שם ומספר האצווה של זוטקטרה, כך שבכל פעם שאתה מקבל אריזה חדשה, **רשום את התאריך ומספר האצווה** (המופיע על האריזה אחרי "lot") ושמור את המידע הזה במקום בטוח, למשל יומן הטיפול שלך (ראה סעיף 3).

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה או שאתה מתכוון לקחת, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

זוטקטרה יכולה להפחית את יעילותם של חיסונים מסוימים (חצבת, אדמת, חזרת, אבעבועות רוח) לתקופה של עד 3 חודשים. יתכן ותאלץ לחכות לפחות 3 חודשים לאחר ההזרקה האחרונה של זוטקטרה, לפני שתוכל לקבל חיסונים חיים מוחלשים.

יש לדווח לרופא על הטיפול שלך בזוטקטרה לפני קבלת חיסון כלשהו.

הריון, הנקה ופוריות: אם הינך בהריון או מניקה, חושבת שהרית או מתכננת להביא ילד לעולם, התייעצי עם הרופא או הצוות הרפואי לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכוונת: זוטקטרה חסרת השפעה או בעלת השפעה זניחה על יכולת הנהיגה שלך או יכולת השימוש במכוונת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
- עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
- זוטקטרה מיועדת להזרקה תת-עורית**. התכולה של מזרק אחד המוכן להזרקה מיועדת לשימוש חד פעמי בלבד. **אין להזריק לכלי דם.**
- ברוב המקרים הזריקה תינתן לך על ידי הרופא שלך או האחות. יחד עם זאת, במידה ורמת הנוגדנים שלך מספיק טובה, ואתה נתון למשטר מינון קבוע, אתה או המטפל שלך תוכלו לקבל הדרכה לגבי המשך ביצוע הזריקות בבית (ראה להלן).
- לצורך תיעוד הזיקות זוטקטרה שלך, מומלץ מאוד להשתמש ביומן טיפולים. הרופא שלך יסביר לך כיצד להשתמש ביומן.
- המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.**
- אין לעבור על המנה המומלצת.**
- אין לבלוע.
- המינון תלוי במצבך. הרופא שלך יבדוק את מצבך בקביעות ויסביר לך מה היא הכמות ובאיזו תדירות עליך להשתמש בזוטקטרה.
- הזרקה עצמית או על ידי מטפל:**

אתה יכול להזריק את זוטקטרה בעצמך ללא עזרת הרופא שלך, אם הוא הדריך אותך לעשות זאת. **במידה ואתה מבצע הזרקה עצמית, עליך לקרוא בעיון את ההוראות בסעיף "אין להזריק זוטקטרה בהזרקה עצמית או על ידי מטפל"** טרם השימוש יש לאפשר לזוטקטרה להגיע לטמפרטורת החדר (בערך 27°C-23°C).

בדיקות ומעקב: לפני תחילת הטיפול בתרופה ובתקופת הטיפול תהיה במעקב קבוע של רמת הנוגדנים שלך בדם.

- אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עליך לפנות לרופא שלך, לצוות הרפואי או לרוקח מיד לקבלת ייעוץ. ההשלכות של מינון יתר אינן ידועות.
- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
- אם שכחת ליטול תרופה זו** בזמן הדרוש אין ליטול מנה כפולה. התייעץ עם הרופא לגבי בקרת המינון. הרופא שלך יסביר לך מה היא הכמות ובאיזו תדירות עליך להשתמש בזוטקטרה.
- יש להתמיד בטיפול בזוטקטרה, כפי שהרופא רשם והנחה אותך, על מנת להימנע מהסיכון של הידבקות חוזרת במחלת הצהבת B.**
- גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזוטקטרה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

במקרים נדירים אימונוגלובולינים הומניים עלולים לגרום לתגובה אלרגית חמורה.

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם אתה מבחין באחת מהתופעות הבאות: פריחה, גירוד, צפצופים בנשימה, קשיי נשימה, נפיחות בעפעפיים, בפנים, בשפתיים, בגרון או בלשון, לחץ דם נמוך או דופק מהיר.

זו עלולה להיות תגובה אלרגית או תגובה אלרגית חמורה (שוק אנאפילקטי).

בכל מקרה של תופעת לוואי כלשהי לאחר ההזרקה, פנה לרופא שלך באופן מייד.

תופעות לוואי נוספות שדווחו בשימוש עם זוטקטרה

מופיעות לעיתים קרובות (עלולות להשפיע על עד ל-1 מתוך 10 אנשים): תגובות במקום ההזרקה: כאב, סרפדת במקום ההזרקה, המטומה (הצטברות דם ברקמה שמתחת לעור), אדמומיות בעור (אריתמה).

מופיעות לעיתים רחוקות (עלולות להשפיע על עד ל-1 מתוך 100 אנשים): כאב ראש, כאב בבטן העליונה (מחזזה עד לטבור).

בנוסף, התגובות הבאות דווחו פעם אחת בלבד: עייפות (לשיחות), לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם), דלקת באף ובלוע, התכווצות שרירים, תגובות אלרגיות (רגישות יתר), דופק לא סדיר (דפיקות לב), אי נוחות לבבית, גירוד (קשקוץ), פריחה, כאב בפה או בגרון.

בתכשירים אחרים המכילים אימונוגלובולינים אנושיים, דווחו התסמינים הנוספים הבאים: צמרמורת, כאב ראש, סחרחורות, חום, הקאה, תגובות אלרגיות מתונות, בחילה (דחף להקיא), כאב במפרקים, לחץ דם נמוך, כאב מתון בגב התחתון, תגובות באזור ההזרקה: נפיחות, כאב, אודם, התקשות של העור, חום מקומי, גרד, שטפי דם ופריחה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הביתה של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לחברת קמהדע בע"מ בדוא"ל:

pharmacovigilance@kamada.com

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ולא/ואו תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי אריזת הקרטון החיצונית, הבליסטר ותווית המזרק המוכן להזרקה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן ולשנע בקירור (8°C-2°C).
- אין להקפיא.
- יש לאחסן את המזרק המוכן להזרקה באריזה המקורית, על מנת להגן מאור.
- ברגע שפקק המגן הוסר מהמזרק המוכן להזרקה, יש להזריק את התמיסה מיידית.
- אין להשתמש בזוטקטרה אם אתה מבחין שהתמיסה עכורה או שיש בה חלקיקים.
- אין להשליך תרופות דרך הביוב או פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.
- לאחר השלמת תהליך ההזרקה, יש להשליך מיידית את כל המחטים, המזרקים ומכלי הזכוכית הריקים למכל המיועד לפריטים חדים.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Glycine and water for injections.
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
- זוטקטרה מגיעה בצורה של תמיסה להזרקה בתוך מזרק מוכן להזרקה (מזרק אחד מוכן להזרקה של 1 מ"ל זוטקטרה מכיל 500 IU). זוטקטרה מגיעה באריזה המכילה 5 מזרקים מוכנים להזרקה, באריזת בליסטר.
- צבע התמיסה הוא בין שקוף לבוהק ובין חסר צבע לצהוב חיוור.
- בעל הרישום: קמהדע בע"מ, בית קמה.
- יצרן: Biotest Pharma GmbH, גרמניה.
- נערך באפריל 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1502633639

איך להזריק זוטקטרה בהזרקה עצמית או על ידי מטפל

ההוראות הבאות מיועדות להסביר כיצד להזריק את התרופה זוטקטרה. יש לקרוא בעיון את ההוראות ולפעול על פיהן צעד אחר צעד. הרופא או הצוות הרפואי ידריך אותך על תהליך המתן. אם לא תנסה להזריק את זוטקטרה לפני שאתה בטוח כי הבנת כיצד יש להכין את תמיסת ההזרקה ואיך לבצע את ההזרקה עצמה.

מידע כללי:

- יש לשמור את המזרקים ואת המכל להשלכת מזרקים הרחק מהישג ידם של ילדים; יש לנעול את הציוד במידת האפשר.
- נסה לבצע את ההזרקה באותה שעה ביום, דבר זה מסייע לזכור זאת.
- עליך לבדוק ולוודא תמיד את המינון.
- יש לאפשר לתמיסה להגיע לטמפרטורת החדר (בערך 27°C-23°C) לפני השימוש.
- הוצא את המזרק המוכן להזרקה מחוץ לאריזה רק כשאתה מוכן להזרקה. ברגע שפקק המגן הוסר מהמזרק המוכן להזרקה, יש להזריק את התמיסה מיידית.
- צבע התמיסה יכול לנוע בין שקוף לבוהק ובין חסר צבע לצהוב חיוור. אין להשתמש בתמיסה עכורה או המכילה חלקיקים.
- אין לערבב את התרופה עם תרופות אחרות.

לפני ההזרקה:

- שטוף את הידיים. חשוב שהידיים שלך וכל הציוד בו אתה משמש יהיו נקיים כמה שיותר.
- פרוס את כל הציוד שתזדקק לו מבעוד מועד. מצא מקום נקי בו תוכל לפרוס את כל הפריטים המיועדים לשימוש:
 - שתי ספוגיות אלכוהול.
 - מזרק מוכן להזרקה אחד של זוטקטרה.
 - מחט אחת המתאימה להזרקה תת-עורית.

שים לב כי ספוגיות האלכוהול והמחטים אינן מגיעות באריזה ועליך לרכוש את הציוד באופן עצמאי.

וודא כי יש ברשותך את יומן הטיפול שלך ומיכל המיועד לפינוי פסולת של חפצים חדים.
- לפני ההכנה להזרקה, עליך להחליט על אזור ההזרקה. עליך להזריק את זוטקטרה לתוך שכבת השומן שבין העור לשריר (בערך 12-8 מ"מ מתחת לעור). המקומות הטובים ביותר להזרקה הם המקומות בהם העור רך ורפוי למשל, הבטן, הזרוע, הירכיים או הישבן, והרחק ממפרקים, עצבים ועצמות.
- חשוב:** אין להשתמש על אזורים בהם אתה מרגיש גושים, בליטות, קשרים קשים, כאב או באזור עם שינוי צבע, שקעים, מצולק, או שהעור בו סדוק. ספר לרופא או לצוות הרפואי על כך ועל כל מצב יוצא דופן שאתה מוצא. עליך לבצע את ההזרקה בסבב, כל הזרקה באזור אחר בגוף. אם קשה לך להגיע לאזורים מסוימים, יתכן ותזדקק לעזרה של מטפל שסייע לך עם ההזרקות באזורים אלו.
- הכן את המזרק המוכן להזרקה של זוטקטרה:

- הוצא את המזרק המוכן להזרקה מהאריזה.
- בחן את התמיסה בקפידה. עליה להיות שקופה ונקיה מחלקיקים. אם התמיסה עכורה, מכילה חלקיקים או צבעה השתנה, השלך אותה והתחל שוב עם מזרק מוכן להזרקה חדש.
- הסר את פקק המגן מהמזרק.

- הוצא את המחט מהאריזה הסטרילית שלה וחבר אותה למזרק.



הוצא החוצה את כל בועות האוויר שיכולות להיות במזרק המוכן להזרקה.

- החזק את המזרק כשהמחט פונה כלפי מעלה, והקש בעדינות על המזרק עם האצבעות עד שכל האוויר מצטבר בקצה העליון של המזרק. דחף בזהירות את הבוכנה פנימה עד שכל בועות האוויר נעלמות.

ההזרקה:

- בחר את אזור הזרקה בגוף ורשום ביומן. בנוסף, רשום את התאריך ואת מספר האצווה (ראה "מידע לגבי חומר הגלם של זוטקטרה והסיכוי להעברת מחוללים זיהומיים" בסעיף 2 בעלון זה).

- בטן:** אין להשתמש באזור הנמצא 2.5 ס"מ מסביב לטבור. הימנע משימוש באזור קו החגורה כיוון שהשפשוף שם עלול לגרות את אזור ההזרקה. הימנע משימוש בצלקות ניתוחיות.
- אזור זה עשוי להיות האזור הקל ביותר להזרקה אם אתה מזריק עצמית.

- ירכיים:** השתמש באזורים המרכזיים והחיצוניים, בהם אתה יכול לצבוט את הרקמה. סביר שתהיה לך יותר רקמת שומן ככל שתתקרב לאזור הירך ותתרחק מאזור הברך.
- זרועות:** יש להשתמש בחלק האחורי העליון של הזרוע. קשה לצבוט את הרקמה ולבצע הזרקה עצמית באזור זה. אם אתה אכן בוחר לבצע את ההזרקה בזרוע בעצמך, נסה לצבוט את הרקמה על ידי הנחת הזרוע העליונה על גב של כסא או השען אותה כנגד הקיר. למישהו אחר הרבה יותר קל לבצע באזור זה אם אכן תזדקק לעזרה.

- ישבן:** השתמש בכל אזור בו תוכל לצבוט את הרקמה. קשה יותר לבצע הזרקה עצמית באזור זה. נסה לעמוד מול המראה כדי לאתר את האזור או שיתכן ותוכל לבקש מהמטפל שלך לתת לך את הזריקה.


חשוב לבצע סבב בין כל אזורי ההזרקה. דבר זה יעזור לעור להשאר גמיש ויעזור לתרופה להספג בצורה אחידה. הכוונה ביצוע סבב בין אזורי ההזרקה היא להתחיל באזור מסוים ואז לבצע את ההזרקה בכל שאר האזורים בגוף לפני שחוזרים לאזור הראשון. אחר כך יש להתחיל שוב את הסבב. כדאי לתעד ולרשום את האזור בו בצעת את הזרקה בפעם האחרונה על מנת להימנע מבעיות.

הזרקה לירכיים ניתנת כדוגמא בתמונות הבאות:

- נגב את האזור המיועד עם ספוגית אלכוהול. תן לעור להתייבש באוויר.



- צבוט בעדינות את העור שמסביב לאזור ההזרקה המחוטא (על מנת להעלות אותו קצת) ודחוף את המחט לעור בתנועה מהירה ובטוחה, בזווית של 45 עד 90 מעלות. הזרק מתחת לעור כדי שהודרכת על ידי הרופא או האחות.




הזרק את הנוזל על ידי דחיפת הבוכנה


- בעדינות. תן לעצמך מספיק זמן כדי להזריק את התמיסה כולה עד שהמזרק יתרוקן.



- לאחר מכן הוצא מיד את המזרק ושחרר את העור הצבוט.



- נקה את אזור הזרקה על ידי ניגובו בספוגיית אלכוהול בצורה מעגלית.



השלך את כל הפריטים המשושמים

ברגע שתהליך ההזרקה הושלם, השלך מיידית את כל המחטים ומכלי הזכוכית הריקים למכל המיועד לפריטים חדים.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. עם זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

^[1] 3200001003-05