

نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

يجري تسويق الدواء دون وصفة طبية

كلين - أف

قطرات للأنف

التركيب:

المواد الفعالة والتركيز : كلوريد الصوديوم 0.9% w/v
(Sodium Chloride 0.9% w/v)

لقائمة المواد غير الفعالة، انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك استخدام الدواء بشكل صحيح. استشر صيدلياً إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض أو لم يطرأ تحسن بعد ٣ أيام.

١ لماذا مُعد الدواء؟

لتخفيف من الاحتقان في الأنف لدى الأطفال والأولاد الصغار.

الفصيلة العلاجية: محلول ملح

٢. قبل استخدام الدواء

ⓧ يُمنع استخدام الدواء:

• إذا كانت لديك أو لدى طفلك حساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

ⓧ تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

- لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب قبل بدء العلاج. إذا كنت أنت أو طفلك تعانيان حالياً أو عانيتما من اضطراب في أداء القلب وأو الأوعية الدموية، فرط ضغط دم الكبد.
- إذا كانت لديك حساسية طعام أو دواء أيًا كان.
- يمنع استعمال هذا الدواء على فترات متقاربة أو متواصلة دون استشارة الطبيب.
- إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء.
- يحتوي المستحضر على كلوريد البنزوكونيوم، الذي يمكن أن يسبب حكة في بطانة الأنف الحنك والإرضاع. يمكن استخدام الدواء خلال الحمل أو الإرضاع.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تتفحص من طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا طريقة الاستعمال. واخروا الأنف بعمود. أمّل رأسك إلى الوراء إلى الخلف خلال الوقوف أو الجلوس، أو أتمه وأمل رأسه جانبًا. قم برش القطرات في كل من المنخرين، أثناء إمالة الرأس إلى الخلف ليعكس دفق، لتتيح للدواء أن ينتشر في جوف الأنف.

• اغسل القطارة مستعملًا بماء حار، وجففها بمساحة منديل ورقي نظيف. يجب إغلاقها بجمع جيدًا بعد الاستخدام. من أجل منع انتشار البكتيريا، يجب استعمال نفس عبوة الدواء لأكثر من طفل واحد. يجب الحرص على قياس الجرعة من القطارة.

الجرعة الدوائية:

الجرعة المعمول بها في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: قطرتان في كل منخر، مرة - ٤ مرات في اليوم. لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

في حال لم يطرأ تحسن في الحالة خلال ٣ أيام يجب التوجه إلى الطبيب استئجابًا. يمنع الأتباع. هذا الدواء معد للاستخدام في الأنف. يمنع الاستعمال في العينين. إذا تناولت وجبة مفردة عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع الولد من الدواء، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى فورًا، مصطحبًا عبوة الدواء معك.

إذا نسيبت تناول الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة فور تذكرك، لا يجب تناول جرعتين معًا في أي حال من الأحوال.

لا تتناول الأدوية في الظلمة، الفصم اللامسة والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنت تتجاهلها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام كلين - أف أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين، مثل تهيج أو حرقنة وقتية في الأنف.

لا تقم لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب في حال:

• فرط ضغط الدم (مثل احمرار في الوجه)

• طفح أو التهاب موضعي (لم يكنوا موجودين قبل استعمال المستحضر)، (نادر)

ⓧ الأعراض الجانبية لدى الأولاد والرضع

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأي أعراض جانبي، وكذلك بأي آخر يتناوله الولد. انظر أعلاه تفصيل الأعراض الجانبية الخاصة. إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، أذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو حين تعاني من أعراض جانبية لم تذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il

٥. كيف تخزن الدواء؟

- امنع التسرب! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال وألوالد، والرضع، وذلك لتفادي التسمم. لا تسبب التقيؤون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date). الظاهر على ظهر العبوة.
- تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المشار إليه.
- خزن في مكان بارد لا يزيد درجة حرارته عن 25°، بعيدًا عن الأطفال.
- احفظه في العبوة الأصلية. يمكن استخدام المستحضر لمدة شهر بعد فتحه.
- لا يجب استخدام هذا الدواء إذا لاحظت تغييرًا في لون المحلول أو إذا أصبح معكرًا.

٦. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Purified Water, Benzalkonium Chloride Solution

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العيوي: سائل شفاف. المحتوى: ٢٠ مليلترًا

المنتج وصاحب التسجيل:

بين شمعون فلويز برص، مرض، المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متجول مسغاف ٢٠١٧٤٠٠

بتفصيص واعاد هذه النشرة في ١٢،٢٠١١ وفق توجيهات وزارة الصحة رقم تسجيل منتج تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ٢٤٤٩٢٠٠ ١١١١١١

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، الدواء معد للبناء كالأدوية.