

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## عارافا 10 ملغ، عارافا 20 ملغ، أقراص مطلية

SANOFI

المادة الفعالة:

يحتوي كل قرص مطلي من عارافا 10 ملغ على:

ليفونوميديد 10 ملغ

يحتوي كل قرص مطلي من عارافا 20 ملغ على:

ليفونوميديد 20 ملغ

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و الفقرة 6 "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موزجة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجل... لا تعطيه للأطفال. فهو قد يضرهم حتى ولو بدك أن حالتهم الطبية مشابهة للحالت.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر عارافا بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات حول الأمان التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ عارافا والتصرف وفقها. يجب عارافا بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقرائها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

### 1) لأي غرض مخصص الدواء؟

ينتمي عارافا إلى فصيلة أدوية المسماة مضادات الرثية. وهو يحتوي على المركب الفعال ليفونوميديد.

يستخدم عارافا لمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي النشط لدى الكبار لإبطاء تقدم المرض ولتحسين الأداء الوظيفي الجسدي، أو لمعالجة التهاب المفاصل الصدفي (psoriatic) النشط.

**الفصيلة العلاجية:** من المثبطات الإنتقائية لجهاز المناعة.

أعراض التهاب المفاصل الروماتيزمي تشمل: التهاب المفاصل، إنتفاخ، صعوبة في الحركة وآلم. أعراض أخرى التي تؤثر على كامل الجسم تشمل: فقدان الشهية للطعام، سخونة، تناقص الحيوية وفقر الدم (قلة خلايا الدم الحمراء).

أعراض التهاب المفاصل الصدفي النشط تشمل: التهاب المفاصل، إنتفاخ، صعوبة في الحركة، ألم وبقع حمراء وقشرة على الجلد (آفات جلدية).

### 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة، حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي لـ ليفونوميديد (بالأخص رد فعل جلدي شديد، مترافق في أحيان متقاربة بسخونة، آلم مفصلي، بقع جلدية حمراء، أو حويصلات، مثلاً متلازمة Stevens-Johnson) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية")، أو إذا كنت أدرجي لتريفونوميديد (يستخدم لعلاج التصلب المتعدد)،

- لديك أية مشاكل في الكبد،
- لديك مشاكل في الكلى متوسطة حتى شديدة الدرجة،
- لديك كمية منخفضة جداً من البروتينات في الدم (hypoproteinaemia)،
- كنت تعاني من أية مشكلة تؤثر على الجهاز المناعي لديك (الإيدز مثلاً)،
- لديك مشكلة في نخاع العظم، أو تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء أو البيضاء في الدم أو عدد منخفض للصفائح الدموية،

- كنت تعاني من تلوث خظير،
- كنت في فترة الحمل، تعتقدن بأنك يمكن أن تكوني حاملاً، أو في فترة الرضاعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ عارافا، إحك للطبيب إذا:

- عانيت ذات مرة من مرض التهابي رئوي المسمى مرض رئوي خلالي (Interstitial lung disease).

- مرضت ذات مرة بالسل أو إذا كنت على تماس قريب من شخص مريض أو مرض في الماضي بالسل. من شأن طبيبك أن يجري فحوصات ليتأكد فيما إذا لديك مرض السل (أنظر الفقرة «الفحوصات والمتابعة»).

- إذا كنت ذكراً ولديك الرغبة في إنجاب الأطفال. بما أنه لا يمكن نفي إمكانية إنتقال عارافا إلى السائل المنوي، يجب إستعمال وسائل موقوئق بها لمنع الحمل خلال العلاج بـ عارافا.

- يجب على الرجل الذي يخطط إنجاب طفل التوجه إلى الطبيب الذي من شأنه أن يوصيه بالتوقف عن تناول عارافا وتناول أدوية معينة من أجل تفرغ عارافا بسرعة وبشكل كاف من جسمه. بعد ذلك، يتوجب عليه إجراء فحص دم للتأكد من أنه قد تم تفرغ عارافا بشكل كاف من جسمه وحينها الإنتظار 3 أشهر أخرى على الأقل قبل المحاولة لإنجاب طفل.

- كنت قد قدما على إجتناب فحص دم معين (نسبة الكالسيوم). فإن النتيجة قد تدل بشكل خاطئ على إنخفاض نسب الكالسيوم.

- عارافا يمكن أن يسبب أحياناً مشاكل معينة في الدم، في الكبد، في الرئتين أو في أعصاب الذراعين والرجلين. وهو قد يسبب أيضاً عدم ردود الفعل التحسسية الخطيرة (تتمثل بـ drug reaction with eosinophilia and symptoms systemic) أو يزيد من خطورة حدوث تلوث حاد. لمعلومات إضافية أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية".

- DRESS هو عبارة عن رد فعل يتميز في بدايته بأعراض تشبه الألفارناز وتطفح في الوجه، في السيقا تطفح منتشر بشكل أكبر عن سخونة مرتفعة، إرتفاع نسب إنزيمات الكبد في الدم، زيادة خلايا الدم البيضاء من نوع الحمضات (eosinophil) وإنتفاخ الغدد اللمفاوية.

- توجه لطبيبك إذا وجد لديك إسهال مزمن غير مشخص. من الجائز أن يجري الطبيب فحوص إضافية.

- توجه لطبيبك إذا تطور لديك تفرح في الجلد خلال العلاج بـ عارافا (أنظر أيضا الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

### الأطفال والمراهقون

- عارافا غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

### الفحوص والمتابعة

- يوجهك الطبيب لإجراء فحوص الدم ووظائف الكبد قبل بدء إستعمال الدواء وخلال.

- قبل بدء العلاج، يجب إجراء تقييم لتواجد سل نشط أو غير نشط. يتوجب على المتعالمين الذين يعانون من السل في الماضي أن يكونوا تحت المراقبة الحثيثة جراء إمكانية عودة السل لوضعية نشطة.

- خلال فترة العلاج يوجهك الطبيب أيضاً لإجراء فحوص ضغط الدم وذلك لأن الدواء قد يرفع من ضغط الدم.

- إذا كنت تتناول وارفارين أو أدوية أخرى للإبطاء عن طريق الفم (التي تستعمل حثيثة لـ INR (قيمة التخثر المعيارية، فيجب إجراء مراقبة حثيثة لـ INR (قيمة التخثر المعيارية، النسبة المعيارية الدولية) لديك.

### التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي مثل أدوية ضد الملاريا (مثلاً، كلوروكوين وهيدروكسيكلوروكوين)، الذهب بالحقن العضلي أو بالإعطاء عن طريق الفم، D-بنيسيلامين، آزاثيوبرين وأدوية أخرى مثبطة لجهاز المناعة (مثلاً، ميتوتريكسات)، وذلك لأن هذه المشاركات غير موصى بها،

- وارفارين وأدوية أخرى للإبطاء عن طريق الفم المستعملة لتسريع الدم، والتي يتطلب تناولها مراقبة ومتابعة وذلك لتقليل خطورة حدوث الأعراض الجانبية الخاصة بها،

- تريفونوميديد (للتصلب المتعدد)،
- ريجابليتيد، بيوجليتازون، ناتيغليتيد أو روزيجليتازون (السكري)،

- داونوروبيسين، دوكسوروبيسين، باكليتاكسيل أو توبوتيكان (للسرطان)،

- دولوكسيتين (للإكتئاب، لسلس البول أو لمرض كلوي لدى مرضى السكري)،

- أوسيترون (لعلاج الإسهال الشديد).

- توفيلين (لرئوي)،
- تيزانيدين (مرخي للعضلات)،
- أقراص منع الحمل (التي تحتوي إيتينيل إسترايول وليفونورجستريل)،
- سيفاكلور، بنزيلبينيسيلين (بينيسيلين G)، سيبروفلوكساسين (للتلوثات)،

- إندومتاسين، كيتوبروفين (لآلم أو الإنتهاب)،
- فروسيמיד (مادة مدرة للبول، لمرض القلب)،

- زيدوفودين (تلوث HIV)،
- روزفاستاتين، سيمفاستاتين، أتورفاستاتين، براقاستاتين (لإرتفاع الكولسترول)،

- سولفاسالازين (مرض معوي التهابي أو التهاب المفاصل الروماتيزمي)،

- كولستيرامين (لتخفيض الكولسترول) أو الفحم الفعال، لأن هذه الأدوية قد تخفض من كمية عارافا الممتصة في الجسم.

- إذا كنت تتناول حاليًا دواء مضاد التهاب لاستيرويدي (NSAID) و/أو كورتيكوستيرويدات، بالإمكان مواصلة تناولها بعد بدء العلاج بـ عارافا.

### التفاعلات

- إذا توجب عليك تلقي لقاح، إستشر الطبيب. بعض اللقاحات لا يمكن إعطائها أثناء العلاج بـ عارافا وبعد فترة معينة بعد التوقف عن العلاج بـ عارافا.

### إستعمال الدواء والطعام

- بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

### إستعمال الدواء والإسهلاك الكحول

- لا يوصى بشرب الكحول خلال فترة العلاج بالدواء. إن شرب الكحول خلال فترة العلاج بالدواء قد يزيد من خطورة حدوث إصابة في الكبد.

### الحمل والإرضاع

- لا تستعلمي الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو تعتقدن بأنك حاملاً. إذا كنت في فترة الحمل أو أصبحت حاملاً أثناء العلاج بالدواء، فستزداد الخطورة لولادة رضيع مع تشوهات خلقية خطيرة. ممنوع على النساء في فترة الخصوبة تناول عارافا بدون إستعمال وسائل موقوئق بها لمنع الحمل.

- إستشيرى الطبيب إذا كنت تخططين للحمل بعد توقف عن العلاج بـ عارافا، وذلك لأنه عليك التأكد من خروج كامل آثار الدواء من جسمك قبل أن تحاولي الحمل. يمكن لهذه الفترة أن تصل حتى الستينين. بالإمكان تقصير هذه الفترة لعدة أسابيع بواسطة تناول أدوية معينة تسرع من تفرغ عارافا من جسمك. على أية حال يجب إجراء فحص دم للتأكد من تفرغ عارافا من جسمك بشكل كاف وحينها الإنتظار شهر واحد إضافي على الأقل قبل الحمل.

- راجعى طبيبك، لمزيد من المعلومات عن الفحوص المخبرية.

- إذا كنت تشكين بأنك أصبحت حاملاً أثناء العلاج بـ عارافا أو خلال الستينين التي تلت التوقف عن العلاج بـ عارافا، فعليك التوجه حلالاً إلى الطبيب وذلك من أجل فحص الحمل. إذا أثبت الفحص بأنك حامل، فمن الجائز أن يقترح الطبيب علاجاً بأدوية معينة وذلك لتفرغ عارافا بسرعة وبشكل كاف من جسمك لتقليل الخطورة الممكنة للرضيع.

- لا يجوز تناول عارافا أثناء فترة الرضاعة وذلك لأن الدواء ينتقل إلى حليب الأم.

### السياقة وإستعمال الماكينات

- لا يجوز السياقة أو تشغيل ماكينات خطيرة خلال فترة إستعمال الدواء لأن هذا الدواء قد يسبب لك الشعور بدوار، الأمر الذي قد يضعف من قدرتك على التركيز والإستجابة.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

- الأقراص تحوي لكتوز. إذا وجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة، راجع الطبيب قبل بدء العلاج.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيحاء من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن وفقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة الإستعمال بالمستحضر.

- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإبتدائي الاعتيادي هو عادة مقدارا دوائياً واحداً من عيار 100 ملغ مرة في اليوم لمدة 3 أيام، وبعد ذلك، يحتاج غالبية المتعالمين لمقدار لكتوز ذو:

- لإلتهاب المفاصل الروماتيزمي: 10 أو 20 ملغ، مرة في اليوم، كأمير متعلق بشدة العرض.
- لإلتهاب المفاصل الصدفي: 20 ملغ، مرة في اليوم. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
- يجب بلع القرص بشكله الكامل مع الكثير من الماء. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/شطر/مضغ القرص.
- إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، توجه إلى الطبيب وأحضر علبة الدواء معك.
- إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حلاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول مقداراً دوائياً حال تذكرك، إلا إذا اقترب موعد المقدار الدوائي القادم.
- لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.
- يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. من الجائز أن تمر 4 أسابيع أو أكثر حتى تبدأ الشعور بتحسن حالتك. بعض المرضى يشعرون بتحسن إضافي بعد 4-6 أشهر من العلاج.
- عادة، يستغرق العلاج بـ عارافا وقتاً مطولاً.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.
- 4) الأعراض الجانبية**
- كما بكل دواء، إن إستعمال عارافا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.
- لا تندم من قامة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.
- يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حلاً إلى الطبيب إذا:
  - كنت تشعر بضعف، تشعر بدوار أو بصعوبات في التنفس، لأن هذه قد تكون علامات لرد فعل تحسسي خطير.
  - تطور لديك طفح جلدي أو تقرحات في الفم، لأن هذه يمكن أن تدل على ردود فعل خطيرة، وأحياناً تشكل خطراً على الحياة (مثلاً):
- Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, DRESS).
- أنظر الفقرة 2.
- يجب التوجه حلاً إلى الطبيب إذا ظهرت إحدى الأعراض الجانبية التالية:
  - جلد شاحب، إرهاق، أو كدمات، لأن هذه يمكن أن تدل على اضطرابات في الدم التي تنتج عن نقص في توازن أنواع مختلفة لخلايا الدم،
  - إرهاق، ألم في البطن أو يرقان (إصفرار العينين أو الجلد)، لأن هذه يمكن أن تدل على حالات خطيرة مثل قصور كبدي، الذي قد يكون مميئاً،
  - أعراض لثولت مثل سخونة، ألم في الحنجرة أو سعال، لأن هذا الدواء قد يزيد من خطورة حدوث ثلوث خطير الذي قد يشكل خطراً على الحياة،
  - سعال أو مشاكل في التنفس، لأن هذه يمكن أن تدل على مشاكل في الرئتين (مرض رئوي خلالي، إرتفاع ضغط الدم الرئوي).
  - وخز غير عادي، ضعف أو ألم في راحتي اليدين أو القدمين، لأن هذه يمكن أن تدل على مشاكل في الجهاز العصبي (إعتلال عصبي محيطي).
- أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10 متعالجين)
  - انخفاض بسيط في عدد خلايا الدم البيضاء (leukopenia)،
  - ردود فعل تحسسية بسيطة،
  - قلة الشهية للطعام، انخفاض في الوزن (عادة ليس ذو أهمية)،
  - إرهاق (asthenia).
  - صداع، دوار،

- شعور مختلف عن المعتاد في الجلد مثل وخز (paraesthesia).
- إرتفاع بسيط في ضغط الدم،
- إلتهاب الأمعاء الغليظة (colitis)،
- إسهال،
- غثيان، تقيؤات،
- إلتهاب أو تقرحات في الفم،
- ألم في البطن،
- إرتفاع في بعض نتائج فحص وظائف الكبد،
- تساقط شعر متزايد،
- إكزيما، جفاف الجلد، طفح، حكة،
- إلتهاب الأوتار (ألم في الأوتار ناتج عن إلتهاب الغشاء المحيط بالأوتار، عادة في راحتي اليدين أو القدمين)،
- إرتفاع في إنزيمات معينة في الدم (creatine phosphokinase)،
- مشكلة في أعصاب اليدين أو الرجلين (peripheral neuropathy).

- أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 100 متعالج)
  - إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر دم) وإنخفاض عدد الصفائح الدموية (thrombocytopenia)،
  - إنخفاض في نسبة البوتاسيوم في الدم،
  - قلق،
  - اضطرابات في حاسة التذوق،
  - urticaria (شرى - nettle rash)،
  - تمزق الوتر،
  - إرتفاع في نسب الشحوم في الدم (كولسترول وتريجليسريدات)،
  - إنخفاض نسب الينوسفات في الدم.

- أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 1.000 متعالج)
  - إرتفاع عدد خلايا الدم المحضات (كثرة المحضات): إنخفاض بسيط في عدد خلايا الدم البيضاء (leukopenia)، إنخفاض عدد كافة خلايا الدم (pancytopenia)،
  - إرتفاع خطير في ضغط الدم،
  - مرض إلتهابي في الرئتين (interstitial lung disease)،
  - إرتفاع في نتائج فحوص وظائف الكبد التي قد تتطور لحالات خطيرة مثل إلتهاب الكبد - hepatitis و يرقان،
  - ثلوات خطيرة تسمى خمج دموي (sepsis) التي قد تكون مميئة،
  - إرتفاع في إنزيمات معينة في الدم (لاكتات ديهيدروجيناز).
- أعراض جانبية نادرة جداً (من شأنها أن تؤثر على حتى 1 من بين 10.000 متعالج)
  - إنخفاض واضح في خلايا دم بيضاء (agranulocytosis)،
  - ردود فعل تحسسية خطيرة وذات خطورة كاملة،
  - إلتهاب في الأوعية الدموية (vasculitis)، بما في ذلك (cutaneous necrotizing vasculitis)،
  - إلتهاب في البنكرياس (pancreatitis)،
  - تضرر خطير في الكبد مثل قصور الكبد أو نخر الذي قد يكون مميئاً،
  - ردود فعل خطيرة، أحياناً تشكل خطراً على الحياة
- Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme).

- قد تحدث أيضاً أعراض جانبية أخرى بشيوع غير معروف مثل قصور كلوي، تناقص في نسبة حمض البول في الدم، إرتفاع ضغط الدم الرئوي، تضرر في خصوبة الرجل (التي تعتبر قابلة للعكس عند التوقف عن العلاج بالدواء)، ثلثة جلدية (تتميز بطفح/إحمرار في مناطق الجلد المعرضة للضوء)، داء الصدفية (جديد أو متناقم)، أو رد فعل تحسسي خطير للدواء يسمى DRESS (أنظر الفقرة 2، "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء") وتقرح جلدي (جرح دائري ومفتوح في الجلد حيث من خلاله يمكن رؤية الأنسجة التي في الأسفل)، والتي بإمكانها أن تحدث بشيوع غير معروف.

إذا ظهر عرض جانبي، إنفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

## التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

## شروط التخزين

يجب التخزين دون 25 درجة مئوية، يجب حفظ القنينة مغلقة بإحكام.

لا يجوز رمي الدواء في مياه المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء. يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

## 6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

**Tablet core:** Lactose monohydrate, maize starch, crospovidone, polyvidone K25, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.

**Film coating:** Methylhydroxypropylcellulose 5Mps, titanium dioxide (E171), talc, macrogol 8000.

Arava 20 mg also contains: yellow ferric oxide (E172).

كل قرص من عيار 10 ملغ يحتوي على 78 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

كل قرص من عيار 20 ملغ يحتوي على 72 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

## كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

عارافا 10 ملغ أقراص مطلية هي بيضاء ومستديرة. مطبوع على جانب واحد منها ZBN. الأقراص معبأة ضمن قنينة ذات 30 قرصاً أو ذات 100 قرص.

عارافا 20 ملغ أقراص مطلية هي مائلة إلى الأصفر وعلى شكل مثلث. مطبوع على جانب واحد منها: ZBO. الأقراص معبأة ضمن قنينة ذات 30 قرصاً أو ذات 100 قرص.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

**صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه:** سانوفي - أفنتيس إسرائيل م.ض، شارع بني جاؤون 10، ص.ب. 8090، نتانيا، إسرائيل.

تم إعدادها في حزيران 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة. لا تشمل هذه النشرة كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفّر لديك أي سؤال أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما الرجاء مراجعة الطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

عارافا 10 ملغ: 121-78-30132

عارافا 20 ملغ: 121-79-30133

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة أغلب هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.