

## إيزيكور أقراص

### التركيز

يحتوي كل قرص على:

إيزيتيميب 10 ملجم

فائدة الماء غير الفعالة وموارد الحساسية في المستحضر أذن الفرقعة 6: [معلومات إضافية] والفرقعة 2: قبل إستعمال الدواء".

اقرأ هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.

### التدالخات/ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت موخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية عنوان وصفة طبية وإضافات غذائية، إخلط الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.  
بلغ طبيب بالأخضر، إذا كنت تتناول دواء/أدوية مع واحد مما يلي:

- سيكلوسپورين (يستعمل في أوقات متقاربة لدى متعالجين ابغاوا زراعة أعضاء)
- أدوية تحوى مركب فعال لمنع تشكل خثارات دموية، مثل وارفارين، فيپينوكومون، أسيتيوكارول أو فلوبيدينيون (أدوية مضادة للتخثر)

- كوليستيرامين (يستعمل أيضاً لتخفيض الكوليسترون)، وذلك لأنّه يؤثر على طريقة عمل إيزيكور

- مستحضرات الفيبرات (يستعمل أيضاً لتخفيض الكوليسترون)  
لم تحد سلامة ونجاعة العلاج المشترك لـ إيزيكور وأدوية من مجموعة الفيبرات لخفض الكوليسترون.

- استعمال الدواء والطعام  
بإمكانك تناول إيزيكور مع أو بدون طعام.

### الحمل والإرضاع

لا يجوز تناول إيزيكور مع ستاتين إذا كنت في فترة الحمل، تحاولين الحمل أو تعتقدين بأنك حامل، إذا أصبحت حاملاً خلال فترة تناول إيزيكور مع ستاتين، توقيفي في الحال عن تناول كل الدوائين وبغى طبيبك.

لا تتوفر معلومات عن إستعمال إيزيكور بدون ستاتين خلال فترة الحمل، إستشيري طبيبك قبل تناول إيزيكور إذا كنت حامل.

لا يجوز تناول إيزيكور مع ستاتين إذا كنت مرضعة، وذلك لأنّه لا يُعرف فيما إذا كانت هذه الأدوية تنتقل إلى حليب الأم.

إذا كنت تتناولين إيزيكور مع أو بدون ستاتين، و كنت ترغبين في الإرضاع، إستشيري الطبيب قبل إستعمال العلاج الدوائي، وكذلك قبل تناول أي دواء إضافي.

إيزيتيميب يتمتعى إلى مجموعة الأدوية المسماة CAI (متبللات امتصاص الكوليسترون)، التي تعيق من امتصاص الكوليسترون في الأمعاء.

### (2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (البريجي) لـ إيزيتيميب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر أيضاً الفرقعة 6: [معلومات إضافية]).
- بمشاركة ستاتين، إذا وجدت لديك حالياً مشاكل في الكبد.
- بمشاركة ستاتين، إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة.

إذا كنت تتناول إيزيكور سوية مع ستاتين، إقرأ من فضلك نشرة المستهلك لنفس الدواء الإضافي.

إذا كنت تعقدت بأن ما ذكر أعلاه ينطبق عليك، فلا تتناول الدواء إلى أن تستشر طبيبك.

**السياسة وإستعمال الماكنتات**  
من غير المفترض أن يضعف إيزيكور من قدرتك على السياقة أو إستعمال الماكنتات، مع ذلك، يجب الأخذ في الحسبان أنه قد يشعر بعض الأشخاص بدوار بعد تناول إيزيكور.

**الأطفال والمرأهقون**  
لا يجوز إعطاء هذا الدواء لأطفال و لمراهقين (أعمار 10 حتى 17 سنة)، إلا إذا وصفت الوصفة من قبل مختص، وذلك لتوفّر معلومات محدودة بخصوص السلامة والتداعع.  
هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 10 سنوات.

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**  
يحتوي إيزيكور على صوديوم يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليغرام صوديوم (23 ملغم) في القرن، وهو بجودة خالٍ من الصوديوم.  
**(3) كيفية إستعمال الدواء ؟**

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. يجب مواصلة تناول الأدوية الأخرى لتخفيض الكوليسترون، إلا إذا أوصى طبيب بالتوقف عن استعمالها، عليك الاستشارة من الطبيب أو الصيدلي إذا تمكنت واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.  
يحدد طبيب القدر الدوائي ودورة العلاج.  
يجب بلع الدواء عن كمية قليلة من الماء.  
لا يجوز شرب القرص. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو ضغط القرص.  
قبل بدء العلاج - إيزيكور، عليك البدء بجمالية لخفض الكوليسترون لديك. عليك المواجهة على هذه الجمية خلال فترة تناول إيزيكور.

**المقدار الدوائي الموصى به هو عادة:**  
قرص واحد من إيزيكور عن طريق الفم، مرة في اليوم.  
بإمكانك تناول إيزيكور في آية ساعة من اليوم. بالإضافة

إذا وصف لك الطبيب إيزيكور بمشاركة ستاتين، بالإضافة تناول كل الدوائين بنفس الوقت، في هذه الحالة أقرأ من فضلك تعليمات الإعطاء في نشرة المستهلك للدواء الإضافي.  
إذا وصف لك الطبيب إيزيكور بمشاركة دواء إضافي لتخفيض الكوليسترون الدوائي على المركب الفعال كوليستيراتين أو أي دواء آخر يحتوي على رابط للحموض الصفرافية، فعليك تناول إيزيكور قبل ساعتين أو بعد أربعة ساعات على الأقل من تناول رابط الحموض الصفرافية.

إيزيكور غير مخصص للأطفال دون عمر 10 سنين.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**  
• بلغ طبيبك عن كافة الحالات الطبية الخاصة بك، بما في ذلك الحساسيات.

• على الطبيب أن يوجهك لإجراء فحص الدم قبل أن تبدأ بتناول إيزيكور مع ستاتين، وذلك لفحص إلى أي حد يعمل كبدك بشكل جيد.  
• من الجائز أن يرغب طبيبك أيضًا بتوجيهك لإجراء فحوص الدم لكي يفحص إلى أي حد يعمل كبدك بشكل جيد، بعد أن بدأت تناول إيزيكور مع ستاتين. لا يوصي بإستعمال إيزيكور، إذا كنت تعاني من مشاكل متعددة أو شديدة في الكبد.

**التدالخات/ التفاعلات بين الأدوية**  
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت موخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية عنوان وصفة طبية وإضافات غذائية، إخلط الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.  
بلغ طبيب بالأخضر، إذا كنت تتناول دواء/أدوية مع واحد مما يلي:

- سيكلوسپورين (يستعمل في أوقات متقاربة لدى متعالجين ابغاوا زراعة أعضاء)
- أدوية تحوى مركب فعال لمنع تشكيل خثارات دموية، مثل وارفارين، فيپينوكومون، أسيتيوكارول أو فلوبيدينيون (أدوية مضادة للتخثر)

- كوليستيرامين (يستعمل أيضاً لتخفيض الكوليسترون)، وذلك لأنّه يؤثر على طريقة عمل إيزيكور

- مستحضرات الفيبرات (يستعمل أيضاً لتخفيض الكوليسترون)

لم تحد سلامة ونجاعة العلاج المشترك لـ إيزيكور وأدوية من مجموعة الفيبرات لخفض الكوليسترون.

**استعمال الدواء والطعام**  
بإمكانك تناول إيزيكور مع أو بدون طعام.

**الحمل والإرضاع**  
لا يجوز تناول إيزيكور مع ستاتين إذا كنت في فترة الحمل، تحاولين الحمل أو تعتقدين بأنك حامل، إذا أصبحت حاملاً خلال فترة تناول إيزيكور مع ستاتين، توقيفي في الحال عن تناول كل الدوائين وبغى طبيبك.

لا تتوفر معلومات عن إستعمال إيزيكور بدون ستاتين خلال فترة الحمل، إستشيري طبيبك قبل تناول إيزيكور إذا كنت حامل.

لا يجوز تناول إيزيكور مع ستاتين إذا كنت مرضعة، وذلك لأنّه لا يُعرف فيما إذا كانت هذه الأدوية تنتقل إلى حليب الأم.

إذا كنت تتناولين إيزيكور مع أو بدون ستاتين، و كنت ترغبين في الإرضاع، إستشيري الطبيب قبل إستعمال العلاج الدوائي، وكذلك قبل تناول أي دواء إضافي.

إذا كنت تتناول إيزيكور سوية مع ستاتين، إقرأ من فضلك

نشرة المستهلك لنفس الدواء الإضافي.

إذا كنت تعقدت بأن ما ذكر أعلاه ينطبق عليك، فلا تتناول الدواء إلى أن تستشر طبيبك.

إذا تناولت من إيزيكور أكثر مما توجب عليك تناوله  
الرجاء إتصل بالطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

#### إذا نسيت تناول إيزيكور

لا جرأة تناول مقداراً موائماً مفترطاً أو إذا بلغ طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه في الحال إلى غرف الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

#### في حال توقفك عن تناول إيزيكور

تحذر من طبلك أو الصيدلي وذلك لأن الكوليستول لديك قد يرتفع من جديد.

#### كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

يتوجب عليك إكمال العلاج كما أوصي من قبل الطبيب.  
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبية، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابق الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.  
إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيزيكور قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أي منها.

تم إستعمال المصطلحات التالية من أجل وصف توادر التبليغ عن أعراض جانبية:  
• شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من واحد من بين 10 متعالجين).

• شائعة (قد تؤثر على حتى واحد من بين 10-100 متعالجين).

• غير شائعة (قد تؤثر على حتى واحد من بين 100 متعالجين).

• نادرة (قد تؤثر على حتى واحد من بين 1:000 متعالج).

• نادرة جداً (قد تؤثر على حتى واحد من بين 10,000 متعالج، بما في ذلك بلاغات متفرقة).

إتصل بطبيبك في الحال إذا كنت تقاسي من ألم مجهول السبب في العضل، حساسية أو ضعف. وذلك لأنه في حالات نادرة المشاكل العضلية، بما في ذلك تفكك العضل الذي قد يسبب ضرراً للكلية، يمكن أن تكون جدية وقد تتحول لحالة تشكل خطرًا على الحياة.

## 5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال / أو الأعراض، وذلك لتفادي اصطيهانه بالتسهيل. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز إستعمال إيزيكور بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (date) الذي ظهر على طهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان جاف ومحمي من الضوء.  
لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو سلة النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

## 6) معلومات إضافية

### ماذا يحوي إيزيكور؟

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا: Mannitol, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose sodium, Povidone, Sodium lauryl sulfate, Magnesium stearate.

### كيف يبدو إيزيكور ومحتوى العلبة

إيزيكور معبأ ضمن قناعات (بايسستر) بداخل علبة كرتون. يكل عليه يوجد 5، 10، 14، 15، 20، 28، 30، 30، 56 قرصاً.

### من الجائز أن تستيقظ كافة أحجام العلب.

إيزيكور هي عبارة عن أقراص مستديرة، محدبة الجانبين ذات لون أبيض.

اسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم م.ض، ص.ب.

### 6121301 21429 21429 - أبيبي، 6121301.

اسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ض، پارك الصناعة "مافو كرمل".

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 156 11 34500 01.

من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه التشركة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعداده في شباط 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

بلغ عن حدوث أعراض من الحساسية بالإستعمال العام، التي تشمل إنفاس الوجه، الشفتين، اللسان / أو الح猩زة، التي قد تسبب صعوبة في التنفس أو البالع (التي تتطلب علاجاً فوريًا).

عند إستعمال إيزيكور لوحده، بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية:

• شائعة: ألم في البطن؛ إسهال؛ غازات؛ الشعور ببرد العرق.

• غير شائعة: ارتفاع في بعض فحوص الدم المخبرية لوظائف الكبد (ناتقلات الأمين) أو العضل (CK):

سعال؛ اضطرابات في الورم؛ حرقان؛ غثيان؛ ألم في المفاصل؛ تقلصات ضلائية؛ ألم في الرقبة؛ فلة الشهوة للطعام؛ ألم في الصدر؛ هبات من المعدة؛ ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة لذلك، عند الإستعمال مع ستاتين، بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية:

• شائعة: ارتفاع في بعض فحوص الدم المخبرية لوظائف الكبد (ناتقلات الأمين)؛ صداع: ألم في المقلات، حساسية أو ضعف.

• غير شائعة: الشعور بوخز؛ جفاف الفم؛ حكة؛ طفح؛ شرى: ألم في الظهر؛ ضعف في العضل؛ ألم في الذراعين والرجلين؛ إرهاق غير عادي أو ضعف غير عادي؛ إنفاس، خاصة في اليدين وراحتي القدمين.

عند الإستعمال مع فينوفيرات، بلغ عن حدوث العرض الجانبي الشائع التالي: ألم في البطن.

بالإضافة لذلك، بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية بالإضافة إلى ذلك، بغرض حفظ الأعراض الجانبية المذكورة، دواؤ: ألم عصلي: مشاكل في الكبد؛ ردود فعل تحسسية شاملة تشمل طفح وشرى: طفح أحمر بارز، يتراقص أحياناً مع آفات على شكل لوح هف (مامي متعددة الأشكال): ألم في العضل، حساسية أو ضعف؛ تفكك العضل؛ حصى في المدار أو انتهاك المدار (الذى

من شأنه أن يسبب ألم في البطن، غثيان، تقيؤ)؛ إلتهاب البنكرياس، يتراقص أحياناً بالالم شديد في البطن؛ إمساك؛ تناقص تعداد خلايا الدم، الذي قد يؤدي لحدوث كتمة/ نزف (قلة الصفائح الدموية)؛ الشعور بوخز؛ إكتئاب؛ إرهاق غير عادي أو ضعف؛ ضيق تنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عدتها تتعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه التشركة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي»، الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التموج المباشر للت bliغ عن آعراض جانبية.

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ «شركة يونيفارم».