

لو تان یلو س

ألفاظ

- | لوقاتن بلوس | نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986 |
|--|---|
| <p>التركيز: يحيوكي كل قرص من لوقاتن بلوس على:
لوسارتان بروتاسيوم 50 ملغم
هيدروكلوروكورتيازيد 12.5 ملغم
المكونات المادرة في الفعالة وموادات الحساسية في المستحضر، الرجاء أخفر الفقرة 6 "معلومات إضافية".
اقرأ الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات لوقاتن بلوس".</p> <p>تحتوي هذه النشرة على معلومات موجودة في لوقاتن بلوس. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي.</p> <p>ومن فضلك احتفظ بهذه النشرة على دواعي لآخر، فهو قد يضره، حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطيبة مشابهة لحالتك.</p> <p>لوقاتن بلوس غير مخصص للأطفال والمرأهقين ما دون عمر 18 سنة.</p> | <p>(1) لأي غرض مخصص الدواء؟</p> <p>لوقاتن بلوس مخصص لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، ويساعد أيضاً على تقليل خطرة حدوث سكتة لدى مرضى عباقون من ضغط مرتفع وصمامات في بطين اليسير (بطين الأسماك).
الفصيلة العلاجية: لوقاتن بلوس هو عبارة عن مزيج من حاجب المستقبل أجيوجنتسين II (لوسارتان) ومدر البول من نوع تبايزيد (هيدروكلوروكورتيازيد).</p> <p>(2) قبل إستعمال لوقاتن بلوس</p> <p>لا تتناول لوقاتن بلوس إذا:</p> <ul style="list-style-type: none"> - كث حساس (البريجي) أو لوسارتان، هيدروكلوروكورتيازيد أو لكل واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء - (أنظر معلومات إضافية في الفقرة 6). - تناولت سولفوناميدات (مثلاً: تبايزيد أخرى، بعض الأدوية - الصدفيات والجراثيم مثل كريتو-ميوكوكازول، إسال طبيبي إذا لم تكون قادر على تناولها. - لديك خلل خطير في وظيفة الكبد. - لديك سلس متخفية من البوتاسيوم أو نسب مرتخنة من الصوديوم أو نسب مرتخنة من الكالسيوم، التي لا يمكن تصحيحها بالعلاج. - كنت تعاني من ندبة في العين. - كنت حاملة أكثر من ثلاثة أشهر (يُفضل أيضاً الامتناع عن لوقاتن بلوس في بداية الحمل - نظري فرقعة الحمل والإرضا). - لديك ضرب خطيء في وظيف الكلى أو أن كليتك لا تلتقي بـ لوقاتن بلوس. - لديك السكري أو خلل في وظائف الكلى وكنت تتراجعت بـ لوقاتن بلوس. <p>تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لوقاتن بلوس:</p> <p>إذا كنت تعاني من ضعف في الرؤية أو ألم في العين، هذه يمكن أن تكون أعراض لارتفاع سوائل في طبقة الأوعية الدموية للعين (choroidal effusion) أو ارتفاع في ضغط العين ويمكن أن تظهر خلال ساعات حتى أسبوعين من تناول لوقاتن بلوس. إذا لم يتم علاج هذه الحالة، فهي قد تؤدي إلى فقدان دائم للبصر، إذا وجدت ذلك في الماضي ساسبية بليبيسيلين أو سولفوناميد، فمن الجائز أن تكون معرضًا لخطورة أكبر في أن تتطور لديك هذه الأعراض.</p> <p>ويجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعدين بأنك حامل (أو من شأنك أن تصحيحي حامل)، لا يوصى بإستعمال لوقاتن بلوس في بداية الحمل ومتى تناولت لوقاتن بلوس، لأن ذلك له قد يسبب ضرب خطير.</p> <p>لوقاتن بلوس إذا كنت تناولت في هذه المرحلة (نظري فرقعة الحمل والإرضا).
قبل العلاج بـ لوقاتن بلوس من المهم إبلاغ الطبيب إذا:</p> <ul style="list-style-type: none"> - أصبت في الماضي سرطان بطريقك، أو شفتين (سرطان في العين)، يجب حماية الجلد من التعرض - إن إستعمال هيدروكلوروكورتيازيد قد يزيد من خطرة تطور سرطان في العين وفي الشفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلادوتوما)، خاصة في إستعمال طبقة الأدمي مقاير دولائية عالية. يجب حماية الجلد من التعرض الشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) خلال فترة إستعمال لوقاتن بلوس - عانيت في الماضي من انتفاخ في الوجه، الشفتين، الخنجرة أو اللسان - كنت تناولت مركبات بولية - كنت تخضع لحمية فقيرة بالأملاح - كنت تعاني أو كنت من تقيّبات و/أو سهال شديد - لديك خلل في وظائف الكبد (أنظر الفقرة 2 "لا تتناول لوقاتن بلوس إذا") |

بالتوقف عن تناول لوتان پلوس قبل حصول الحمل أو لحظة أن عرفت بأنك حامل ويوصي بتناول دواء عوضاً عن لوتان پلوس. لا يوصي بإستعمال لوتان پلوس خلال فترة الحمل ويمتنع تناوله بعد الشهر الثالث من الحما، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للجنين إذا تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.

300 *Div. -*

الاستعمال لـ **طبيك** إذا كنت مرضعة أو قبلة على البدء في الإرضاع. لا يوصي بإستعمال لوكان بلوس لدى الأمهات المرضعات، ومن شأن طبيك أن يختار من أجل علاج آخر إذا كنت ترغبين بالإرضاع.

استعمال اقتان دادن

لوقان يلوض يحمل ويتم تحمله بشكل جيد ومتناوily لدی غالبية المرتضی البالغین الكبار والأصغر سنًا. بالمناسبة غالبية المرض الكلري ينطلب الأمر نفس المقاييس المأثاثة، كما هو الحال لدى المرض الأخص سنتين.

ام اکناتو

عندما تبدأ بالعلاج بهذا الدواء، لا يجوز إجراء المهامات التي تتطلب الإنتباه الخاص (مثلاً: سيارة المركبات تشغيل الماكينات الخفيفة) إلى أن تعرف كيفية إستجابتكم للدواء.

لیس ها

تحتوي أوراق لوكان بلوس على الكلتوز (المحتوى البيوسسيوم، انظر المقدمة).
تحتوي أوراق لوكان بلوس على الكلتوز (المحتوى الالكتوز، انظر الفقرة 6).
إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لبعض السكريات، إتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

كتاب الدواء

يجب دائمًا استعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب.
يل الإستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم يكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
من المهم مواصلة تناول لوتوان بلوس لطالما وصفه طبيبك لك من أجل المحافظة على السيطرة على ض

وائی و طریفہ العلاج

بالإمكان تناول لوتان بلوس مع أو بدون طعام. يجب بلع الدواء مع كأس من الماء.
المقدار الدوائي العادي عادة هو:
ارتفاع ضغط الدم

دی من لوتان پلوس

لليوم، وذلك للسيطرة على ضغط الدم لطيفة فتره من الزمن قدرها 24 ساعه. المقدار الدوائي اليومي الأعف هو قرصين للليمون من لوتان بلوس، مرة في اليوم.

المرضى الذين يعانون من ضغط دم مرتفع وسماكه في البطن الأيسر

وأئي من قبل الطبيب

- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
- إذا دعت الحاجة، بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري.
- لا توجد معلومات حول سحق أو مضغ القرص.

پلوس اکٹر مما تر

فرط الجرعة الدوائية يمكن أن يؤدي لبloating في ضغط الدم، ضربات قلب، تباطؤ النسخن؛ تغيرات في صحة الدم وتتجفاف؛ إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بليغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

ن پلوس

حاول أن تتناول لوتوان بلوس بكل يوم كما وُصف لك. لكن، إذا نسيت تناول مقداراً دوائياً، لا تتناول مقداراً إضافياً. بل عد الجدول أو قات التناول الإعتادى. يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

لطاں پلوس لوتاں

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تنتن
فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي .

سادسة

يجرب التوقف عن إستعمال الدواء؛ والتوجه حالاً إلى الطبيب أو أقربه إذا ظهرت الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعانى أياً منها، كما بكل دواء، إن إستعمال لوتان بولوس قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهبش من قات

جذور و مکانات

وهو مرض يصيب الأمعاء والجهاز التنفساني، مما يتسبب في مشكلات في التنفس أو في التنفس. هذا العرض الجانبي خطير لكنه نادر، الذي يظهر بشيوع قدره 10-15% من الحالات. من الممكن أن تحتاج لعلاج طبي طارئ أو المبيت في المستشفى.

www.ijerpi.org