

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמיז – 1986
התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

פרבליפ 10;20;40 טבליות

הרכב:

כל טבלייה של **פרבליפ 10** מכילה:

פראבסטאטין סודיום 10 מ"ג

Pravastatin Sodium 10 mg

כל טבלייה של **פרבליפ 20** מכילה:

פראבסטאטין סודיום 20 מ"ג

Pravastatin Sodium 20 mg

כל טבלייה של **פרבליפ 40** מכילה:

פראבסטאטין סודיום 40 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים וארגוניים ראה עיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו **השתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה היא עזרה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים, תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להיקל להם אפילו אם גראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילידים ולמטבגרים מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

- הפחתת רמות הכולסטרול והטריגליצרידים בדם.
- הפחתת הסיכון לגאוסם שריר הלב והארכת תוחלת החיים בחולים עם רמת כולסטרול גבוהה וללא עדות למחלת לב כלילית.
- הפחתת הסיכון למתוה כוללת על ידי הורדת התמותה ממחלות לב, והפחתת הסיכון להתקף לב בחולים עם טרשת עורקים ורמת כולסטרול ממוצעת או גבוהה.

מידע נוסף:

פרבליפ משמש להפחתת רמות גבוהות של כולסטרול "רע" ולהעלאת רמות של כולסטרול "טוב" בדם כאשר שינויים בתזונה ובפעילות הגופנית עלו לעשות זאת כראוי. בעוד שכולסטרול הכינוי לתפקוד התקין של הגוף, הרי שאם רמתם שלדם גבוהה מדי, הוא יכול להצטבר על דפנות העורקים, בסופו של דבר כלי הדם העלולים להיחסם. מצב זה נקרא הקשתת העורקים (טרשת עורקים). מצב זה עלול להוביל לכאב חזה (תעוקת חזה), כאשר כלי דם בלב חסום חלקית, התקף לב (אוטם שריר הלב), כאשר כלי דם בלב חסום במלואו, שבץ (אירוע מוחי), כאשר כלי דם במוח חסום במלואו. רוב הכולסטרול נוצר על ידי הכבד וכמות קטנה בלבד של כולסטרול מגיעה מהתזונה. הגוף מייצר את רוב הכולסטרול בלידה.

למרות שאתה עשוי להיות בדיאטה דלת שומנים, בדיקות הדם יכולות להראות עדיין שמת השתלשלה (כולל כולסטרול) בדם גבוהה. רמה גבוהה של כולסטרול מזוהה בדרך כלל כתורמת לסיכון של מחלת לב.

גורמים נוספים כמו מחלת לב קיימת, לחץ דם גבוה, סוכרת, עדיף משקל, חוסר בפעילות גופנית ועישון יכולים גם הם להעלות משמעותית את הסיכון להתפתחות או התקדמות מחלת לב.

קבוצה תרופיטית:

סטאטינים (או מעכבי האנזים HMG-CoA דרוקטאז). קבוצה זו מפתחה את כמות הכולסטרול והטריגליצרידים (שומנים) בדם.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

- אתה גריש (אלרגי) לחומר הפעיל פראבאסטאטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 – "מידע נוסף").
- הינך סובל ממחלת כבד פעילה.
- את בהריון או קיימת אפשרות שתכנסי להריון אם או את מניקה (ראי "הריון והנקה").

- התרופה **לטיפול** בזיהומים הנגרמים על ידי חיידקים (האנטיביוטיקות אריתרומיצין, קלריתרומיצין או חומצה פוסידית). במידה ועליך להשתמש בחומצה פוסידית הניטלת דרך הפה לטיפול בזיהה חיידקי, צאטרן להפסיק זמנית את השימוש ב**פרבליפ**. הרופא יודיע לך מתי בטוח לחדש את הטיפול ב**פרבליפ**. השימוש ב**פרבליפ** יחד עם חומצה פוסידית עלול לעיתים נדירות להוביל לחולשת שרירים, רגישות או כאבי שרירים (רבדומיליזיס). ראה מידע נוסף בנוגע לרבדומיליזיס בסעיף 4 "תופעות לוואי".

- אם אתה נוטל תרופה לטיפול ומניעת היווצרות קרישי דם הנקראת "אנטגוניסט לויטמין K", ספר לרופא לפני נטילת **פרבליפ** כיוון ששימוש בז-זמני באנטגוניסט לויטמין K ו**פרבליפ** עלול להעלות את הערכים של בדיקות הדם המשמשות לניטור הטיפול עם על אנתגוניסט לויטמין K.

נטילת **פרבליפ** על כל אחת מהתרופות הבאות יכולה להגדיל את הסיכון לבעיות בשרירים:

- קולכיצין (משמשת לטיפול בגאווט [שיגדון]).
- חומצה ניקוטית (משמשת להורדת רמת כולסטרול גבוהה (בדם).
- ריפאמיציץ (משמשת לטיפול במחלת השחפת).
- לנלידומיד (משמשת לטיפול בסרטן הנקרא מיאלומה נפוצה).

שימוש בתרופה ובזמןו

ניתן ליטול **פרבליפ** עם או בלי מזון.

שימוש בתרופה ואצרכת אלכוהול

- הגבל את צריכת האלכוהול למינימום, אם ברצונך לשתות בזמן השימוש בתרופה שתה כמויות קטנות של אלכוהול בלבד, גם במידה ושתיית באופן דל פעמי משקה אלכוהולי אל תפסיק את השימוש בתרופה. במידה ואתה מודאג בנוגע לכמות האלכוהול שאתה יכול לשתות במהלך נטילת התרופה, עליך להתייעץ על כך עם הרופא.

הריון והנקה

אין להשתמש ב**פרבליפ**:

אם את בהריון, מתכננת הריון או מניקה (כיוון שהתרופה זו עוברת לחלב אם).

- אם את עשויה להיכנס להריון, אלא אם כן, את משתמשת באמצעים אמינים למניעת הריון **שאינם הורמונליים** (אמצעי מניעה הורמונליים הם למשל גלולות או תכשיר הורמונלי אחר למניעת הריון).

- אם נכנסת להריון בתקופת הטיפול ב**פרבליפ**, הפסיקי ליטול תרופה זו מייד כשנדע לך על כך.

נהיגה ושימוש במכוונת

פרבליפ עלול לגרום לסחרחורת, שטטוש ראייה או ראייה כפולה במהלך הטיפול.

אם אתה שציר לנהוג ולהפעיל מכוונת לפני שאתה ניגש לעשות זאת. שאתה חשוב לנהוג ולהפעיל מכוונת לפני שאתה ניגש לעשות זאת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
מטופלים שיש להם אי סבילות לקטטו צריכים לשים לב שטבליות **פרבליפ** מכילות כמות קטנה של לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו.

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבלייה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימיון ואופן הטיפול בתכשיר.

הרופא יסביר את חשיבותה של תזונה דלת שומנים נוסף לנטילת **פרבליפ**, ועליך להמשיך בתזונה זו לאורך כל תקופת הטיפול.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול ושומנים בדם: 40-10 מ"ג, פעם ביום, רצוי בערב.
- למניעת מחלות לב וכלי דם: 40 מ"ג, פעם ביום, רצוי בערב.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

הרופא יציין את משך הטיפול ב**פרבליפ**. יש להשתמש בתרופה זו בקביעות, ולמשך הזמן כפי שיקבע הרופא, גם אם מדובר על משך זמן ארוך. אין להפסיק את הטיפול על דעת עצמך.

צורת הנטילה

רצוי לבלוע את הטבלייה עם כוס מים.

ניתן לבלוע את מטבלייה עם או ללא אוכל.

במידת הצורך ניתן לחצות את הטבלייה לשימוש מידי. אין מידע לגבי תכישה או לעיסה של הטבלייה.

אם אתה נוטל תרופות מסוג קושרי חומצות מרה (כגון כולסטיראמין או קולסטיפול), יש ליטול **פרבליפ** לפחות שעה לפני נטילת תרופות אלו או לפחות ארבע שעות לאחר נטילת תרופות אלו, כיוון שספיגת **פרבליפ** עלולה להיות מושפעת מתרופות מסוג קושרי חומצות מרה במידה ונוטלים אותן בסמיכות אחת לשנייה.

בעיות כבד או כליה

אם סבלת בעבר מבעיות בכבד או אם אתה סובל מבעיות בכליה הרופא עשוי לרשום מינון נמוך יותר.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן המין הנכון, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לטילול תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מייד כשמזכרת, אלא אם כן הזמן בו עליך ליטול את המנה הבאה הוא קרוב. יש ליטול את המנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק טיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב התוויות אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**פרבליפ** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את נטילת התרופה ולפנות מייד לרופא אם:

- אתה סובל באופן פתאומי מתגובות אלרגיות חמורות כולל התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או קנה הנשימה שכוללת לגרום לקשי רב בנשימה. תגובה זו נדירה מאוד, וכאשר מופיעה היא יכולה להיות חמורה. ספר מייד לרופא אם זה קורה.

- אתה סובל מבעיית נשימה כולל שיעול עיקש *ו/א*ו קוצר נשימה או חום.

יש לדווח מייד לרופא אם:

- אתה מפתח כאבי שרירים, רגישות, חולשת או התכווצויות שרירים בלתי מוסברות או מתמשכות. במיוחד אם באותו זמן אתה מרגיש ללא טוב או יש לך חום גבוה.
- במקרים מאוד נדירים, בעיות בשרירים יכולות להיות חמורות (רבדומיליזיס), ועלולות להוביל למחלת כליות חמורה, מסכנת חיים.

השפעה על העור והשיער: פריחה.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000

- נדודי שינה
- סחרחורת
- עייפות

- כאב ראש או הפרעות בשינה

- שטטוש ראייה או ראייה כפולה

- קשיי עיכול

- בחילה

- הקאות

- כאב או חוסר נוחות בבטן

- תחושת כאב בחזה כתוצאה מחומציות הקיבה

- שלשול

- עצירות

- גזים בבטן

- גרד

- פצעינונים

- סרפדת

- פריחה

- בעיות בקרקפת ובשיער (כולל נשירת שיער)

- בעיות הקשורות בשלפוחית השתן (כאב או תכיפות במתן שתן, צורך במתן שתן בליחה)

- הפרעות בתפקוד המיני

- כאבים בשרירים ובמפרקים

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שמופיעות במשתמש אחד מתוך 10,000

- חולשה, בעיות בתחושת המגע הכוללות תחושת בעירה או קעקעץ או חוסר תחושה, שכיולים להעיד על פגיעה עצבית (במיוחד אם אתה משתמש ב**פרבליפ** תקופה ארוכה)
- מחלת עור חמורה (lupus erythematous-like syndrome)
- דלקת של הכבד או הלבלב, צהבת (מזוהה על ידי הצהבה של העור ולובן העיניים)

- מוות מהיר מאוד של תאי כבד (נמק כבדי סוער)

דלקת בטיסדים העלולה להסתבר ולהוביל לקרע של גידים

- עלייה בטרסאמינוזת (קבוצה של אנזימים הנמצאת באופן טבעי בדם), שיכולה להוות סימן לבעיות כבד. ייתכן והרופא יבצע בדיקות תקופתיות לניטור המצב

תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם הוקבעה)

- חולשת שרירים קבועה

- סוכרת: השכיחות תהיה תלויה בהימצאות או העדר גורמי סיכון (רמת גלוקוז בדם בצום של 5.6 מילימול/ליטר, BMI <30 ק"ג/מטר², רמות גבוהות של טריגליצרידים, היסטוריה של לחץ דם גבוה)

- דרמטומיוזיטיס (מצב המאופיין על ידי דלקת של השרירים והעור)

- כשל כבדי

תופעות הלוואי הבאות דווחו במספר סטאטינים (שכיחותן אינה ידועה)

- סיטי לילה

- אובדן זיכרון

- דיכאון

- בעיית נשימה כולל שיעול עיקש או קוצר נשימה או חום

- סוכרת: התרחשות תופעת לוואי זו סבירה יותר אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, אתה בעדיף משקל ויש לך גלחז דם גבוה. הרופא שלך ינטר אותך בזמן שתיטול תרופה זו.

אם הפועה **תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

על לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אל להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אחסנה: יש לאחסן מתחת ל- 25°C ובמקום מוגן מאור.

אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose; Lactose; Magnesium oxide; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate.

כל טבלייה של **פרבליפ 10** מכילה 29 מ"ג לקטוז.

כל טבלייה של **פרבליפ 20** מכילה 58 מ"ג לקטוז.

כל טבלייה של **פרבליפ 40** מכילה 116 מ"ג לקטוז.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

פרבליפ 10, 20:

טבלייה לבנה, עגולה, קמורה משני צידיה, בעלת קו חצייה מצידה האחד.

פרבליפ 40:

טבלייה לבנה, מוארכת, קמורה משני צידיה, בעלת קו חצייה מצידה האחד.

הטבליות ארוזות בתוך מגשיית (בליסטרים) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה של **פרבליפ יש 10, 20, 28** או **30** טבליות. ייתכן ולא כל גודלי האריות משווקים.

שם של הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429, ת"א, 612301.

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מסי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פרבליפ 10: 01 134 311 132 80

פרבליפ 20: 01 135 311 132 79

פרבליפ 40: 01 136 311 132 78

נערך בפאריל 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולקלות הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

	
<div><div></div><div><div>unipharm</div></div></div>	<div><div></div><div><div>אוניפארם</div></div></div>