

## עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תקנירים) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **סטיבקן תריס לחולל הפה**

הרכב:

המרכיבים הפעילים ורכיבם:

כל 1 מ"ל מכיל:

27 מ"ג דלתא-9- טטראהידrocannabinol 27 mg (Delta-9- tetrahydrocannabinol 27 mg)  
25 מ"ג קנאבידiol 25 mg (Cannabidiol 25 mg)

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף 6 " מידע נוספים" וסעיף 2 " מידע חשוב אודות חלק ממרכיבי התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם **תשתחמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה לרופא או לרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתו. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

להקלת תסמיינים בחולמים עם נזקשות שרירים (ספסטיות) מתונה עד חמורה בשל טרשת נפוצה (MS), שאינם מגיבים במידה מסוימת לטיפולים אחרים ומציגים שיפור קליני בשיעור של לפחות 20% בתסמינים הקשורים לספסטיות במהלך ניסיון טיפול ראשוני (הנמשך 4 שבועות).

**קבוצה רפואיית:** משכר כאבים קנאבינואידי

ספסטיות ממשמעותה היא עלייה ב"טונוס שריריים" אשר גורמת לתחשות קשיין או נזקשות שרירים מוגברת. ממשמעות הדבר היא כי הנעת שריריהם היא קשה יותר מהרגיל. נעשה שימוש בסטיבקן כאשר תרופות אחרות לא עזרו בטיפול בנזקשות שריריים ממנה אתה סובל.

#### **2. לפני שימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה סובל מרגישות יתר (אלרגי) לתוכיות קנאביס או לאחד המרכיבים הנוספים בתרופה זו (מפורטים בסעיף 6).
- אתה או בן משפחה בעל קרבת דם אליו סובל מבעיות נפשיות כגון סכיזופרניה, פסיכוז או הפרעות פסיאטריות ממשמעויות אחרות. הדבר אינו כולל דיכאון כתוצאה מטרשת נפוצה.
- את מניקה.

#### **اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

- **לפני הטיפול בסטיבקן ספר לרופא אם:**

– את בהירין או מתכנת להרות.

– אתה מתחת לגיל 18 שנים.

– אתה סובל מאפילפסיה או מהתקפים (פרקוטיסים) באופן קבוע.

– אתה סובל מבעיות לב כלויות.

– אתה סובל מבעיות כבד מתונות עד חמורות.

– אתה סובל ממחלת לב חמורה כגון: תעוקת חזה, התקף לב בעבר, לחץ דם גבוה שאינו מażן כראוי או בעיה בקצב הלב או בעיות לב.

- אתה קשיש, במילויך אם אתה מתקשה בבייעוץ פועלות יומיומיות כגון הכנת מזון ומשקאות חמימים.
- אתה בעל היסטוריה של שימוש לרעה בתרופה כלשהי או בחומר כלשהו.

על נשים וגברים להשתמש באמצעי מניעה אמין במהלך השימוש בתרופה זו (ראה גם "היריון, הנקה ואמצעי מנעה (נשים וגברים)".)

**ילדים ומתבגרים**  
סטייבקס אינו מומלץ לשימוש ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים בשל העדר מידע לגבי בטיחותו ויעילותו בגילים אלה.

- תרופות אחרות וسطיבקס**  
אם אתה נוטל או אם נטלת לאחרונה **תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כר לרופא או לרוקח.** במילויך אם אתה נוטל:
- **תרופות לטיפול בחרדה או בעיות שינה** (תרופות הרגעה/תרופות היפנוטיות כגון בנזודיאזפין, לדוגמה דיאזפאם או טרייזולאם; תרופות הרגעה אחרות, לדוגמה זופיקלאן, זולפידם, בוספiron, St John's Wort (טכשיר צמחי)).
  - **תרופות לטיפול בעוויות שרירים** (כגון באקלופן), בזיהומיים חידיים (תרופות אנטי-ביזוטיות כגון ריפאמיצין, קלרטיתרומיצין).
  - **תרופות לטיפול באפלפסיה אוocab עצבית** (כגון פניטואין, פנובארביטאל, קראבראמאזפין).
  - **תרופות לטיפול ברמת-Colسترול גבוהה** (הידਊות סטטינים; לדוגמה אטורהסטטין או סימבסטטין)
  - **תרופות לטיפול בziehom ב- HIV (לדוגמת ריטונבירה)**
  - **תרופות לדילול דם** (הידਊות קומරינים; לדוגמה ארפין)
  - **תרופות לטיפול בעוית לב** (הידਊות כחוסמי בטא, לדוגמה ביוספרולול, פרדנייזולן)
  - **קורטיקוסטרואידים המשמשים לטיפול בדלקת** (כגון הידרוקורטיזון, בקלומתאוזון, פרדנייזולן)
  - **תרופות הורמוניות מסויימות המשמשות למניעת היריון או לטיפול בסוגי סרטן מסויימים** (כגון אטינילאסטרידיל, לבונרגסטריל או דידרגוסטרון)
  - **תרופות הרדמה הנינטנות לפני ניתוח, תרופות להרפיית שרירים לפני ניתוח** (כגון פרופופול)

אם אתה מבקר אצל רופא אחר או בבית חולים, יידע אותם לגבי כל התרופות אותן אתה נוטל.

**שימוש בתרופה ומזון**  
ניתן להשתמש בסטייבקס עם או ללא מזון (אך ראה סעיף 3 להלן " כיצד תשתמש בסטייבקס").

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**  
באופן כללי, יש להימנע ממשקאות אלכוהוליים במהלך השימוש בסטייבקס, במילויך בתחילת הטיפול או בעת שינוי המינון. אם אתה שותה אלכוהול במהלך השימוש בסטייבקס, עליך להיות מודע לכך ששימוש בסטייבקס בשילוב עם צריכת אלכוהול עלול להגבר את ההשפעות של סטייבקס ואלכוהול (כגון איבוד שיווי המשקל או איבוד יכולת להגיב בנסיבות), דבר העלול להגבר את הסיכון לנפיפות ולתאונות אחרות.

- היריון, הנקה ואמצעי מנעה (נשים וגברים)**
- אם את בהיריון או מניקה, חשוב שתאת עשויה להיות בהיריון או מתכונת להרחות, היועצ'י ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.
  - אין להשתמש בסטייבקס במהלך היריון, אלא אם הרופא המליץ לך על כך. סטייבקס עשוי להשפיע על אופן הפעולה של אמצעי מנעה הורמוניים, כגון "גלאולות" או שתלים למניעת היריון. משמעות הדבר היא שעלייך להשתמש באמצעי מנעה נוספת.
  - על נשים וגברים להשתמש באמצעי מנעה אמין כגון קונדומים, דיaphragma או כובען במהלך השימוש בתרופה זו. עליכם להמשיך להשתמש באמצעי מנעה במשך לפחות 3 חודשים לאחר הפסקת הטיפול.
  - אין להשתמש בסטייבקס במהלך הנקה.

## **נהיגה ושימוש במכונות**

- אין לנוהג או להשתמש במכונות כאשר אתה מתחיל ליטול סטיבקס לראשונה ועד אשר תגיע למינון יומי יציב.
- סטיבקס עלול לגרום לשינויות או לSchedulerת, דבר אשר עלול לפגום בקשר השיפוט וביצוע מטלות הדורשות מיומנות. כמו כן, לעיתים נדירות דוחה שהתרופה גורמת לאיבוד הכרה רגעי.
- לאחר שתתרגל לנטיית סטיבקס והמיןון שלך יתיצב, עדין אין לנוהג או להשתמש במכונות אם סטיבקס גורם לתופעות כגון ישינויות או Schedulerת, אשר עלולות לפגום ביכולת לבצע פעולות אלו. אם איןך בטוח, אין לנוהג או להפעיל מכונות.

התרופה יכולה להשפיע על היכולת לנוהג מאחר שהיא עלולה לגרום לשינויות או לSchedulerת. **על פי תקנות התעבורה הישראלית ופקודת הסמים המסוכנים, נהיגה אסורה במהלך שימוש בסטיבקס.**

## **ניסייה לחו"ל עם סטיבקס**

- טרם נסייה לחו"ל, בדוק האם נשיאת תרופה זו היא חוקית. הדבר כולל כל מדינה דרכה אתה עובר.
- סטיבקס הוא שם מסוכן והסתטוס החוקי שלו ישתנה בין מדינות שונות.
  - נהיגה במהלך נטיית סטיבקס עשויה להיות בלתי חוקית במדינות מסוימות.

## **מיעד חשוב אודות חלק ממרכיבי התרופה**

- סטיבקס מכיל עד 40 מ"ג אתנול (אלכוהול) למנה. כמות האלכוהול במנה היומית המקסימלית עבור רוב האנשים (12 התזות) היא שותת ערך לכמות אלכוהול הנמצאת בשתי כיפות (10 מ"ל) של בירה או בכפית אחת (5 מ"ל) של יין בקירוב. הכמות הקטנה של אלכוהול בתרופה זו אינה בעלת השפעות ניכרות כלשהן.
- סטיבקס מכיל פרופילן גליקול אשר עלול לגרום לגירוי. כל התזה של 100 מיקרוליטר מכילה 52 מ"ג פרופילן גליקול.

## **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע למיןון ואופן הטיפול בתרופה. סטיבקס מיועד לשימוש בלבד - באזורי הפנימי של הגוף. עליך להשתדל, במידת האפשר, ליטול סטיבקס עם מזון יכול להשפיע על הכמות הננספה בגוף. עליך להשתדל, במידת האפשר, ליטול סטיבקס באותו האופן בהקשר לצריכת מזון בכל פעם, כך שתתתקבל השפעה זהה בכל פעם.

**המיןון ואופן המתן יקבעו על ידי הרופא בלבד. המיןון המומלץ הוא בדרך כלל:**  
התאמת הכמות לשימוש:

מספר התזות הדרשות בכל יום תלוי במטופל האינדייבידואלי. כל אדם זקוק למספר שונה של התזות על מנת לספק את ההקללה הטובה ביותר של נזקשות שרירים, עם מספר ההשפעות הבלתי רצויות הנמוך ביותר.

- כאשר אתה מתחיל להשתמש בסטיבקס לראשונה, עליך לפעול על פי הימים והשעות המצוינים בטבלה שלහן עד אשר תמצא את מספר התתזות המתאים ביותר.
- **עליך לחදול מהעלאת מספר התתזות כאשר תמצא את מספר התתזות המתאים ביותר עבורה.** יתכן שתתהליך זה יימשך מספר ימים בלבד או שהוא עשוי להימשך עד שבועיים. השתדל להשתמש במספר התזה זה כל יום. לאחר מכן תוכל לפחות את התזה באופן אחד למשך היום כולו.
- אין להשתמש ביותר מהתזה אחת בכל פעם. יש תמיד להמתין לפחות 15 דקות בין התתזות.
- הימנע ממאיץ יתר במהלך מספר הימים הראשונים של שימוש בסטיבקס עד אשר תדע כיצד הוא משפיע עליו.
- אם תתחל לחשש בתופעות בלתי רצויות (בדרכ כל Schedulerת), הפחית התזה אחת כל יום עד אשר תמצא את הקלה התס敏ים הטובה ביותר עם מספר ההשפעות הבלתי רצויות הנמוך ביותר.

- כארר תמצא את מספר התוצאות המתאים ביותר עבורך, השתדל להשתמש במספר זה כל יום. לאחר מכן תוכל לפזר את התוצאות באופן אחד לאורק היום כולל באופן המתאים לך. עלייך עדין להמתין לפחות 15 דקות בין התוצאות.

מספר התוצאות				
סה"כ התוצאות כל יום	ערב (בין השעה 4 בצהרים לשעת השינה)	בוקר (בין שעת ההתעוררות לבין השעה 12 בצהרים)	יום	
1	1	0	יום 1	
1	1	0	יום 2	
2	2	0	יום 3	
2	2	0	יום 4	
3	2	1	יום 5	
4	3	1	יום 6	
5	4	1	יום 7	
6	4	2	יום 8	
7	5	2	יום 9	
8	5	3	יום 10	
9	6	3	יום 11	
10	6	4	יום 12	
11	7	4	יום 13	
12	7	5	יום 14	

אין להשתמש ביום מ- 12 התוצאות ביום אחד, אלא אם הרופא מורה לך לנוהג כך.

#### ניסיון הטיפול בסטיבקס במשך 4 שבועות:


רק רופא מומחה יכול להתחיל לטפל לך בסטיבקס.

- בטרם תחיל להשתמש בסטיבקס, הרופא המומחה יבצע הערכה. מטרת הערכה היא לבחון את חומרת נזקשות השירותים ממנה אתה סובל. הוא יבחן את יעילות הטיפולים האחרים שניתנו בעבר.
- לאחר מכן תקבל סטיבקס במשך תקופה ניסיון של 4 שבועות. לאחר מכן, הרופא המומחה יבצע הערכה נוספת על מנת לבחון האם סטיבקס עוזר לך.
- רק אם הצגת שיפור משמעותית בתסמינים הקשורים לסתופתיות לאחר 4 שבועות אלה, אתה אמור להמשיך לקבל טיפול בסטיבקס.

#### אוף השימוש:

פתיחה התרסיס והכנתו לשימוש:


1. הוציא את התרסיס מהמקרר (ראה סעיף 5 למידע חשוב על אחסון סטיבקס).
2. רשום את תאריך פתיחת התרסיס על המדבקה המצורפת לתרסיס. הדבק את המדבקה על התרסיס, כך שתוכל לבדוק את התאריך. אין להשתמש בתרסיס אם עברו יותר מ- 6 שבועות (42 ימים) ממועד פתיחתו.
3. נער את מכל התרסיס בעדינות טרם השימוש.
4. הסר את מכסה המגן.
5. אחוז בתרסיס בין האגודל לבין האמה. הנח את האצבע המורה על הלחץ.
6. כאשר התרסיס נמצא במצב מאונך, התאמן בהתחזה לתוך מחחתת ניר 2 או 3 פעמים עד אשר תתקבל התזה משבייעת רצון (ראה איור 1). התזה אלו "מפעילות" את המשאבה וועזרות לוודא שהיא פועלת כראוי.
7. כעת התרסיס מוכן לשימוש. לא תצטרכ לבצע התזה מפעילות נוספות עד פתיחת מכל תרסיס חדש.



איור 1

שימוש בתרסיס:

1. אחוז בתרסיס בין האగודל לבין האמה. הנח את האצבע המורה על הלחץ.
2. אחוז בתרסיס במצב מאונך וכoon אותו לתוך הפה. כוון את הלחץ אל מתחת לשון או לאחור הפנימי של הלחץ. שנה את אזור ההתקזה בפה כל פעם. הדבר מסייע במניעת אי נוחות במקום אחד (ראה איור 2).
3. לחץ על הלחץ כלפי מטה בחזקה. אין לבצע יותר מהתקזה אחת בכל פעם, גם אם אתה מרגיש شكיבת כמות תרסיס קטנה בלבד.
4. החזר את מכסה המגן למכל.



איור 2

**אין לעبور על המנה המומלצת.**

אם בטיעות התקצת לעוניים, שטוף אותן במים בהקדם האפשרי.

- אין לשאוף את התרסיס.
- אין להתייז ליד ילדים או חיות מחמד.
- אין להשתמש בתרסיס ליד להבות גליות או מקור חום.

**אם השתמשה בכמות גבוהה מדי של סטיבקס**

אם בטיעות השתמשה בכמות גבוהה יותר של תרופה זו ייחסית לכמות הרגילה, אתה עלול:

- לראות או לשמוע דברים שאין קיימים (הזיות).
- להרגיש מסוחרר, ישוני או מבולבל.

- להרגיש שינוי בקצב הלב.

- אני דוח לרופא או לרוקח אם השתמשה בכמות גבוהה מדי של סטיבקס.

אם נטלה מינון יתר או אם בטיעות יلد בעל מהתרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא עmr את אריזת התרופה.

#### **אם שכחת להשתמש בסטייבקן**

- אם שכחת ליטולמנה, השתמש בהتزאה מייד כשתuczר או כשתרגיש שאתה זוקן להتزאה.
- אין להשתמש ב- 2 התזאות בו זמן על מנת לפצות עלמנה שהוחמצה.

#### **כיצד תדע האם מכל התרסיסים כמעט ריק**

לאחר 3 התזאות הפעלה, מכל התרסיסים מכיל עד 90 התזאות מדודות. כאשר מכל התרסיסים מתרוקן, הקול של פעולת התרסיס משתנה. כמו כן, יתכן כי תגליה שתוחשות התרסיס בפה השטנתה. הסיבה לכך היא שמלל התרסיס כמעט ריק. במצב זה, עליך לפתחו מכל תרסיס חדש.

#### **אם אתה מפסיק להשתמש בסטייבקן**

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אמך חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את נטילת התרופה ללא התייעצות עם רופא. אם תפסיק את השימוש בתרופה באופן פתאומי, יתכן כי השינה, התיאבון או הרגשות שלך יושפעו למשך פרק זמן קצר. נזקנות שריריים בדרך כלל חוזרת בהדרגה אם אתה מפסיק להשתמש בסטייבקן.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זוקן להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

בדומה לכל התרופות, תרופה זו יכולה לגרום לתופעות לוואי, אם כי לא כל אחד מפתח אותן. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואין. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן.

הפסק את השימוש בתרופה זו ופנה מיד לרופא או לבית חולים אם מופיעות אחת מתופעות **הלואין החמורות שלhallan**, לאחר שתctrך להיות בבית חולים אם מופיעות אחת מתופעות:

- ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- אמונה ברעיונות שאינם נכוןים נכונים
- תחששה שאנשים אחרים הם נגדך
- מחשבות אובדןיות
- תחששות דיכאון או בלבול
- תחששות התרגשות יתר או אובדן קשר עם המציאות

תופעות הלואין הבאות צפויות להופיע בסביבות גבואה יותר בתחילת הטיפול. במרבית המקרים, תופעות הלואין הן קלות למדוי ובדרכן כלל חולפות תוך מספר ימים.

- אם מפתח אחת מתופעות הלואין הבאות, הפחת את מספר התזאות או הפסק את השימוש בסטייבקן עד אשר תרגיש שחזרת למצב הרגיל.
- כאשר תתחיל להשתמש בתרופה שוב, חזור למספר התזאות שבו לא הרגשת תופעות לוואי בלבתי רצויות אלו.

**תופעות לוואי שכיחות מאוד:** (מופיעות ביותר מ- 1 מתוך 10 מטופלים)

- תחששות סחרחות או עייפות

**תופעות לוואי שכיחות:** (מופיעות לפחות מ- 1 מתוך 10 מטופלים)

- בעיות זיכרון או קשיי ריכוז.
- תחששות ישנוויות או סחרחות.
- טשטוש ראייה.
- קשיי בדיבור.

- אכילת כמות מזון גדולה יותר או קטנה יותר מהרגיל.
- שניי בחוש הטעם או יובש בפה.
- עצירות או שלשול.
- בחילות או הקאות.
- בעיות בפה, לרבות צריבה, כאב או כאבים בפה.
- חוסר אנרגיה או תחושת חולשה, או תחושת חולץ כללית.
- תחושה חריגת או תחושת שכנות.
- איבוד שיווי משקל או נפילה.

#### **תופעות לוואי שאין שכיחות:** (מופייעות בפחות מ- 1 מתוך 100 מטופלים)

- עילפון.
- שינויים בדופק, בקצב הלב או בלחץ דם.
- כאב גרון או גירוי בגרון.
- כאב בטן.
- שינוי בצבע הפה או השיניים.
- גירוי במקום הת蛰ת סטיבקס.
- אודם ונפיחות בפה או קילוף בתוך הפה. אין להמשיך להתיז על אзорים אלה.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או אם אתה סובל מתופעות לוואי שלא צינו בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>. בנוסף, ניתן לדוח באמצעות שליחת דוא"ל ליחידת בטיחות מטופלים של בעל הרישום ב: [drugsafety@neopharmgroup.com](mailto:drugsafety@neopharmgroup.com)

#### **5. כיצד לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום בטוח מחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אין לגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

#### תנאי אחסון:

- יש לאחסן את המכלים במצב מאונר.
  - טרם הפתיחה, יש לאחסן במקרר בטמפרטורה של 2-8°C.
  - לאחר הפתיחה (התזה ראשונה), יש להשתמש מכל בטוחות של 42 ימים.
- לאחר הפתיחה, אין צורך בקיורו, אך יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה מתחת ל- 25°C.

התכשיר דליק. יש להחזיר את המכסה למכל לאחר השימוש. אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד ליבוש מוחלט של התכשיר. יש להגן מפני אור ולהרחיק את התרופה ממוקחות חום ואש. יש לאחסן במקום בטוח. אין למתת את התרופה לאדם אחר.

אין להשליך תרופות למי ביוב או לאשפה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יעזרו בהגנה על הסביבה.

**6. מידע נוסף**

**נוסך על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:**

Ethanol anhydrous, propylene glycol, peppermint oil (flavour)

**כיצד נראה תרופה ומה תוכן האrizה:**

נוזל בצבע צהוב-חום מכל התזה מצוקית עם משאבה בנפח 10 מ"ל. המשאבה מוגנת באמצעות מסכה פלסטיק.

כל אריזת סטיבקס מכילה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 או 12 מכל' תרסיס.  
יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

**בעל הרישום וכתובתו:** ניאופרム סינטיפיק בע"מ, השילוח 6, ת.ד. 7063 פתח תקווה 4917001.

**היצן וכתובתו:** GW פארמה בע"מ, סובריין האוס, ויזן פארק, היסטון, קיימברידג', CB24 9BZ בריטניה.

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 147-48-33290

נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקירה עליון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.