עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קפציטבין טבע 150 מ"ג | קפציטבין טבע 500 מ"ג

טבליות מצופות | טבליות מצופות

הרכב:
כל טבליה מכילה:
Capecitabine 150 mg
קפציטבין 150 מ"ג

הרכב:
כל טבליה מכילה:
Capecitabine 500 mg
קפציטבין 500 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

- שמור את העלון. ייתכן שתצטרך לקרוא אותו שוב.
- תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
- אם יש לך תופעות לוואי כלשהן, פנה לרופא שלך או לרוקח. זה כולל תופעות לוואי אפשריות אשר אינן מופיעות בעלון זה (ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי").

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה קפציטבין טבע שייכת לקבוצת תרופות הנקראות "תרופות ציטוסטטיות", אשר עוצרות את התפתחות התאים הסרטניים. קפציטבין טבע כשלעצמה אינה תרופה ציטוסטטית, אלא רק לאחר שהיא נספגת בגוף היא משתנה לתרופה אנטי סרטנית פעילה (יותר ברקמת הגידול מאשר ברקמה נורמלית).
השימוש בתרופה קפציטבין טבע הוא לטיפול בסרטן השד לאחר טיפולים קודמים, סרטן הקיבה וסרטן המעי הגס והחלחולת. יתרה מזאת, קפציטבין טבע משמשת למניעת הישנות של סרטן המעי הגס, לאחר הסרה מלאה של הגידול על-ידי ניתוח.
ניתן ליטול את התרופה קפציטבין טבע לבד או בשילוב עם תרופות נוספות.

קבוצה תרפויטית
אנלוגים של פרימידינים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (Capecitabine) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף"). עליך ליידע את הרופא שלך אם ידוע לך שיש לך אלרגיה או רגישות לתרופה זו.
- היו לך בעבר תגובות חמורות לטיפול בפלואורופירימידינים (קבוצה של תרופות אנטי סרטניות כמו פלואורואציל).
- את בהיריון או את מניקה.
- יש לך רמות נמוכות מאוד בדם של תאי דם לבנים או טסיות (לויקופניה, נויטרופניה או תרומבוציטופניה).
- יש לך בעיות חמורות בכבד או בכליות.
- ידוע לך שאין לך שום פעילות של אנזים הקרוי Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) (complete DPD deficiency).
- אתה מטופל כעת או שטופלת במהלך ארבעת השבועות האחרונים בבריווידין (brivudine) כחלק מטיפול בהרפס זוסטר (אבעבועות רוח או שלבקת חוגרת).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בקפציטבין טבע, ספר לרופא אם:
- ידוע לך שיש לך חסר חלקי בפעילות האנזים Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).
- יש לך בן משפחה שיש לו חסר חלקי או מלא באנזים Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).
- הינך סובל ממחלות כבד או כליות.
- הינך סובל או סבלת בעבר מבעיות לבביות (לדוגמא, קצב לב לא סדיר או כאבים בחזה, בלסת ובגב הנגרמים ממאמץ פיזי וכתוצאה מבעיות בזרימת הדם אל הלב).
- הינך סובל ממחלות הקשורות למוח (לדוגמא, סרטן אשר התפשט למוח או מחלת עצבים היקפיים – נוירופתיה).
- הינך סובל מחוסר איזון ברמות הסידן (אשר נראה בבדיקות דם).
- הינך סובל מסוכרת.
- אינך מסוגל להחזיק אוכל או שתיה בגופך בגלל בחילות והקאות חמורות.
- הינך סובל משלשולים.
- הינך סובל מאיבוד נוזלים (התייבשות).
- הינך סובל מחוסר איזון של יונים בדמך (חוסר איזון אלקטרוליטי, הנראה בבדיקות דם).
- סבלת בעבר מבעיות בעיניים, ייתכן שתזדקק למעקב נוסף על מצב עיניך.
- יש לך תגובה עורית חמורה.

חסר ב-DPD:
חסר ב-DPD הוא מצב גנטי אשר בדרך-כלל אינו קשור לבעיות בריאותיות, אלא אם אתה נוטל תרופות מסוימות. אם יש לך חסר ב-DPD ואתה נוטל קפציטבין טבע, אתה נמצא בסיכון מוגבר לפתח תופעות לוואי חמורות (כמפורט בסעיף 4 – "תופעות לוואי"). מומלץ לבצע בדיקה לחסר ב-DPD לפני תחילת הטיפול. אם אין לך פעילות של האנזים אסור לך לקחת קפציטבין טבע. אם יש לך פעילות מופחתת של האנזים (חסר חלקי), ייתכן שהרופא שלך ירשום לך מינון נמוך יותר. אם תוצאות הבדיקה לחסר ב-DPD הן שליליות, עדיין עלולות להופיע תופעות לוואי חמורות ומסכנות חיים.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים. אין לתת את התרופה קפציטבין טבע לילדים ומתבגרים.

תגובות בין-תרופתיות
אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או אתה עשוי לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. חשוב מאוד לעשות זאת, מכיוון שנטילת מספר תרופות בו זמנית יכולה להגביר או להחליש את ההשפעה של התרופות.

אל תיקח בריווידין (תרופה אנטי-ויראלית לטיפול בשלבקת חוגרת או באבעבועות רוח) במקביל לטיפול בקפציטבין (כולל במהלך כל פרקי זמן של הפסקה בין הטיפולים (תקופות מנוחה) כאשר אינך לוקח טבליות קפציטבין כלשהן).
במידה ונטלת בריווידין עליך להמתין לפחות 4 שבועות לאחר הפסקת הטיפול בבריווידין לפני התחלת נטילת קפציטבין. ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם".

בנוסף, יש להיזהר במיוחד אם אתה לוקח:
- תרופות לטיפול בשיגדון (gout) (אלופורינול).
- תרופות לדילול הדם (קומרין, וורפרין).
- תרופות עבור פרכוסים או רעידות (פניטואין).
- אינטרפרון אלפא.
- רדיותרפיה ותרופות מסוימות לטיפול בסרטן [חומצה פולינית (folinic acid), אוקסליפלטין (oxaliplatin), בוואציזומאב (bevacizumab), ציספלטין (cisplatin), אירינוטקאן (irinotecan)].
- תרופות לטיפול בחסר בחומצה פולית.

שימוש בתרופה עם מזון ושתיה
עליך ליטול את התרופה לא יאוחר מ-30 דקות לאחר הארוחה.

היריון והנקה
אם הינך בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, היוועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.
אסור לך לקחת קפציטבין טבע אם את בהיריון או אם את חושבת שאת בהיריון.
אסור לך להניק בזמן הטיפול בקפציטבין טבע ושבועיים לאחר לקיחת המנה האחרונה.
אם את אישה היכולה להרות עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול עם קפציטבין טבע ובמשך 6 חודשים לאחר לקיחת המנה האחרונה.
אם אתה מטופל זכר ובת הזוג שלך יכולה להרות, עליכם להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול עם קפציטבין טבע ובמשך 3 חודשים לאחר לקיחת המנה האחרונה.

נהיגה ושימוש במכונות
השימוש בתרופה זו עלול לגרום לסחרחורות, בחילות או עייפות ועל כן ייתכן שקפציטבין טבע תפגע ביכולתך לנהוג ברכב או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התרופה קפציטבין טבע מכילה לקטוז (anhydrous lactose). אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא המטפל לפני נטילת התרופה. תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
רק רופא מומחה בטיפול בתרופות אנטי סרטניות (אונקולוג) יכול לרשום את התרופה קפציטבין טבע.

מינון מקובל
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
הרופא שלך ירשום לך מנה ומשטר טיפול המתאים **לך**. קביעת המינון של קפציטבין טבע מבוססת על מדד שנקרא שטח פני הגוף. שטח פני גופך מחושב על סמך משקלך וגובהך. המינון המקובל למבוגרים הוא, בדרך-כלל, 1,250 מ"ג למטר מרובע של שטח פני הגוף, פעמיים ביום (בוקר וערב).
להלן שתי דוגמאות לשם ההבהרה: אדם שמשקלו 64 ק"ג וגובהו 1.64 מטר, הוא בעל שטח פני גוף של 1.7 מטר מרובע וצריך לקחת 4 טבליות של 500 מ"ג וטבליה אחת של 150 מ"ג פעמיים ביום.
אדם שמשקלו 80 ק"ג וגובהו 1.80 מטר, הוא בעל שטח פני גוף של 2.0 מטר מרובע וצריך לקחת 5 טבליות של 500 מ"ג פעמיים ביום.

הרופא שלך יאמר לך איזה מינון עליך לקחת, מתי עליך לקחת את הטבליות ולאיזה פרק זמן.

אין לעבור על המנה המומלצת.

הרופא שלך יכול להמליץ על שילוב של טבליות של קפציטבין טבע 150 מ"ג ו-500 מ"ג בכל מנה.

אופן השימוש
- עליך לקחת את הטבליות **בבוקר ובערב**, כפי שנרשם לך על-ידי הרופא.
- עליך לקחת את הטבליות **תוך 30 דקות לאחר סיום הארוחה** (ארוחת בוקר וארוחת ערב) **ולבלוע אותן בשלמותן עם מים.**
- אין לכתוש, לחצות או ללעוס את הטבליות. חשיפה של המטפל או המטופל לטבליית קפציטבין טבע כתושה או חצויה עלולה לגרום לתופעות לוואי. אם אינך יכול לבלוע טבליות קפציטבין טבע שלמות, ספר לרופא המטפל.
- חשוב מאוד שתיטול את כל התרופות שלך כפי שהומלץ לך על-ידי הרופא המטפל.

משך הטיפול
- בדרך-כלל נוטלים טבליות קפציטבין טבע במשך 14 ימים ולאחר מכן ישנם 7 ימי הפסקה (ללא נטילת טבליות קפציטבין טבע). תקופה זו של 21 ימים מוגדרת כמחזור טיפולי אחד.
- בשילוב של קפציטבין טבע עם תרופות אחרות, המינון המקובל למבוגרים יכול להיות נמוך מ-1,250 מ"ג למטר מרובע של שטח פני הגוף, וייתכן שתצטרך לקחת את הטבליות לאורך פרקי זמן שונים (למשל, כל יום, ללא תקופת הפסקה).

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, עליך ליצור קשר עם הרופא שלך בהקדם האפשרי לפני נטילת המנה הבאה.
אם נטלת קפציטבין במינון הגבוה בהרבה ממה שהיית צריך, ייתכן שיהיו לך תופעות הלוואי הבאות: בחילה או הקאה, שלשולים, דלקת או כיבים במערכת העיכול או בפה, כאב או דימום מהמעי או מהקיבה או דיכוי של מח העצם (הפחתה בסוגי תאי דם שונים). פנה לרופא שלך באופן מיידי אם אתה חווה אחד או יותר מסימפטומים אלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אל תיקח את המנה שנשכחה בכלל. אל תיטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. במקום זאת, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא שלך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
אין תופעות לוואי הנגרמות כתוצאה מהפסקת הטיפול בקפציטבין. אם אתה נוטל תרופה נוגדת קרישה מקבוצת הקומרינים [המכילה, למשל, פנפרוקומון (phenprocoumon)], ייתכן שתידרש התאמת מינון התרופה נוגדת הקרישה, על-ידי הרופא, עם הפסקת הטיפול בקפציטבין טבע.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקפציטבין טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
הפסק ליטול קפציטבין טבע באופן מיידי ופנה לרופא אם מופיע אחד מהתסמינים הבאים:
- **שלשולים:** אם מספר היציאות שלך ביום גדול ב-4 או יותר לעומת המצב הרגיל או אם יש לך שלשול במהלך הלילה.
- **הקאות:** אם אתה מקיא יותר מפעם אחת במשך 24 שעות.
- **בחילה:** אם יש לך אובדן תיאבון והפחתה ניכרת בכמות המזון שאתה צורך ביום.
- **דלקת ריריות הפה (סטומטיטיס):** אם יש לך כאב, אדמומיות, נפיחות או רגישות בפה ו/או בגרון.
- **תגובה עורית בכפות הידיים והרגליים:** אם יש לך כאב, נפיחות, אדמומיות או עקצוץ בידיים ו/או בכפות הרגליים.
- **חום:** אם יש לך חום של 38°C ומעלה.
- **זיהום:** אם יש לך סימנים של זיהום אשר נגרם על-ידי חיידק או וירוס, או אורגניזמים אחרים.
- **כאב בחזה:** אם יש לך כאבים באזור מרכז החזה, במיוחד אם הם מתרחשים בזמן פעילות.
- **תסמונת סטיבנס-ג'ונסון:** אם יש לך פריחה אדומה או סגלגלה, מכאיבה, שמתפשטת, ושלפוחיות ו/או נגעים אחרים שמתחילים להופיע ברקמות הריריות (למשל, פה ושפתיים), במיוחד אם לפני כן היו לך רגישות לאור, זיהומים במערכת הנשימה (למשל, ברונכיטיס) ו/או חום.
- **אנגיואדמה:** פנה מייד לטיפול רפואי אם אתה מבחין באחד מהתסמינים הבאים – ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף: התנפחות בעיקר של הפנים, השפתיים, הלשון או של הגרון המקשה על הבליעה או הנשימה, גירוד ופריחה.
אלו עלולים להיות סימנים של אנגיואדמה.

אם תופעות הלוואי הללו מזוהות בשלב מוקדם, יהיה בדרך-כלל שיפור בתסמינים בתוך יומיים-שלושה מהפסקת הטיפול. אם, בכל זאת, תופעות הלוואי עדיין נמשכות, פנה לרופא המטפל מייד.
ייתכן שהרופא ינחה אותך להתחיל מחדש את הטיפול במינון נמוך יותר.

אם מופיעים, במהלך המחזור הראשון של הטיפול, דלקת חמורה של ריריות הפה (סטומטיטיס – פצעים בפה ו/או בגרון), דלקת ברקמות ריריות, שלשול, ירידה במספר הנויטרופילים בדם (נויטרופניה – סיכון מוגבר לזיהומים) או רעילות הקשורה למערכת העצבים, ייתכן שיש קשר לחסר ב-DPD (ראה סעיף 2 – "לפני השימוש בתרופה").

תגובה עורית בכפות הידיים והרגליים עלולה לגרום לאיבוד טביעות האצבעות, דבר העלול להשפיע על הזיהוי שלך באמצעות קורא טביעות אצבע.

בנוסף, כאשר קפציטבין טבע היא טיפול יחיד, תופעות לוואי שכיחות מאוד – (very common), שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך עשרה הן:
- כאב בטן
- פריחה, יובש או גרד בעור
- עייפות
- אובדן תיאבון (אנורקסיה)

תופעות לוואי אלו עלולות להחמיר, ולכן חשוב **תמיד לפנות לרופא המטפל מייד** עם הופעת תופעת לוואי. ייתכן שהרופא המטפל ינחה אותך להפסיק את המינון ו/או להפסיק באופן זמני את הטיפול בקפציטבין טבע, כדי להורידך את הסיכוי שתופעת הלוואי תימשך או תחמיר.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10:
- ירידה במספר תאי הדם הלבנים או האדומים (הנראית בבדיקות דם)
- התייבשות, ירידה במשקל
- נדודי שינה (אינסומניה), דיכאון
- כאב ראש, ישנוניות, סחרחורת, תחושה חריגה בעור (חוסר תחושה או תחושת עקצוץ), שינויים בטעם
- גירוי בעין, הפרשה מוגברת של דמעות, אדמומיות בעין (דלקת בלחמית העין)
- דלקת בוורידים (דלקת וריד פקקתית – תרומבופלביטיס)
- קוצר נשימה, דימומים מהאף, שיעול, נזלת
- פצעי קור או זיהומי הרפס אחרים
- זיהומים בריאות או במערכת הנשימה (למשל, דלקת ריאות או דלקת סימפונות – ברונכיטיס)
- דימום ממערכת העיכול, עצירות, כאבים בבטן העליונה, קשיי עיכול, עודף גזים, יובש בפה
- פריחה בעור, נשירת שיער (אלופסיה), אדמומיות בעור, יובש בעור, גרד בעור, שינויים בצבע העור, אובדן עור, דלקת בעור, בעיות בציפורניים
- כאבים במפרקים או בגפיים, כאבים בחזה, כאבי גב
- חום, נפיחות בגפיים, הרגשת חולי
- בעיות בתפקודי כבד (הנראות בבדיקות דם) ועלייה ברמת הבילירובין (המופרש על-ידי הכבד) בדם

תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon) תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 100:
- זיהום בדם, זיהום בדרכי השתן, זיהום בעור, זיהומים באף ובגרון, זיהומים פטרייתיים (כולל זיהומים בפה), שפעת, דלקת קיבה ומעי (גסטרואנטריטיס), מורסה (אבצס) בשיניים
- גושים מתחת לעור (גידולים של רקמת שומן – ליפומה)
- ירידה במספר תאי הדם כולל טסיות, דילול הדם (נראה בבדיקות דם)
- אלרגיה
- סוכרת, ירידה ברמות האשלגן בדם, תת תזונה, עלייה ברמות הטריגליצרידים בדם
- תחושת בלבול, התקפי חרדה, מצב רוח דיכאוני, ירידה בחשק המיני
- קשיים בדיבור, פגיעה בזיכרון, פגיעה בקואורדינציה ובתנועה, פגיעה בשיווי משקל, התעלפויות, פגיעה עצבית (נוירופתיה) והפרעות בתחושה
- ראייה מטושטשת או כפולה
- ורטיגו (סחרחורת), כאב באוזניים
- קצב לב לא סדיר ודפיקות לב (אריתמיה), כאבים בחזה והתקף לב
- קרישי דם בוורידים העמוקים, לחץ דם גבוה או נמוך, גלי חום, תחושת קור בגפיים, כתמים סגולים על פני העור
- קרישי דם בוורידי הריאה (תסחיף ריאתי), תמט הריאה, שיעול דמי, אסטמה, קוצר נשימה במאמץ
- חסימת מעיים, הצטברות של נוזל בחלל הבטן, דלקת במעי הדק או הגס, דלקת בקיבה, דלקת בושט, כאב בבטן התחתונה, חוסר נוחות באזור הבטן, צרבת (חזרה של מזון מהקיבה), דם בצואה
- צהבת (הצהבה של העור והעיניים)
- כיבים בעור ושלפוחיות, תגובה של העור לאור שמש, אדמומיות בכפות הידיים, התנפחות או כאב באזור הפנים
- נפיחות או נוקשות במפרקים, כאבים בעצמות, חולשה או נוקשות בשרירים
- הצטברות של נוזלים בכליות, תכיפות גדולה יותר של מתן שתן במהלך הלילה, בריחת שתן, דם בשתן, עלייה ברמת הקריאטינין בדם (סימן לבעיה בכליות)
- דימום חריג מהווגינה
- נפיחות (בצקת), צמרמורות ורעד

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 1,000:
- היצרות או חסימה של צינורות הדמעות
- אי ספיקת כבד
- דלקת אשר מובילה להפרעה בתפקוד או לחסימה בהפרשת נוזלי מרה
- שינויים מסוימים בבדיקת א.ק.ג. (הארכת מקטע QT)
- סוגים מסוימים של הפרעות בקצב הלב (כולל פרפור חדרים, הפרעה מסוג טורסד דה פואנט – torsade de pointes, קצב לב איטי)
- דלקת בעין הגורמת לכאב בעין ולבעיות אפשריות בראייה
- דלקת בעור אשר גורמת לכתמים אדומים קשקשיים/מתקלפים כתוצאה ממחלה של מערכת החיסון
- התנפחות בעיקר של הפנים, השפתיים, הלשון או של הגרון, גירוד ופריחה (אנגיואדמה)

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10,000:
- תגובה עורית חמורה, כמו פריחה בעור, כיבים ושלפוחיות אשר יכולים להופיע בפה, באף, באיברי המין, בידיים, בכפות הרגליים ובעיניים (עיניים אדומות ונפוחות)

חלק מתופעות לוואי אלו שכיחות יותר בשימוש משולב של קפציטבין טבע עם תרופות אחרות לטיפול בסרטן.

תופעות לוואי נוספות אשר נצפו בשימוש בשילוב זה הן:

תופעות לוואי שכיחות (common) תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10:
- ירידה ברמות בדם של נתרן, מגנזיום או סידן, עלייה ברמת הסוכר בדם
- כאב עצבי
- זמזומים או צלצולים באוזניים (טיניטוס), אובדן שמיעה
- דלקת בווריד
- שיהוקים, שינויים בקול
- כאב או תחושה שונה/חריגה בפה, כאב בלסת
- הזעה, הזעות לילה
- התכווצויות שרירים
- קושי במתן שתן, דם או חלבון בשתן
- סימני פציעה או תגובה במקום ההזרקה (נגרם על-ידי תרופות הניתנות בהזרקה באותו הזמן)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעת לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרוקח.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן מתחת ל-25°C.**
- יש לשמור באריזה המקורית על מנת להגן מלחות.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח האשפה. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
קפציטבין טבע 150 מ"ג:
Lactose (anhydrous), hypromellose, microcrystalline cellulose, sodium croscarmellose, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol, iron oxide yellow, iron oxide red

קפציטבין טבע 500 מ"ג:
Lactose (anhydrous), microcrystalline cellulose, hypromellose, sodium croscarmellose, magnesium stearate, titanium dioxide, macrogol, iron oxide yellow, iron oxide red

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קפציטבין טבע 150 מ"ג: טבליה מוארכת, מצופה, בצבע אפרסק עם הטבעה של "C" בצידה האחד ושל המספר "150" על צידה השני של הטבליה.
האריזה מכילה 60 טבליות.
קפציטבין טבע 500 מ"ג: טבליה מוארכת, מצופה, בצבע אפרסק עם הטבעה של "C" על צידה האחד ושל המספר "500" על צידה השני של הטבליה.
האריזה מכילה 120 טבליות.

שם בעל הרישום וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ,
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

שם היצרן וכתובתו:
פרמהכמי בי.וי., הארלם, הולנד

העלון נערך בינואר 2022, בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
קפציטבין טבע 150 מ"ג: 152.61.34182
קפציטבין טבע 500 מ"ג: 152.62.34185

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

CAPE CTAB PL SH 210322