

- הפסיק מיד ליטול אימודים והתייעץ עם הרופא
 - שלך:
 - אם הירין סובל מאידייס ומבחן בונפיות בטבען.
 - אם הירין מובהן בקשיש בעשיות צרכים (עיצירות), בבטן נפוחה ו/או בכאב.
- לאחר יוממים או אם הששלול חזר שוב ושוב.
 - ילדים בגיל 6 עד 12: השימוש באימודים תחת מרשם רופא ופיקוח רפואי.

- ילדים בגיל 6 עד 12:**
- אינטראקציות/תגובהם ביר-תרופה או מחלת גיף - HIV (ריטונאביר) (תרופה נוגדת גיף - HIV)
 - קטוטוונזול ואיטראקונזול (תרופה לטיפול בזיהומיים פטריזיטיים)
 - גמfibרול (תרופה לטיפול בתסמונת רמת שומנים בדם)
 - דםפורסן (תרופה לטיפול בהשתנה מוגברת)
 - תרופות אחרות המאייצות או מאטות את התנועת המעיים (למשל תרופות אנטיקולינרגיות)

הרין והנקה

אם הירין בהריון, חשוב שහינך בהריון או מתכוונת להריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת אימודים.

הנקה

אין ליטול תרופה זו בתקופת ההנקה. כמותות קטנות של התרופה עלולים לחדר לחלב אם. היועצי ברופא בגין לטיפול הולם עבורה.

הנגעה ושימוש במכונות

אימודים עלול לגרום לעייפות, לשינויות ולסחרורות, אתה עלול לחוש פחדות עירני, לחוש תחושות עילפון ואך להתעלף. אין לנו או להפעיל מכונות במידה ואתזהה חותפות אלו. באשר לילדים, יש להזהר מרכיבה על אופניים או ממשקים בקרבת הכביש וצדומה.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה
כל כמוסות אימודים מכילה 127 מ"ג לקטוז מונוהידרט. אם נאמר לך שיש לך סבירות לסוכרים, ידע את הרופא לפני נטילת התרופה.
התרופה מכילה פחות מ- 1 mmol (23 מ"ג) פר קפליה, כולל "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה לפי הוראות רופא או הרוקח. ערך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בזוגם למיון ואוקן לטיפול בתקציר. יש לבלוע את הכמוסה עם מעט מים. אין מידי לגבי פתיחה ווירוי תוך כמונת התרופות.

המיון הכל מוגבל בדרך כלל הוא:

ילדים מגיל 12, מתגברים ומבוגרים: התחל את הטיפול בנטילת 2 כמוסות (4 מ"ג). אם יש צורך, המשך בנטילת כמוסה אחת (2 מ"ג) לאחר כל יציאה נוחלית. המנה היומית המרבית הינה 8 כמוסות לימה (16 מ"ג).

אין ליטול מעבר למינון המומלץ.

ילדים בגילאים 6 עד 12: המינון ייקבע על ידי הרופא בלבד.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6. יש להפסיק את השימוש באימודים כאשר הצואה החוררת להיות גיגית, אם אין פעולות מעיים בשער 12 שעות או אם יש לך עיצירות. בכל אופן, אין ליטול אימודים מעל ל- 48 שעות. אם אין השפעה לאחר תקופה זו, הפסיק לטיפול והתייעץ עם רופאך.

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקשיים) התשנ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי
תרופה זו חייבות במרשם רפואי בילדים בגיל 6-12.

אימודים TM כמוסות

חומר פעיל

כל כמוסה מכילה: לופרמיד הידרוכלוריד 2 מ"ג Loperamide hydrochloride 2 mg

לשימוש החומרם הבaltı פיעלים והאלרגניים בתכשיה: ראה פרק 6 "מידע נוספים". ראה גם "מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה" בסעיף 2. קרא בעיון את העلون עד סוף בטרכ **תשתמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמצתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות לילדים ונכונה היועץ ברוקח 6. עליך לשתמש בה בצוורה נכונה. היועץ לפנות אל הרופא אם סימני המחללה (סימפטומים) חמימים או אינם משתפרים לאחר 48 שעות.

1. למה מיועדת התרופה?

אימודים מיועד לשיליטה והקללה בתסמינים של שלשול חריף.

קבוצה תרופיטית: האות תנועתיות המיעים (Antipropulsive).

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המודיעים בפרק 6).
- אין לשתמש בתקציר בילדים מגיל 6 שנים.
- יש לך חום גבוה או דם בצואה (סימנים של דיזיטריה חריפה).
- אתה סובל מדלקת במעי, כגון דלקת כיבית (ulcerative colitis).
- הירן סובל מעיצירות או נפיחות באזורי הבطن (ביחד בילדים עם התיבשות חמורה).
- יש לך שלשול הנגרם לטיפול אנטיביוטי.
- יש לך זיהום במעי הנגרם מחידק, כגון סלמונלה, שיגלה או קמפילובקטר.
- אתה נוטל תרופות המפחיתות את פעולות המיעים.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- הירן סובל מחללה כבד.
- הירן סובל משלשול הנמנש יותר מ- 48 שעות.
- נאמר לך שיש לך סבירות לסוכרים מסוימים.
- הירן סובל משלשול חמור, היית וגופך מאבד יותר נזולים, סוכרים ומחלים מוגרגל.
- אם הירך בהריון היועצי ברופאך לפני נטילת אימודים.
- אין ליטול תרופה זו בתקופת ההנקה.
- אימודים מטפל בשלשול, אך לא בסיבות למצבר. כשייש לך שלשול, גופך מאבד נזולים ומחלים רבים. על מנת להציגם לרמות הרגניות מומלץ לשחות יותר נזולים. שאל את הרוקח לאגב תמיסות מימיות שעדריות המכילות סוכר ומחלים. המלצתה וחויבה במיוחד בילדים ואוכלוסייה FAGUE או קשיים.
- יש ליטול אימודים רק למטרה לה הוא נועד (ראה סעיף 1). בשום אופן אין לעבור על המנה המקסימלית (ראה סעיף 3). בעיות לבבוות חמורות (שכוללות תסמים של קצב לב מהיר או לא סדיר) דווחו במטופלים שנטלו יותר מדי לופרמיד (החותם הפעיל בתרופה).

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות:
শম্পুরোত - 1-10 מעתשים מתח' 1,000:

- נמנום או ישנוניות.
- הכאות, בעית עיכול.
- פירחה.
- יובש בפה.

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שכיחות:
বে- 1-10 מעתשים מתח' 10,000:

- עייפות.
- בעיות בתיאום בתנוחות הגוף.

• נזקשות שרירים חריגה הגורמת לשילטה נמוכה בתנוחת הגוף.

ראה גם סעיף "אם נטלת תופעות מינון יתר" בפרק 3. חלק התופעות עלולות להגרם מהשלולים, למשל חסור נוחות באוזור הבطن, בחילות, הכאות, גיזם, יובש בפה, תחושים עייפות, ישנוניות וסחרורות.

אם גופייה תופעת לוואי, אם אחת מטופעות הלואה מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעлон, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות הבריאות באמצעות לוחצת על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של שאלת [הבריאות \(il\)](http://www.health.gov.il). המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כיסוי ל קישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה לאלה הוראה מפורשת מהרופא!

אין להשתמש בתרופה זו אחריו תאריך התפוגה מתיחה ליום האחרון של אוטו חדש.

של אחסון מתחת ל- 25°C.

אין להשילך תרופות לביזב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח או להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסוף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Lactose monohydrate, maize starch, talc, magnesium stearate, erythrosine, indigo carmine, iron oxide yellow, iron oxide black, titanium dioxide and gelatin.

כיצד ניתן התרופה ומה תוכן האrizה:
כמוסות עם מכסה רוק וגוף או כהה מלאות באבקה לבנה.

גודלי אrizה:

קופסה המכילה 6, 10 או 12 כמוסות באrizה מגש. תיכון וללא גודלי האrizות משוקרים.

בעל הרישום וכותבתו:

ג'י-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

הצורך וכותבתו:

יאנסן סיגל, ואל דה רואי, צרפת.

נערכ באוגוסט 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות: 0251020676.

לשם הפשתות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אם נטלת בטעות מינון גבוהה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלן מין התרופה, פנה מיד לחדר המין של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

טסמיini מינון יתר יכולים לכלול: עליה בקצב הלב, דופק לא סדיר, שיורים בדופק (לטסמיים אלו, פוטנציאלי להיות בעלי השלכות חמורות ומסכנות חיים), יתרון ותרגיש נמנום, נזקשות שרירים או חוסר תיאום בתנוחות הגוף, קשי נשימה וקשי במתן שתן (אצרת שתן). התגובה ילדים למונת גבולהם של אימודיהם הינה חזקה יותר בהשוואה לאםILD נטול מנת יתר או סובל מהתקסמים מעלה, פנה לרופא מיד.

אם שכחת ליטול את התרופה

יש ליטול את התרופה רק במידת הצורך בהתאם להנחיות המופיעות מעלה.

אם שכחת ליטול את התרופה, יש ליטול את התרופה לאחר היציאה הנזולית הבאה. אין ליטול mana כפולה.

אין לעבר על המנה המומלצת.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעעם** שהירק נוטל תרופה. הרוב משקפיים אם הירק זקן להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,

הירוך ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באימודים עלול לגרום לתופעות לוואי בעקבות המסתםים. אל תibal להמקרא שימוש תופעת הלואה. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש באימודים ולפנות מיד לרופא אם אתה חש באחת מטופעות הלואה הבאות:

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שכיחות:
ב- 1-10,000 מעתשים מתח' 10,000:

- תגובות אלרגיות, עילפון, התפוחות הפנים, הגרון והשפתיים, צפצופים לא מוסברים, קשי נשימה, חרלה.

- התנפחות חמורה של הבطن או כאב בטן, עצירות חרمرة.

- פריחה חמורה או גירוי חמור בעור עם אדמומיות, קילוף או שלפוחיות (טוקסיק אפידרמל נקרוליטיס).

- atica חזה אובדן הכרה או ירידת ברמת ההכרה (עלפון, תחרשות עילפון או חוסר ערנות), חוסר תיאום בתנוחות גוף.

תופעות לוואי ששיכחו אין דזעה (לא ניתן להעיר את השכיחות המנתונים הקיימים):

כאב בטן העליונה, כאבי בטן המקרים לגב, רגשות מגע בבטן, חום, דופק מהר, בחילות, הקאות, שעולות להוות טסמיים של דלקת בלבלב (דלקת לבלב חריפה).

יש להפסיק את השימוש באימודים ולפנות לרופא בהקדם האפשרי במקרים הבאים:

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) תופעות:
শম্পুরোত - 1-10 מעתשים מתח' 1,000:

- גירוד או סרפדת (חרלה).

- כאב בטן או בטן נפרחה.

תופעות לוואי נדירות (rare) תופעות שכיחות:
বে- 1-10,000 מעתשים מתח' 10,000:

- קשי במתן שתן.

- עצירות חמורה.

- כווך אישוניים (מיוזיס).

תופעות לוואי נוספת נוספת (common) תופעות שכיחות:
বে- 1-10,000 מעתשים מתח' 100:

- בחילות, עצירות או גיזם.

- כאב ראש.

- סחרחות.